




Handbuch:

7^l

1891

6x

Im Verlage der Schweizerischen Buchhandlung in Basel
hat unter andern auch folgende empfehlenswerthe Bücher
erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Bodenmann, T. B. (Oberlehrer zu Chastel und Lehrer der
Landwirthschaftlichen Schule zu Chastel) Handbuch der
Landwirthschaftlichen Mineralogie. 2 Theile. 1861.

Borchers, E. (Oberlehrer an der Königl. Bergschule
zu Chastel) Anwendung einer Krystalllographie zur
Bestimmung der Durchsichtigkeit zweier Gegenstände. Eine
Aufgabe zur Mathematik. 1861.

Handbuch der Mineralogie, ein
kurzer Leitfaden für die Schulen. Nach Originalzeichnungen von
W. Sauer. Mit Holzschnitten von E. B. Mühlenthiel. 1861.

zum Bestimmen der Mineralien.

Handbuch der Mineralogie, ein
kurzer Leitfaden für die Schulen. Nach Originalzeichnungen von
W. Sauer. Mit Holzschnitten von E. B. Mühlenthiel. 1861.

Hästner, E. (Gymnasial-Director Dr.) Handbuch der Mineralogie
für die Schulen. 2 Theile. 1861.

Hollmann, H. A. (Director am Gymnasium zu Göttingen) Handbuch
der Mineralogie für die Schulen. 2 Theile. 1861.

Dieselben Mineralogischen Schulgrammatiken für
Gymnasien und Progymnasien. Mit Rücksicht auf Sprachver-
gleichung bearbeitet. 1861.

Müller, W. (Gymnasiallehrer) Handbuch der Mineralogie für
die Jugend zur Bildung der Sprache und des
Gedächtnisses. 2 Theile. Zweite vermehrte und verbesserte
Ausgabe. 37 Bogen. 1861.

Mühlenthiel, E. B. (Lehrer an der Königl. Bergschule zu
Chastel) Anwendung einer Krystalllographie zur
Bestimmung der Durchsichtigkeit zweier Gegenstände. Eine
Aufgabe zur Mathematik. 1861.

Literarische Anzeige.

Im Verlage der Schweigerschen Buchhandlung in Clausthal sind unter andern auch folgende empfehlenswerthe Bücher erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Bodemann, Th. (Bergprobierer zu Clausthal und Lehrer der Probierkunst und analytischen Chemie an der Königl. Bergschule daselbst) **Anleitung zur berg- und hüttenmännischen Probierkunst.** Für Anfänger bearbeitet. Mit drei Figurentafeln. 2 Thlr.

Borchers, E. (Markscheider und Lehrer an der Königl. Bergschule zu Clausthal) Anwendung eines **kräftigen Magnets** zur Ermittlung der Durchschlagsrichtung zweier Gegenörter. Eine Aufgabe zur Markscheidekunst. Mit einer Figurentafel. 9 Ggr.

Harz-Panorama, ein Cyclus der schönsten und interressantesten Harzansichten in Stahlstich. Nach Originalzeichnungen von W. Saxesen. Mit Erläuterungen von Ed. Mühlenpfordt. gross Quart. 1s bis 3s Heft. à 8 Ggr.

Harz-Ansichten, die schönsten und interessantesten, in Stahlstich. Nach Originalzeichnungen von W. Saxesen. Erste Lieferung, enthält: Goslar mit dem Rammelsberge; — Der Falkenstein im Selkethale; — Stolberg; — Bergstadt Zellerfeld (im Winter); — Die Rohmkebrücke im Ockerthale; — Ilfeld. 1 Thlr.

Kästner, E. (Gymnasial-Director Dr.) **Wandkarte der alten Welt.** Zum Gebrauch beim Vortrag der Geschichte in Schulen. 2 Thlr. 12 Ggr.

Hoffmann, K. A. J. (Rector am Gymnasium zu Celle) **Neuhochdeutsche Elementargrammatik.** Mit Rücksicht auf die Grundsätze der historischen Grammatik bearbeitet. Zweite Auflage. 10 Ggr.

Desselben **Neuhochdeutsche Schulgrammatik** für Gymnasien und Progymnasien. Mit Rücksicht auf Sprachvergleichung bearbeitet. 18 Ggr.

Müller, W. (Gymnasiallehrer) **Deutsches Lesebuch für die Jugend zur Bildung der Sprache und des Geschmacks.** 2 Thle. Zweite vermehrte und verbesserte Auflage. 37 Bog. 8. 18 Ggr.

Mühlenpfordt, Ed. (Lehrer an der Königl. Bergschule zu Clausthal) **Anfangsgründe der Perspective.** Zum Gebrauch in Schulen und zum Selbstunterricht. Mit 12 Kupfer- tafeln. 12 Ggr.

Handbuch

zum

Bestimmen der Mineralien

auf dichotomischem Wege

nach Dufrénoy's Traité de Minéralogie.

Mit einem Vorwort

von

Dr. Ehr. Zimmermann

Königlich Hannoverschem Bergrathe zu Clausthal, Inhaber des
Guelphen - Ordens 4. Klasse und der Hannoverschen goldenen
Verdienstmedaille.

Nebst 240 Abbildungen.

Clausthal, 1848.

Verlag der Schweigerschen Buchhandlung.


Handbuch

XXIII

Bestimmen der Mineralien

aus dichtermineralischen Wege

nach Brünings's Traité de Minéralogie.



BIBLIOTHECA

REGIA

MONACENSIS

Verlag der Schweigelschen Buchhandlung.
Glanthal, 1848.

Vorwort

vom Werthe der dichotomischen Methode.

Der Mineralogie, als der Lehre von den Arten der Mineralien, hat es bisher noch an einer Methode gemangelt, wodurch die Erkennung der schon wissenschaftlich bestimmten Species auf sicherem Wege selbst für den Anfänger vermittelt wird. Es lässt sich nicht in Abrede stellen, dass die Erlernung dieses Theils der Naturgeschichte, ungeachtet seiner grossen wissenschaftlichen Ausbildung, doch immer auf einer Empirie beruht, der es nur alsdann möglich ist, die Species in jedem ihr angehörigen Individuum zu erkennen, wenn zur Vergleichung ausreichende, schon der Species nach bestimmte Stücke vorliegen, oder dem Gedächtnisse gegenwärtig sind. Deshalb ist die Benutzung guter, möglichst vollständiger Sammlungen auch schon für den Anfänger noch mehr als bei andern Zweigen der Naturbeschreibung beim mineralogischen Studium von der grössten Wichtigkeit, ja dasselbe ohne solche unausführbar. Der Unsicherheit dieses reinen Empirismus wird in gewisser Art durch die dichotomische Methode abgeholfen, indem

sie den Weg zeigt, wie bei genauer Auffassung der einzelnen Eigenschaften eines Minerals die Species aufzufinden ist, zu welcher es gehört. Es setzt dies indessen schon Sicherheit in der Erkennung, Unterscheidung und Bezeichnung dieser Eigenschaften voraus, und die dichotomische Methode wird daher nur zum Ziele führen, wenn die Kennzeichenlehre mit ihrer Terminologie vollkommen eingeübt ist. Durch diese ist die Mineralogie eine selbstständige Wissenschaft und der Unterricht muss wesentlich darauf gerichtet sein die Terminologie anschaulich zu lehren, wozu besondere Kennzeichensammlungen und in Ansehung der Krystalle auch gute Modelle unentbehrlich sind; denn es kann doch auch hierbei nur die Erkenntniss wieder durch Anschauung vermittelt werden. Die Natur wird nicht anders als an ihr selbst erkannt, und der Unterricht kann nur zeigen, wie sie zu beobachten und was wahrzunehmen ist. Aber die Anschauung soll auch begriffen, d. h. im Verstande fixirt werden, was nur durch Vergleichen und Zusammenfassen der einzelnen oder auch durch Zergliederung der zusammengesetzten Erscheinungen geschehen kann, die gerade dadurch als Eigenschaften der natürlichen Körper erkannt und als Kennzeichen für dieselben festgestellt werden. Wer den Unterschied zwischen Zinnweiss und Silberweiss nicht erfasst und sich zum Bewusstsein gebracht hat, dass ersteres ins Blaue, letzteres dagegen ins Gelbe scheint, wird den schon durch die Farbe hervortretenden Unterschied zwischen gediegen Antimon und Antimonial-Silber nicht aufzufassen vermögen. Wenn nun aber die Kennzeichenlehre recht vollkommen geübt

ist, alsdann wird der Schüler nach einiger Anleitung von der dichotomischen Zusammenstellung der Mineralien, wie sie in der vorliegenden Schrift enthalten ist, einen fruchtbaren Gebrauch machen können und mit ihrer Hülfe die Species aufzufinden im Stande sein, zu welcher gegebene, ihm unbekannte Mineralkörper gehören.

Dabei darf jedoch nicht unbeachtet bleiben, dass in solcher Weise immer nur vom Einzelnen Kenntniss erlangt wird, was, so wichtig es allerdings an sich ist, doch keine umfassende Vorstellung von den mannigfachen Beziehungen zu geben vermag, in welchen die Mineralien nach ihren natürlichen verwandtschaftlichen Verhältnissen zu einander stehen und wonach sie sich in natürliche Gruppen ordnen lassen. Ja selbst die Kenntniss der Species bleibt nur auf mehr oder weniger Varietäten beschränkt, in so fern man sich damit begnügt, die letzteren, wie es durch die dichotomische Methode vermittelt wird, als zu einer Species gehörig zu bestimmen. In der Mineralogie beruht aber gerade darin die Hauptschwierigkeit, sich aus den dem Ansehen nach oft so sehr verschiedenen Varietäten die Gesamtanschauung von der Species zu bilden; und dies kann wieder nur geschehen, wenn die Varietäten nach ihren Uebergängen zusammengeordnet werden, so dass sie ungeachtet aller Verschiedenheit sich doch in einem Total-Eindrucke vereinigen; bei aller Mannigfaltigkeit doch nur ein Bild der Species geben.

Dies mag hinreichen, um auszusprechen dass durch die dichotomische Methode zwar ein gutes, längst gewünschtes Hülfsmittel zur Erlernung der Mineralogie

geboten wird, aber das Studium mit ihrer Anwendung nicht als abgeschlossen betrachtet werden darf, vielmehr erst durch fortgesetzte Betrachtung und Vergleichung der mannigfachen Varietäten eine naturgemässe Vorstellung von dem gesammten Mineralreiche zu erlangen steht. Auf diese Weise wird alsdann dem wissenschaftlichen Interesse, völlig genügt werden können, das wir an den Steinen und Minern zu nehmen veranlasst sind. Indessen mag doch bei dieser Gelegenheit auch des ästhetischen Wohlgefallens gedacht werden, welches uns die Betrachtung der natürlichen Körper zu erwecken vermag. Wenn gleich die Mineralien nicht geeignet sind Empfindungen zu erregen, wie sie durch Humboldt'sche Schilderungen landschaftlicher Anschauungen hervorgerufen werden, oder uns in Gemüthsstimmungen zu versetzen, die der Genuss der freien Natur in mannigfachster Abwechselung in uns erweckt, indem gleichsam dadurch der Stoff zu ästhetischen Gefühlen gegeben wird: so kann doch auch die Betrachtung einer wohlgewählten und geschmackvoll geordneten Mineraliensammlung einen Genuss dem vergleichbar gewähren, welcher aus der Beschauung von Kunstwerken entspringt. Die Mineralien sind vor andern Naturkörpern geeignet, in Sammlungen aufbewahrt, Wohlgefallen zu erwecken, da sie vollständiger erhalten werden können, als dies bei organischen Gebilden der Fall ist, die, wenn ihnen das wesentliche Attribut ihres Seins — das Leben — mangelt, nur selten der ästhetischen Beurtheilung genügen. Diesen Genuss des Wohlgefallens an den Gegenständen seiner Forschung darf auch der wissenschaftliche Mineralog nicht

verschmähen, denn er wird seiner Studien eigentlich alsdann erst froh werden, wenn er ihre Objecte in ihm angenehmen Bildern festzuhalten vermag und dadurch seine Wissenschaft gleichsam künstlerisch gestaltet. Er wird alsdann zum Mineralienliebhaber im höheren Sinne, der es sich zur genussvollen Bemühung macht, Mineralien mit Geschmack zu sammeln, zu ordnen und aufzustellen.

Chr. Zimmermann.

verschmähend, denn er wird seiner Studien eigentlich alsdann erst froh werden, wenn er ihre Objecte in ihm aufgenommen Bildern festhalten vermag und dadurch seine Wissenschaft gleichsam künstlerisch gestaltet. Er wird alsdann zum Mineralienliebhaber im höchsten Sinne, der es sich zur genussvollen Beschäftigung macht, Mineralien mit Geschmack zu sammeln, zu ordnen und aufzustellen.

Vorwort des Uebersetzers.

Chr. Zimmermann.

Die in Dufrenoy's „Traité de Minéralogie“ (Paris 1844) gegebene Anleitung, Mineralien auf dichotomischem, analytischem Wege zu bestimmen, führt oft so überraschend schnell zum Ziele und macht so häufig auf bisher wenig hervorgehobene, wesentliche Unterschiede zwischen ähnlichen Mineralien aufmerksam, dass es nicht unzweckmässig erschien, jene in einer Uebersetzung auch in Deutschland bekannter zu machen; wir haben den Text durch Einschaltung vieler vom Verfasser unberücksichtigt gelassener Arten erweitert, eine kurze Beschreibung aller, so wie einzelne Abbildungen der meisten krystallisirten Species hinzugefügt, und am Schlusse noch einige, die Bestimmung der Mineralien erleichternde Anhänge folgen lassen, um dieser Arbeit zugleich die Eigenschaften eines kleinen, des Formates wegen auch auf Reisen bequemen Handbuches der Mineralogie zu geben.

Es ist noch erforderlich, die bei Beschreibung der Species gebrauchten Abkürzungen zu erläutern.

Bei den chemischen Formeln bedeutet wie gewöhnlich:

Ag = Silber	= 1351,607	Mn = Manganoxy-	
Al = Thonerde	= 642,334	dul	= 455,787
As = Arsenik	= 940,084	Mn = Manganoxyd	= 1011,574
Au = Gold	= 1243,013	Mn = Mangansu-	
B = Bor	= 135,983	peroxyd	= 555,787
Ba = Baryt	= 956,880	Mo = Molybdän	= 598,525
Be = Beryllerde	= 962,958	N = Salpeters.	= 677,036
Bi = Bismuth	= 886,918	Na = Natron	= 390,897
Br = Brom	= 978,300	Ni = Nickel	= 369,675
C = Kohlenstoff	= 76,437	O = Sauerstoff	= 100,000
C = Kohlensäure	= 275,000	Os = Osmium	= 1244,210
Ca = Kalk	= 350,500	Ph = Phosphors.	= 892,286
Cd = Cadmium	= 696,767	Pb = Blei	= 1294,498
Ce = Cerium	= 574,718	Pd = Palladium	= 665,840
Cl = Chlor	= 442,650	Pt = Platina	= 1233,260
Co = Kobalt	= 368,991	S = Schwefel	= 200,000
Cr = Chrom	= 328,390	S = Schwefels.	= 506,000
Cu = Kupfer	= 396,600	Sb = Antimon	= 1612,904
Fl = Fluor	= 233,800	Se = Selen	= 494,582
Fe = Eisen	= 350,000	Si = Kieselerde	= 577,312
Fe = Eisenoxydul	= 450,000	Sn = Zinn	= 735,294
Fe = Eisenoxyd	= 1000,000	Sr = Stront.-Erde	= 647,285
H = Wasserstoff	= 12,565	Ta = Tantal	= 1153,715
H = Wasser	= 112,565	Te = Tellur	= 802,121
Hg = Quecksilber	= 1250,600	Th = Thor	= 744,900
J = Jod	= 1578,290	Ti = Titan	= 303,686
Jr = Iridium	= 100,000	U = Uran	= 2711,360
K = Kali	= 589,916	V = Vanadium	= 855,840
L = Lithium	= 80,375	W = Wolfram	= 1183,200
La = Lanthan	= 451,700	Y = Yttrium	= 402,514
Mg = Magnesia	= 258,353	Zn = Zink	= 403,226
		Zr = Zirkonerde	= 1980,804

Ferner bedeutet St. den Strich; G. das specifische Gewicht; H. dagegen den Härtegrad nach der Mohischen Scala, nämlich:

1 = Talk.	6 = Feldspath.
2 = Gyps.	7 = Quarz.
3 = Kalkspath.	8 = Topas.
4 = Flussspath.	9 = Korund.
5 = Apatitspath.	10 = Diamant.

Bei den Abbildungen bedeutet:

O. Octaëdflächen.	π . p. Pyramidenwürfel Flächen.
h. Hexaëdflächen.	t. Pyramidenoctaëdflächen.
d. Dodekaëdflächen.	g. γ . Flächen der Achtundvierzig-
l. l. Leucitoëdflächen.	flächner.

Die Bezeichnung der Krystallflächen im Texte ist die vom Professor Weiss vorgeschlagene, stets mehr Beifall findende.

Schliesslich empfiehlt sich das hauptsächlich für Anfänger bestimmte Werk einer freundlichen Aufnahme und nachsichtigen Beurtheilung.

Dichotomische

Bestimmung der Mineralien.

Man suche

- | | | |
|----|--|------|
| 1. | Feste Körper in der folgenden Nummer | 2 |
| | Flüssige | 1253 |
| | Klebrige | 1255 |
| 2. | Mehr oder weniger beträchtliche Stücke | 3 |
| | Nieren, Knollen, krystallinische oder gerundete
Körner, sandige, oder pulverartige Massen | 1207 |
| 3. | Krystallisirte oder krystallinische Körper | 4 |
| | Amorphe Körper | 5 |
| 4. | Bestimmbare Krystalle ; | 8 |
| | Krystallinische Massen | 9 |
| 5. | Hart und von fester Textur | 6 |
| | Weiche, erdige Massen | 7 |
| 6. | Vollkommner, oder unvollkommner Metallglanz | 867 |
| | Ohne Metallglanz | 933 |
| 7. | Erdig, abfärbend, leicht zerbrechlich, oder als
staubiger Überzug auf andere Mineralien | 1114 |
| | Feste, aber milde, jedoch nicht abfärbende und
auf Papier keinen Strich hinterlassende Körper | 1126 |

8. Krystalle des regulären (tessularen) Systems	10
- - zwei- und einaxigen (pyramidalen) Systems	106
- - drei- und einaxigen (hexagonalen) Systems	150
- - ein- und einaxigen (rhom-bischen) Systems	225
- - zwei- und eingliedrigen (monoklinoëdrischen) Systems	316
- - ein- und eingliedrigen (tri-klinoëdrischen) Systems	392
9. Blättrige, zuckerähnliche oder körnige Structur	403
Concretionenartige, faserige, strahlige, netzför-mig durchwachsene und stängelige Massen	639

Krystallisirte Körper des regulären Systems.

10. Mit vollkommenem oder unvollkommenem Metallglanz	11
Ohne Metallglanz, steiniges Ansehn	55
11. Tetraëder	12
Octaëder	15
Würfel	30
Dodekaëder	38
Pentagondodekaëder	46
Leucitoëder	46
Mehrfache Combinationen	48
12. Messinggelb Kupferkies	107
Grau	13
Silberweiss, ins Röthliche, oft grau, roth, blau oder bunt angelaufen:	

Gediegenes Wismuth.

Bi.

fig. 1. 21.

$\frac{1}{2}$ (a : a : a); (a : a : ∞ a); auch in federartigen, baumförmigen Gestalten, zählig, gestrickt, drahtförmig, derb, körnig, eingesprengt; leicht theilbar $\#$ (a : a : a); St. unverändert; fast geschmeidig; H. 2—2, 5; G. 4, 7; leicht schmelzbar; verflüchtigt sich auf Kohle.

Auf Gängen: Schneeberg, Annaberg, Hasserode, Wittichen, Kärnthen, Schweden, Norwegen, England.

13. Grau, mit deutlichem Metallglanz 14
Dunkelgrau, halb metallischer Glanz, mit gelblichem oder braunröthlichem Widerschein:

Blende.

Zinkblende, Schwefelzink.

Zn.

fig. 1. 2. 3. 6. 7. 23. 26.

($a : a : \infty a$); ($a. a. a$); $\frac{1}{2}$ ($a : a : a$); ($a \infty a \infty a$); $\frac{1}{2}$ ($a : 3a : 3a$).
Zwillinge haben ($a : a : a$) gemeinschaftlich. Spaltbar $\frac{1}{2}$ ($a : a : \infty a$).
Auch nierenförmig, derb, eingesprengt, strahlig, schalig, dicht. —
Unschmelzbar; H. 3—4; spröde; G. 4; pechschwarz, braun, roth, spargelgrün, oft bunt angelaufen; St. weiss bis röthlichbraun.
Durchsichtig bis undurchsichtig. Diamantglanz, schimmernd.

Auf Gängen und Lagern im älteren Gebirge: Lautenthal, Goslar, Neudorf, Freiberg, Przibram, Chemnitz, Felsöbanya, Kapnik, Fahlun etc.; die Leberblende aus Sachsen enthält eine Kohlenstoffverbindung; der Marmatit aus Südamerika 23 pC. Schwefeleisen.

14. Hellgrau, mit muscheligen, glänzendem Bruch:

Fahlerz.

Tetraëdrischer Kupferglanz, Schwarzerz.




fig. 1. 2. 3. 4. 5. 23.

$\frac{1}{2}$ ($a : a : a$); ($a : a : \infty a$); $\frac{1}{2}$ ($a : a : \frac{1}{2} a$); ($a \infty a : \infty a$); ($a : \frac{1}{2} a \infty a$).
Zwillinge: zwei $\frac{1}{2}$ ($a : a : a$) sich rechtwinkelig durchkreuzend. —
Undeutlich spaltbar; auch derb und eingesprengt; schmelzbar; H. 3—4; spröde; G. 4, 5—5,2; stahlgrau bis eisenschwarz. St. unverändert, bei zinkhaltigen Arten dunkelkirschroth.

Man unterscheidet a) gemeines oder liches Fahlerz, Graugültigerz, mit unebenem Bruch, stahlgrau bis dunkelbleigrau; ein Kupferfahlerz; G. 4, 5—4, 8. b) Schwarzerz oder Schwarzgültigerz, Schwarzkupfererz, dunkles Fahlerz, Antimon- oder Spiessglanzfahlerz: mit kleinmuscheligen Bruch; eisenschwarz, stark glänzend. G. 5, 0—5, 1; ist auch ein Kupferfahlerz. c) Weissgültigerz oder Silberfahlerz, mit unebenem Bruch; bleigrau bis stahlgrau, schwach metallglänzend; ist ein Silberfahlerz.

Findet sich überall auf Gängen im älteren Gebirge; das Weissgültigerz bei Freiberg, Wolfach, Badenweiler.

Schwarzgrau, mit körnigem Bruch:

Tennantit.

Graukupfererz, Arsenikfahlerz




fig. 23. 8.

Wie Fahlerz; (a:a:∞ a) meist vorherrschend. — Schwärzlichbleigrau, ins Eisenschwarze, St. dunkelröthlichgrau; H. 4; G. 4, 37; reagirt stark auf Arsen.

Auf Kupfergängen bei Redruth u. St. Day, in England.

15. Silberweiss, dehnbar und biegsam:

Gediegenes Silber.

Ag.

fig. 9. 17. 28. 10.

(a:∞ a:∞ a); (a:a:a); (a:a:½ a); (a:∞ a:½ a); (a:a:∞ a). Krystalle oft verzerrt; auch zählig, draht-, haar-, moos-, fadenförmig, in Blechen, oder derb; undeutlich spaltbar, Bruch hakig; läuft leicht dunkel an; St. glänzend; H. 2, 5 — 3; G. 10 — 10, 4.

Auf Gängen im älteren Gebirge ziemlich verbreitet: Andreasberg, Freiberg, Kongsberg.

Gelb	16
Grau oder schwarz	18
Kupferroth:	

Gediegenes Kupfer.

Cu.

fig. 17. 6. 10. 11.

(a:a:a); (a:∞ a:∞ a); (a:a∞ a); (a:2a:∞ a). Zwillinge mit (a:a:a) an einander gewachsen; undeutlich spaltbar; auch baumförmig, drahtförmig, in Platten, derb und eingesprengt; schmelzbar; H. 2—3; geschmeidig; G. 8, 6; kupferroth, oft gelblich, braun oder schwärzlich angelaufen, oder grün beschlagen. St. unverändert, glänzend.

Auf Gängen und Lagern: Rheinbreitenbach, Kamsdorf, Riechelsdorf, Oberstein, Cornwall.

Tombakbraun:

Combasit.

($a:\infty a:\infty a$); ($a:a:a$); ziemlich deutlich spaltbar $\#$ ($a:\infty a:\infty a$); St. schwarz; starker Metallglanz; H. 4—5; G. 6. b. schmelzbar; er enthält Arsen, Schwefel, Nickel, Eisen, Kobalt.

Auf einem Gange bei Lobenstein.

Grün:

Rothkupfererz.

Ziegelerz, Kupferroth, Rothkupferglas, Kupferlebererz.

Cu.

fig. 6. 9 11. 16. 17. 20.

($a:a:a$); ($a:a:\infty a$); ($a:\infty a:\infty a$); ($a:a:2a$). Spaltbar $\#$ ($a:a:a$). Auch haarförmig (Kupferblüthe, Chalkotrichit), derb, eingesprengt, dicht; H. 3, 5 — 4; spröde; G. 5, 6—6, 1; cochenilleroth, ins Röthlichgraue, zuweilen grün überzogen; St. bräunlichroth, glänzend. — Durchscheinend bis undurchsichtig; diamantglänzend bis matt.

Auf Gängen und Lagern: Rheinbreitenbach, Kausen, Goslar, Chessy, Cornwall, Ural.

16 Dehnbar, biegsam und goldgelb:

Gediegenes Gold.

Au.

fig. 6. 9. 10. 11 12 17. 20. 28.

($a:\infty a:\infty a$); ($a:a:a$); ($a:a:\infty a$); ($a:3a:3a$); ($a:\frac{1}{2}a:\infty a$); ($a:\frac{1}{9}a:\frac{1}{15}a$). Zwillinge haben ($a:a:a$) gemeinschaftlich; Theilbarkeit nicht deutlich. — Auch baum-, draht-, haar- und blechförmig, zählig, derb, eingesprengt; H. 2—3; G. 14—19; gold-, messing-, speisgelb, gelblichgrau.

Auf Gängen in Grauwacke: Zalathna; im Diorit: Tilkerode, Kapnik; im Granit: Beresowsk; auf Eisenglimmerschiefer in Brasilien; ferner an vielen Orten im Schuttlande.

Nicht dehnbar 17

17. Blass messinggelb, am Stahle Funken gebend:

Schwefelkies.

Eisenkies, Schwefeleisen, Markasit, Gelf, Silberkies.

Fe.

fig. 9. 13. 14. 15. 19. 20. 27.

($a:\infty a:\infty a$); ($a:a:a$); ($a:2a:\infty a$) $\frac{1}{2}$; ($a:\frac{1}{2}a:\frac{1}{3}a$) $\frac{1}{2}$; ($a:a:\infty a$); ($a:\frac{1}{3}a:\frac{1}{6}a$); ($a:\frac{1}{2}a:\frac{1}{4}a$); ($a:\frac{3}{2}a:\infty a$). Zwillinge: zwei ($a:2a:\infty a$) $\frac{1}{2}$

kreuzen sich rechtwinkelig; undeutlich spaltbar; auch haar- und baumförmig, kugelig, knollig, derb, eingesprengt, stängelig, faserig; der stängelige zerfällt leicht an der Luft; schmelzbar. Speisgelb, häufig röthlich oder braun, seltener bunt angelaufen; St. bräunlich bis pechschwarz; undurchsichtig; H. 6,0—6,5; G. 5.

In allen Formationen verbreitet; schöne Krystalle kommen von Elba, Piemont, St. Gotthard, Minden, Goslar, Beresowsk, Tavestock, Brasilien und Peru.

Aehnlich ist das weisslich speisgelbe, derbe, bisweilen stängelige, angeblich auch Kupfer und Silber enthaltende Weisskupfererz (Kupfereisenkies) von Freiberg, Annaberg, Lauterberg, Kamsdorf.

Gelbgrün, am Stahle kein Feuer gebend . . .	107
18. Mehr oder weniger dunkelgrau oder schwarz . . .	19
Grau mit cochenillerothem Wiederschein und mit blättrigem Gefüge . . .	Rothkupfererz 15
19. Mit deutlichem Metallglanz . . .	20
Unvollkommener Metallglanz . . .	19 ^a
19 ^a . Strich weiss bis röthlichbraun . . .	Blende 13
Strich schwarz:	

Talkeisenerz.

(a:a:a); (a:a:∞ a); auch in Körnern; schwarz; Glasglanz, n unvollkommenen Metallglanz geneigt; undurchsichtig; H. 5,5—6; G. 4,4; etwas magnetisch; enthält schwarzes Eisenoxyd, viel Talkerde, Titansäure und etwas Thonerde.

Findet sich in Nordamerika mit Spinell zusammen.

20. Dehnbar . . .	20 ^a
Spröde beim Ritzen . . .	21
Hart . . .	22
20 ^a . Lässt sich nicht mit dem Messer schneiden, unschmelzbar:	

Gediegen Eisen.

Meteoreisen.

(a:a:a); (a:∞ a:∞ a) meist derb, eingesprengt, körnig; nach dem Aetzen wird ein unter 60° sich kreuzendes Gefüge sichtbar; stahlgrau, schwarz angelaufen; unschmelzbar; dem Magnete folgsam; H. 4,5; G. 7.

Als Lager im Glimmerschiefer in Connecticut, im Eisenglimmerschiefer von Brasilien und als Meteorstein.

Lässt sich mit dem Messer schneiden und ist schmelzbar:

Glanzerz.

Glaserz, Silberglanz, Silberglas.

Ag.

fig. 6. 9. 11. 12. 17. 20. 28.

($a:\infty a:\infty a$); ($a:a:a$); ($a:a:\infty a$); ($a:a:\frac{1}{2}a$). Undeutlich spaltbar; auch zählig, draht- und baumförmig, gestrickt, zerfressen, derb, eingesprengt; schmelzbar; H. 2—2,5; G. 7,2; schwärzlichbleigrau; St. glänzend.

Auf Gängen im Gneus, Chlorit- und Thonschiefer: Freiberg, Joachimsthal, Rudolstadt, Wolfach, Chemnitz und Kremnitz (s.g. Weichgewächs), Guanaxuato, Zacatecas, Beresowsk.

Spröde beim Ritzen 21

Hart 22

21. Blättriger Bruch und hellgrau, sehr glänzend; leicht in kleine Würfel theilbar, dreifacher Blätterdurchgang:

Bleiglanz.

Pb.

fig. 9. 11. 16. 17. 20. 27.

($a:\infty a:\infty a$); ($a:a:a$); ($a:a:\infty a$); ($a:a:2a$); ($a:a:3a$). Zwillinge haben ($a:a:a$) gemeinschaftlich; sehr vollkommen spaltbar $\ddagger$ ($a:\infty a:\infty a$). Auch geflossen, gestrickt, zerfressen, derb, eingesprengt; gewöhnlich etwas Silber enthaltend; schmelzbar; H. 2,5; G. 7,5; bleigrau bis stahlgrau; St. unverändert.

Auf Gängen und Lagern, namentlich im älteren Gebirge sehr verbreitet. Blaubleierz ist Bleiglanz im Afterkrystalle des Buntbleierz.

Muscheliger, oder körniger, oder ebener Bruch 24

22. Zieht den Magnet an 23

Zieht ihn nicht an 26

23. Wirkt nur wenig auf den Magnet; dunkelröthlich; braunes Strichpulver:

Franklinit.

Zinkisches Eisenerz.




fig. 17. 6. 16.

(a : a : a); (a : ∞ a : ∞ a); (a : a : $\frac{1}{2}$ a); (a : a : 2 a) auch in Körnern eingesprengt und derb, mit Rothzinkerz zusammen; spaltbar $\#$ (a : a : a). Unschmelzbar; H. 6—6,5; G. 5.

Findet sich auf mehreren Gruben der Grafschaft Sussex im Staate New-Jersey.

Zieht den Magnet stark an; undurchsichtig;

schwarzes Strichpulver

23*

23*. Reagirt auf Titansäure:

Titaneisensand.

T r a p p e i s e n e r z.

fig. 17. 9. 11.

(a : a : a); (a : a : ∞ a); (a : ∞ a : ∞ a) auch in eckigen, runden Körnern; eisenschwarz; starker Metallglanz; H. 6; G. 4,6—4,9. Enthält Eisenoxydul und 3—9 pC. Titansäure.

In vulkanischen Gesteinen: Andernach, Sebnitz, Böhmisches Mittelgebirge, Rom, Aetna, Teneriffa.

Nur durch grösseren Gehalt an Titaneisen (27 pC.) unterscheidet sich der Iserin von der Isernwiese in Böhmen.

Reagirt nicht auf Titansäure:

Magneteisenstein.

Octaëdrisches Eisenerz.




fig. 17. 6. 20. 18.

(a : ∞ a : ∞ a); (a : a : a); (a : a : ∞ a); (a : a : $\frac{1}{2}$ a); (a : a : 2 a). Zwillinge haben ein (a : a : a) gemeinschaftlich; spaltbar; $\#$ (a : a : a). Unschmelzbar; H. 6; spröde; G. 5.

Auf Lagern und in Gebirgsgesteinen sehr verbreitet: im Gneus in Norwegen, Schweden und Finnland; in Chlorit- und Talkschiefer in Tyrol, der Schweiz und in Piemont (Traversella); Harz, Thüringen. — Stängelig findet er sich zu Pressnitz; der erdige (Eisenmulm, Eisenschwärze, Eisenmohr, Magneteisenoher) zu Johann Georgenstadt, Ehrenfriedrichsdorf, Hütten-

rode, Altenau. Auch der Chamoisit aus Wallis scheint hierher zu gehören. Der Martit ist in Eisenoxyd verwandelt. Der Vignit von Metz ein Gemenge von Magneteisenstein, Spatheisenstein und phosphorsaurem Eisenoxyd.

24. Giebt vor dem Löthrohre starken weissen Rauch
und Arsengeruch 25
Giebt auf Kohle Antimondämpfe und schwefelige
Säure, aber keinen Arsenikgeruch:

Steinmannit.

B l e i s c h w e i f.

(a : a : a); meist traubig, nierenförmig, derb; undeutlich spaltbar
(a : ∞ a : ∞ a); Bruch eben; bleigrau; St. unverändert; H. 2, 5;
G. 6, 8. Eine Mischung von Schwefelblei und Schwefelantimon.
Przibram, Clausthal, Siegen.

- Kein Rauch; aber Geruch nach schwefliger Säure 29
25 Hellgrau mit muscheligen Bruch . . . **Fahlerz** 14
Dunkelgrau, fast schwarz, mit körnigem
Bruch **Tennantit** 14
26. Nicht blättrig 27
Blättrig; vor dem Löthrohre Arsengeruch:

Glanzkobalt.

Kobaltglanz, Eisenkobaltkies.




fig. 13. 14. 15. 19.

(a : ∞ a : ∞ a); (a : a : a); (a : 2 a : ∞ a) $\frac{1}{2}$; deutlich spaltbar #
(a : ∞ a : ∞ a); — auch derb und eingesprengt; schwer schmelzbar;
H. 5, 5; G. 6, 3; silberweiss bis röthlichgrau, gelb oder bunt ange-
laufen; St. graulichschwarz.

Auf Lagern im Glimmerschiefer und Gneuss: Tunaberg, Hokansbö,
Riddarhyttan, Skutterud, Auerbach.

27. Schmelzbar, oder vor dem Löthrohre weissen
Rauch gebend 28
Vor dem Löthrohre ohne Flussmittel unveränderlich:

Chrom Eisenstein.

Eisenchrom.

 $(\text{Fe Mg}) (\text{Cr Al.})$

$(a:a:a)$, meist tafelförmig zusammengedrückt, theilbar nach der ausgedehnten, octaëdrischen Tafel; auch derb, eingesprengt, körnig; Glanz halbm metallisch bis Fettglanz; St gelblich- und röthlichbraun. Farbe graulich und bräunlichschwarz bis eisen- und pechschwarz; undurchsichtig; H. 5,5; G. 5,5—4,4.

Findet sich im Serpentine und dem dazu gehörigen Eisensteine: Grochau, Hrubitz, Ronsdorf, Ural, New-Jersey.

28. Giebt mit Borax geschmolzen ein blaues Glas:

Speiskobalt.

Arsenikkobalt, Smaltin, Markasit, Stirian, Safflorit.

 Co As^2 .

fig. 9. 11. 17.

$(a:\infty a:\infty a)$; $(a:a:a)$; $(a:a:\frac{1}{2}a)$; $(a:\frac{1}{2}a:\frac{1}{3}a)$. Zwillinge haben $(a:\frac{1}{2}a:\frac{1}{3}a)$ gemeinschaftlich; undeutlich spaltbar. — Auch gestrikt und staudenförmig; derb, eingesprengt, bisweilen schalig, enthält etwas Eisen und Schwefel; H. 5,3; G. 6,5; zinnweiss, ins Stahlgrau; St. graulichschwarz; lebhafter Metallglanz.

Auf Gängen im älteren Gebirge: Siegen, Riechelsdorf, Schneeberg, Joachimsthal, Schladmieg, Andreasberg.

Giebt mit Borax ein dunkelrothes Glas:

Nickelantimonglanz.

Nickelantimonkies, Antimonnickelkies.

 $\text{Ni S}^2 + \text{Ni Sb}^2$

fig. 17. 20.

$(a:a:a)$; $(a:\infty a:\infty a)$; $(a:a:\infty a)$; spaltbar $\nparallel (a:\infty a:\infty a)$; auch körnig, eingesprengt. — Stahlgrau ins Silberweisse; St. graulichschwarz; H. 5—5,5; spröde; G. 6,5.

Auf Eisenstein- und Bleigängen: Rothenberg bei Gosebach, Willisdorf, Freusberg, Sayn-Altenkirchen, Ebersdorf.

Auch der Wodankies von Topschan in Ungarn scheint hierher zu gehören.

Nur durch muscheligen Bruch, deutliche Spaltbarkeit, schwarzen Strich unterscheidet sich der, in offener Glasröhre beim Rösten

ein rösenrothes Pulver gebende, licht zinnweisse Arsenikkobaltkies (Tesseralkies, Hartkobaltkies) von den Skutteruder Gruben in Norwegen. — Co As^3 .

29. Giebt mit Borax ein blaues Glas.

Kobaltkies.

Schwefelkobalt.

Co.

fig. 20. 26.

($a:a:a$); ($a:\infty a:\infty a$). Zwillinge haben ($a:a:a$) gemein; auch derb, von körniger Struktur; Bruch muschelrig bis uneben; H. 5, 5; G. 6, 4; silberweiss, ins Stahlgrau; St. schwärzlichgrau.

Auf Gängen im Thonschiefer bei Müsen; auf Lagern im Gneuss; derb bei Riddarhyttan.

Giebt mit Borax ein violettes oder graues Glas:

Manganlanz.

Manganblende, Braunsteinblende, Schwarzerz.

Mn.

($a:a:a$); ($a:\infty a:\infty a$); vollkommen theilbar $\#$ ($a:\infty a:\infty a$), Eisenschwarz und bräunlichschwarz; St. dunkelgrün; undurchsichtig; auch derb, feinkörnig; H. 3, 5—4; G. 4.

Auf Gängen zu Nagy-Ag, in Cornwall und Mexico.

Giebt mit Borax ein violettes, kalt rothbraunes Glas; auf Kohle eine graue, magnetische Kugel und gelben Beschlag:

Nickelwismuthlanz.

Wismuthnickelkies.

$\text{Bi} + 3 \text{Ni.}$

($a:a:a$); ($a:\infty a:\infty a$); spaltbar $\#$ ($a:a:a$). Krystalle mikroskopisch, innen körnig; H. 4, 5; G. 5, 1; hell stahlgrau, ins Silberweisse, schnell gelblich und graulich anlaufend; St. dunkelgrau; in Salpetersäure zu grüner Flüssigkeit löslich.

Zu Grünau in der Grafschaft Sayn-Altenkirchen.

30. Messinggelb Schwefelkies 17
Grau 31

Silberweiss 30.
 30^a. Silberweiss, wenig ins Stahlgraue; Strich grau-schwarz:

Nickelglanz.

Nickelarsenikkies, Arsenikschwefelnickel, weisses Nickelerz.




fig. 9. 14.

(a:∞ a:∞ a); (a:a:a); $\frac{1}{2}$ (a: $\frac{1}{2}$ a:∞ a); ziemlich spaltbar $\ddagger$
 (a:∞ a:∞ a); auch derb; H. 5,5—6; G. 6,6—6,87.

Auf Gängen bei Schladmig, Kamsdorf, Lobenstein, Harzgerode, Schweden.

Silberweiss, aussen ins Gelbe, innen ins Graue geneigt:

Gediegenes Iridium.

(a:∞ a:∞ a); (a:a:a). Krystalle sehr klein; meist kleine abgerundete, lose Körner; Bruch uneben bis hakig; H. 6—7; G. 22, 4—22,8; vor dem Löthrohre unveränderlich.

Ural, Hinterindien, Brasilien.

31. Grau ohne Wiederschein, Strichpulver grau . . . 32

Grau mit Wiederschein; Strichpulver cochenilleroth

Roßkupfererz 15

32. Bruch blättrig 33

Bruch nicht blättrig 35

33. Sehr blättrig, mit drei rechtwinkligen Blätterdurchgängen, nicht hart 34

Blättrig, hart, schwer in Würfel zertheilbar


Glanzkobalt 26

34. Hellgrau, sehr glänzend **Bleiglanz** 21

Bläulichgrau; Blätterdurchgänge weniger deutlich; reagirt vor dem Löthrohre auf Selen:

Selenblü.

Clausthalie.



(a:∞ a:∞ a); mit gewölbten Flächen; auch derb, feinkörnig oder dicht, meist eingesprengt; H. 2,5—3; G. 8,2—8,8; bleigrau mit einem Stich ins Röthliche und Blaue; St. grau.

Auf Gängen in Grauwacke: Clausthal, Lerbach, Zorge, Andreasberg, Tilkerode, Freiberg.

Graulichschwarz bis eisenschwarz; Strich graulichweiss:

Perowskit.

Ca Ti .

(a : a : a); metallischer Demantglanz; H. 5—6; G. 4; un-
schmelzbar.

Findet sich im Chloritschiefer bei Slatoust am Ural.

35. Bruch körnig, uneben oder muschelig. 36
Bruch hakig:

Gediegenes Platin.

Polyxen.

(Pt Fe Jr.)

(a : ∞ a : ∞ a); ohne Theilbarkeit, selten; gewöhnlich Körner und Geschiebe; H. 4, 0—4, 5; geschmeidig, dehnbar, biegsam, aber nicht elastisch; G. 17—18 — Vor dem Löthrohre unveränderlich; nur in Königswasser auflöslich.

Auf Gängen im Syenitporphyr: Columbien; lose im Schuttlande: ebendort, in Brasilien und am Ural.

36. Dehnbar, erhält durch Anfeilen Glanz 37
Spröde, reagirt nicht auf Kobalt:

Zinkies.

Zinnfahlerz, Zinnkupferglanz.

$(\text{Fe}^2 \text{Zn}^2) \text{Sn} + \text{Cu} \cdot \text{Sn}$.

(a : ∞ a : ∞ a); theilbar undeutlich $\nparallel$ (a : ∞ a : ∞ a) und (a : a : ∞ a); auch derb, eingesprengt; stahlgrau, bisweilen ins Speis- und Messinggelbe; oft gelb angelaufen; St. graulichschwarz; H. 4; G. 4, 3—4, 4; schwer schmelzbar.

Auf Gängen in Cornwall.

Spröde, giebt am Stahle Funken und reagirt

auf Kobalt **Speiskobalt** 28

37. Es lassen sich Spähne davon schneiden 37^a

Zerbröckelt beim Schneiden, ist aber dehnbar:

Buntkupfererz.

Bunter Kupferkies, Phillipsit.




fig. 6. 9.

($a:\infty a:\infty a$); ($a:a:a$); ($a:a:\infty a$); Zwillinge haben ($a:a:a$) gemein; undeutlich spaltbar; gewöhnlich derb, eingesprengt; leicht schmelzbar; H. 3; G. 5. Im frischen Bruche tombakbraun, schnell bunt anlaufend. St. hell graulichschwarz, glänzend.

Auf Lagern und Gängen: Kupferberg, Siegen, Thüringen, Riechelsdorf, Lauterberg, Redruth.

37^a. Bruch muschelrig bis uneben . . . **Glanzerz** 20
Bruch hakig:

Gediegen Blei.

Pb.

($a:\infty a:\infty a$); ($a:a:a$); meist draht- und haarförmige, ästige und dendritische Massen; bleigrau oder graulichschwarz angelauten; etwas abfärbend; H. 1, 5; G. 11—11, 5; leicht schmelzbar.

In Blasenräumen vulkanischer Gesteine auf Madera.

38. Mehr weniger dunkelgrau . . . 39
Messinggelb . . . **Schwefelkies** 17
Silberweiss, weich, aber nicht dehnbar:

Natürliches Amalgam.

Merkurisches Silber.

Ag Hg.

fig. 6. 29. 30.

($a:a:\infty a$); ($a:\infty a:\infty a$); ($a:a:a$); ($a:a:\frac{1}{2}a$); ($a:\frac{1}{2}a:\infty a$); ($a:\frac{1}{2}a:\frac{1}{3}a$); gewöhnlich angeflogen, derb, eingesprengt; H. 3—4; G. 13, 7; lebhaft metallglänzend; St. unverändert.

Auf Gängen im Kohlensandstein bei Obermoschel in Rheinbaiern. Der Arguerit aus Chile ist Ag^oHg und findet sich in sehr kleinen Octaëdern auf Schwerspathgängen.

39. Ausgezeichneter Metallglanz . . . 40
Halber Metallglanz . . . 45
40. Zinnweiss, oder lichte bleigrau . . . 41
Stahlgrau, eisengrau . . . 42

41. Bleigrau, drei rechtwinklige Blätterdurch-
gänge: **Bleiglanz** 21
Zinnweiss, körniger Bruch: **Speiskobalt** 28
42. Hart, Glas etwas ritzend, attractorisch **Magneteisen** 23
Wenig hart, wirkt nicht auf den Magnet . . . 43
43. Dehnbar, lässt sich schneiden **Glanzerz** 37
Spröde, zerbrechlich 44
44. Giebt beim Zerstossen Arsengeruch . **Tennantit** 14
Thut dies nicht **Fahlerz** 14
45. Sehr blättrig, mit gelblichem, grünlichem oder
bräunlichem Widerschein: **Blende** 13
Widerschein und Strichpulver cochenille-
roth **Rothkupfererz** 15
46. Messinggelb **Schwefelkies** 17
Stahlgrau **Glanz kobalt** 26
48. Gelb 49
Mehr weniger dunkelgrau 50
Goldgelb **Gediegenes Gold** 16
49. Blass messinggelb, am Stahle Feuer ge-
bend **Schwefelkies** 17
Grüngelb, kein Feuer am Stahle gebend **Kupferkies** 107
50. Starker Metallglanz 51
Schwach metallischer Glanz mit grünem, oder
gelblichem Widerschein und mit deutlichen
Blätterdurchgängen **Blende** 13
51. Blättrig 52
Nicht blättrig 53
52. Drei deutliche, rechtwinkelige Blätterdurch-
gänge **Bleiglanz** 21
Undeutlich blättrig **Glanz kobalt** 26
53. Beim Zerschlagen nach Arsen riechend . . . 54
Thut dies nicht **Fahlerz** 14
54. Giebt mit Borax ein blaues Glas . **Speiskobalt** 28
Giebt mit Borax ein smaragdgrünes oder ein
ziegelrothes Glas **Tennantit** 14
55. Krystallisirt in Tetraëdern 56
- - Octaëdern 58

Krystallisirt in Würfeln	69
- - Dodecaëdern	76
- - Leucitoëdern	90
- - anderen Combinationen	98
56. Krystalle undurchsichtig	57
Durchsichtig bis durchscheinend, farblos oder milchweiss. :	

Borazit.

Rhodizit?




fig. 1. 4. 11. 22. 23.

(a:∞ a:∞ a); (a:a:∞ a); $\frac{1}{2}$ (a:a:a); $\frac{1}{2}$ (a:a: $\frac{1}{2}$ a); $\frac{1}{2}$ (a: $\frac{1}{2}$ a: $\frac{1}{2}$ a). Undeutlich spaltbar; Krystalle vom Mittelpunkte aus stängelig abgesondert; schmelzbar; H. 7; G. 2, 9; grünlich-, graulichweiss, grau, schmutziggelblich. Doppelte Strahlenbrechung; pyroelectrisch.

Eingewaschen im Anhydrit bei Lüneburg und Segeberg; Ural?

57. Honiggelb, ins Zeisiggrüne; gebogene Flächen:


Helvin.

fig. 1.

$\frac{1}{2}$ (a:a:a); $\frac{1}{2}$ (a:a:a); (a:a:∞ a); theilbar $\nparallel$ (a:a:a). Glasglanz bis Fettglanz; H. 6,0—6,5; G. 3,16; St. weiss; schmelzbar; vier pyroelectrische Axen.

Auf Lagern im Gneuss bei Schwarzenberg und Breitenbrunn.

Nelkenbraun oder rothbraun; Diamantglanz:

Kieselwismuth.

Arsenik-Wismuth, Wismuthblende, Eulytin.




fig. 2.

$\frac{1}{2}$ (a:a:a); $\frac{1}{2}$ (a:a: $\frac{1}{2}$ a); auch kugelig und traubig; undeutlich spaltbar $\nparallel$ (a:a:∞ a); H. 4,5—5; G. 6; St. ungefärbt bis grau.

Auf Gängen im Gneuss bei Schneeberg.

58. Hart, Glas ritzend 59

- Glas nicht ritzend 63
 59. Krystalle durchscheinend oder durchsichtig 60
 - undurchsichtig 61
 60. Ungefärbt oder gelblich; gewölbte Flächen,
 Diamantglanz:

Diamant.

D e m a n t.

C.

fig. 17. 6. 10. 11. 24. 25.

$(a:a:a)$; $(a:a:\frac{1}{3}a)$; $(a:a:\infty a)$; $(a:\infty a:\infty a)$; $(a:xa:ya)$;
 $(a:a:2a)$. Zwillinge: zwei sich kreuzende Halbflächen; oder zwei
 $(a:a:a)$ oder zwei $(a:a:\infty a)$ mit $(a:a:a)$ an einander gewachsen.
 Spaltbar $\# (a:a:a)$; unschmelzbar; H. 10; G. 3, 5.

In dem Quarzconglomerate der Gebirgskette Nalla-Malla und
 im Sande mehrerer Flüsse in Vorderindien und Minas-Geraës.

Strohgelb bis dunkelröthlichbraun:

Mikrolith.

$(a:a:a)$; $(a:a:\infty a)$; $(a:a:\frac{1}{2}a)$; undeutlich spaltbar $\# (a:a:a)$
 Bruch muschelrig, ins Unebene; Fettglanz; durchscheinend bis kanten-
 durchscheinend; St. weiss oder braun; H. 5—5, 5; G. 4, 75—5; un-
 schmelzbar; ist vielleicht Fluorcerium.

Auf Albit bei Chesterfield in Massachusetts.

Dunkelgrün, spaltbar $\# (a:\infty a:\infty a)$:

Periklas.

$(a:a:a)$; durchsichtig; dunkelgrün, unschmelzbar, in Säuren
 als Pulver löslich; H. 6; G. 3, 75; enthält 89 pC. Bittererde und
 8 pC. Eisenoxydul.

Im körnigen Kalke an der Somma am Vesuv.

Rosenroth oder violett, mit ebenen, glänzenden
 Flächen:

Spinell.

(M Fe) Äl.

fig. 17.

$(a:a:a)$; $(a:a:\infty a)$; $(a:a:\frac{1}{2}a)$; Zwillinge haben $(a:a:a)$ ge-
 mein; undeutlich spaltbar $\# (a:a:a)$; Bruch muschelrig. Glasglanz;

roth, ins Blaue, Grüne und Schwarze verlaufend. St. weiss; H. 8; G. 3, 5—3, 8; unschmelzbar.

Rother Spinell lose im Sande in Ostindien; blauer im körnigen Kalkstein bei Aker in Schweden; schwarzer (Pleonast, Candit, Eisenspinell, Ceylanit) Ceylon, Isernwiese, Montpellier, Monzoniberg, Vesuv.

61. Dunkelschwarz, glänzende Flächen. . . **Pleonast** 60
 Mehr oder weniger grünlich 62
 Pommeranzengelb, schwach glasglänzend, kanten-
 durchscheinend:

Pyrrhit.

(a:a:a) sehr klein; H. 6; unschmelzbar. Findet sich im Granit bei Mursinsk.

62. Bouteillengrün, mit glänzenden Flächen: **Ceylanit** 60
 Graugrün, mit rauhen Flächen und etwas
 Metallglanz:

Gahnit.

(Zn Mg Fe) Äl.

Automolit, Zinkspinell.

(a:a:a), oft tafelartig verkürzt, auch derb, mit körniger Structur; spaltbar $\#$ (a:a:a); Bruch muschelig. Glasglanz bis Fettglanz; H. 8; G. 4, 23; St. weiss; an den Kanten durchscheinend bis undurchsichtig; unschmelzbar.

Im Talkschiefer bei Fahlun, mit Augit bei Franklin.

63. In Wasser unlöslich 64
 In Wasser leicht löslich, zusammenziehender
 Geschmack:

Alaun.

Kali-, Natron-, Amoniak-, Mangan-Magnesia-, Eisen-
 Alaun (Federalaun, Haarsalz).




fig. 17. 20.

(a:a:a); (a:∞ a:∞ a); (a:a:∞ a); auch derb, als Ueberzug, faserig, dünnstängelig; Bruch muschelig; Glasglanz; weiss, durchsichtig bis durchscheinend; H. 2—2, 5; G. 1, 75.

Erscheint oft als Efflorescenz auf thonerdehaltigen Mineralien. —
Tscherming, Duttweiler, Freienwalde, Südafrika.

In Wasser schwer löslich; süsslich zusammen-
ziehender Geschmack; lässt sich verflüchtigen:

Weissarsenikerz.

Arsenikblüthe, arsenige Säure; Brithynalliat.

As.

(a : a : a) gewöhnlich nach einer Richtung lang gezogen; spaltbar
(a : a : a); oft nadelförmig, stängelförmig, zu Sternen und Büscheln
gruppiert. Weiss, grau, gelblich, orangegelb, röthlich; St. weiss;
Glasglanz, in den Demantglanz geneigt; halbdurchsichtig bis undurch-
sichtig; H. 1, 5; G. 3, 69.

Krystallisirt, oder als erdiger Beschlag auf Gängen: Andreas-
berg, Joachimsthal, Biber, Ungarn. Davon zu trennen ist wahr-
scheinlich der angeblich ein- und einaxige, weichere, schwerere,
in dünnen Blättchen biegsame Arsenophyllit.

- | | |
|--|----|
| 64. Stark durchscheinend oder durchsichtig | 65 |
| Undurchsichtig oder wenig durchscheinend | 66 |
| 65. Spaltbar # (a : a : a): | |

Flussspath.

Fluss; flusssaurer Kalk.

Ca Fl.


fig. 9. 16. 17. 6. 20. 10. 12. 27.

(a : ∞ a : ∞ a); (a : a : a); (a : a : ∞ a); (a : $\frac{1}{3}$ a : ∞ a); (a : $\frac{5}{2}$ a : ∞ a);
(a : a : 3 a); (a : $\frac{1}{2}$ a : $\frac{1}{4}$ a); (a : $\frac{1}{3}$ a : $\frac{1}{7}$ a); (a : a : $\frac{1}{3}$ a); ($\frac{1}{3}$ a : $\frac{1}{3}$ a : $\frac{1}{11}$ a).
Zwillinge haben (a : a : a) gemein; auch drusig, stängelig, dicht,
erdig; schmelzbar; H. 4; G. 3, 14; farblos, weiss, grünlich-, röth-
lichweiss, rosenroth, wein-, honiggelb, gras-, seledongrün, pflaumen-
und violblau.

Vorzüglich auf Erzgängen: Lauterberg, Andreasberg, Annaberg,
Zinnwald, Rudolstadt, Schwarzwald, Derbyshire, Devonshire, Kongs-
berg, Moldava, Montblanc.

Ein Gemenge von Flussspath und Schwerspath ist als Baryt-
Flussspath (Flussbaryt) aus Derbyshire beschrieben.

Glasbruch:

Glottalith.

(a:a:a); (a:a:∞ a); Glasglanz; weiss, stark durchscheinend;
H. 3—4; G. 2, 18; verhält sich vor dem Löthrohre wie ein Zeolith.
Hügel bei Port-Glasgow am Clyde in Schottland.


66. Schwach durchscheinend, schillert, cochenille-
rothes Strichpulver . . . **Rothkupfererz 15**

Undurchsichtig 67

67. Grüne Krystalle . . . **Rothkupfererz 15**


Mehr weniger dunkelbraun; oft Harzglanz . . . 68

68. Krystalle in kohlensauren Kalk eingewachsen,
glasglänzend:

Dysluit.

(a:a:a); undurchsichtig; G. 4, 5. Bei Stirling in New-Jersey;
gehört, wie auch der sehr ähnliche Isophan, wahrscheinlich zum
Franklinit.

Krystalle in Zirkonsyenit eingewachsen, mit Fett-
glanz:


Pyrochlor.

(a:a:a); (a:a:∞ a); (a:a:½ a); (a:a:⅓ a); kaum spaltbar;
Bruch vollkommen muschelrig. Farbe auf frischem Bruche fast
schwärzlich braun; St. lichte Braun; H. 5; G. 4, 2. Wird vor dem
Löthrohre gelb und schmilzt schwer.

Brevig, Frederikswärn, Miask.

69. In Wasser unauflöslich 70

In Wasser löslich:

Steinsalz.


(a:∞ a:∞ a); (a:a:a); (a:½ a:∞ a); deutlich spaltbar #
(a:∞ a:∞ a); auch tropfsteinartig, derb, körnig, strahlig, faserig;
H. 2; G. 2, 27; farblos, weiss, grau, ziegelroth, violblau, berliner-
blau. Glas - bis Fettglanz.

Bildet an vielen Orten Lager und Stöcke im Steinsalzgebirge :
Wieliczka, Vizakna, Cordona.

- | | |
|---|---------------------|
| 70. Durchsichtig oder deutlich durchscheinend | 71 |
| Undurchsichtig | 75 |
| 71. Grössere Krystalle mit weissem Strichpulver | 72 |
| Fast mikroskopische Krystalle mit glänzendem | |
| Strich und mit einem Messer zu schneiden | 74 |
| 72. Ohne Tetraëderflächen | 73 |
| Mit Tetraëderflächen | Borazit 56 |
| 73. Spaltbar $\ddagger$ (a : a : a) | Flusskalk 65 |
| Nicht spaltbar; bouteillengrün: | |

Würfelerz.

Pharmakosiderit, Beudantit.




(a : ∞ a : ∞ a); (a : a : ∞ a); $\frac{1}{2}$ (a : a : a); $\frac{1}{2}$ (a : a : 2 a). Fast
Demantglanz; olivengrün, ins Gelblich- und Schwärzlichbraune und
ins Gras- und Smaragdgrüne verlaufend; St. gewöhnlich blass;
H. 2, 5; G. 3.

Auf Kupfergängen bei Redruth und St. Day in Cornwall, Horr-
hausen.

Nicht spaltbar; blutroth, ins Hyacinthrothe :

Pyrop.

Rother Granat, hexaëdrischer Granat.




(a : ∞ a : ∞ a); meist in runden, rauhen Körnern mit musche-
ligem Bruch; Hexaëderflächen gewölbt; durchsichtig bis halbdurch-
scheinend; H. 7, 5; G. 3, 7; schwer schmelzbar.

Im Gerölle und im Serpentin des Böhmisches Mittelgebirges.

74. Leicht schmelzbar, die Löthrohrflamme purpur-
roth färbend:

Jodsilber.



(a : ∞ a : ∞ a) und in kleinen, biegsamen Blättchen; geschmeidig;
Fettglanz bis Demantglanz; perlgrau und grünlichgelb; durch-
scheinend.

Mit gediegenem Silber im Serpentine bei Albarradon in Mexico.

Leicht schmelzbar, färbt die Flamme nicht:

Silberhornerz.

Hornerz, Hornsilber, Chlorsilber.

Ag Cl.

($a:\infty a:\infty a$); ($a:a:a$); ($a:a:\infty a$); nicht spaltbar; auch eingesprengt, angeflogen, krustenförmig, dicht, stängelig; Bruch muscheliger; Fettglanz bis Demantglanz; perl-, lavendel-, violblau, ins Grün- und Gelblichweisse; St. glänzend; H. 1—1,5; G. 5,5.

Auf Gängen: Andreasberg, Freiberg, Schneeberg, Kongsberg, Peru und Mexico.

Olivengrün, ins Zeisiggrüne und Gelbe; entwickelt mit Mangansuperoxyd und Schwefelsäure in einer Glasröhre rothe Bromdämpfe:

Bromsilber.

($a:a:a$); ($a:\infty a:\infty a$); auch in krystallinischen Körnern; St. dunkelolivengrün.

Bei Zacatecas und bei Huelgoat.

75. Grössere, weisse oder röthliche Krystalle, meist mit ($a:a:\frac{1}{2}a$) Flächen:

Analzim.

Cubicit, Cuboit, Sarcolith.




fig. 12. 28.

($a:\infty a:\infty a$); ($a:a:\frac{1}{2}a$); ($a:a:\infty a$); auch derb; gross- und grobkörnig; Bruch uneben, unvollkommen muscheliger. Glasglanz; St. weiss; H. 5,5; G. 2.

Andreasberg, Arendal, Mittelgebirge, Seisser Alpe, Cyclopininsel, Aetna, Faröer. Fast nur durch den Wassergehalt verschieden, ist der Caporcianit aus Toskana.

Krystalle sehr klein, blauviolett, auf Quarz angewachsen:

Nitrocerit.

Fl, Ca, Y, Ce.

(a:∞ a:∞ a); auch derbe, krystallinische, körnige Massen, oder als Ueberzug; Bruch uneben; Glasglanz; St. weiss; H. 4—4,5; G. 3, 4.

In Quarz eingesprengt bei Finbo und Broddbo, unweit Fahlun.

76. Schön blaue Krystalle 77

Ungefärbte oder anders gefärbte 78

77. Kleine glasartige Krystalle in vulkanischem Gestein:

Gaunn.

Nosin, Nosean, Spinellan, Ittnerit.

$$3 \text{ Äl Si} + \text{Ca}^3 \text{ Si} + 2 \text{ K (Na) S.}$$

fig. 6.

(a:a:∞ a); (a:a:a); (a:a:½ a); Krystalle oft verlängert oder tafelartig. Spaltbar $\ddagger$ (a:a:∞ a); Bruch flachmuschelrig, uneben; blau oder braun (Nosean) bis pechschwarz. Aeusserlich Glasglanz; innen Fettglanz; durchsichtig bis durchscheinend; H. 5, 5—6, 5; G. 2, 28—3, 33; schmelzbar.

Laacher See, Niedermennig, Albanersee, Vesuv, Kaiserstuhl.

Steinige, undurchsichtige, gewöhnlich mit kohlen-saurem Kalk zusammen vorkommende Substanz:

Lasurstein.

Si, Äl, Ca, K, S.

(a:a:∞ a); undeutlich danach spaltbar; meist derb mit klein- und feinkörniger Zusammensetzung; Bruch uneben, ins Muschelrige; lasur-, berliner-, himmel-, schwärzlichblau; St. lichtblau; kanten-durchscheinend; schwacher Glasglanz; H. 5, 5; G. 2, 5—2, 9; schwer schmelzbar.

Auf Gängen im Granit in Sibirien; Bucharei, Tibet, China.

78. Krystalle Glas leicht ritzend 79

- - kaum ritzend **Kieselwismuth** 57

79. Krystalle glänzend, lebhaft gefärbt 80

- hell gefärbt, schmutziggrau, grünlich-weiss oder graublau, oft mit matten Flächen 88

80. Dunkelschwarz 81
 Anders gefärbt 82
 81. Unschmelzbar, sehr hart, ritzt den Granat: **Pleonast** 60
 Schmelzbar: Eisengranat, Melanit:

Granat.





fig. 6. 23. 28. 29. 11.

($a : a : \infty a$); ($a : a : \frac{1}{2} a$); ($a : \infty a : \infty a$); ($a : \frac{1}{2} a : \frac{1}{3} a$); ($a : a : 2a$); ($a : \infty a : \frac{1}{2} a$); undeutlich spaltbar; auch als Körner, derb und eingesprengt; H 6—7, 5; G. 3, 4—4, 3; St. weiss; durchsichtig bis undurchsichtig; Glas - bis Fettglanz. Man hat unterschieden: 1) **Almandin** (edler Granat, Spessartin), colombin-, blut- bis bräunröthlich, durchsichtig, retractorisch; 2) **Kaneelstein** (Hessonit, Topazolith), Mittel zwischen hyazinthrother und orangengelber Farbe; 3) **Grossular**, (Uwarowit), grünlichgrau, spargel- oder berggrün, weiss; 4) **Gemeiner Granat** (Aplom, Allochroit, Granatit) oliven-, lauch-, pistaziengrün bis leberbraun; 5) **Melanit** (schwarzer Granat, Pyrenäit, Talkgranat) schwarz; 6) **Mangangranat**, bräunlichroth, ins Braune; 7) **Ruthoffit** (Colophonit) röthlich-, gelblich-, schwärzlichbraun bis pechschwarz.

Ist überall in ungeschichteten, metamorphen Gebirgsarten verbreitet.

82. Violet oder roth 83
 Braun, grün oder gelbgrün 85
 83. Schön violett **Almandin** 81
 Sehr hellroth 84
 84. Mit Soda auf Mangan reagirend . . . **Spessartin** 81
 Nicht auf Mangan reagirend . **Eisenkalkgranat** 81
 85. Braun oder hyacinthroth 86
 Grün, grünlich oder gelbgrün 87
 86. ($a : a : \infty a$) nach der kurzen Diagonale gestreift **Aplom** 81
 ($a : a : \infty a$) nicht gestreift, halbdurchsichtig **Essonit** 81
 87. Stachelbeerengrün **Grossular** 81
 Smaragdgrün, Kupfergranat . . . **Uwarowit** 81
 88. Grünlich, wasserfrei:

Sodalit.




(a:a:∞ a); (a:a:a); (a:a:½ a); deutlich spaltbar $\ddagger$ (a:a:∞ a); auch derb, körnig; schmelzbar; H. 5, 5—6; G. 2, 25—2, 35; grau-lich-, gelblich-, grünlichweiss, gelblich-, grünlichgrau, berggrün; durchscheinend; Glas- bis Fettglanz.

Laacher See, Grönland, Vesuv.

- Perlgrau oder hellgrau 89
 89. Stark wasserhaltig, bis zu 20 pC. **Ittnerit** 77
 Kaum 2 pC. Wasser enthaltend **Spinellan** 77
 90. In Wasser unauflöslich 91
 In Wasser löslich; urinöser Geschmack:

Salmiak.



(a:a:a); (a:∞ a:∞ a); (a:a:∞ a); (a:a:½ a); spaltbar $\ddagger$ (a:a:a); auch tropfsteinartig, kugelig, stängelig, flockig, erdig; Bruch muschelrig; weiss, ins Graue, Grüne und Gelbe; durchscheinend.

In Spalten von Laven: Vesuv, Aetna, Island und als Product von Erdbränden.

91. Krystalle durchscheinend und farblos, milchweiss, oder hellgrau. 92
 Wenig durchscheinend oder undurchsichtig, dunk-ler gefärbt **Granat** 81
 92. Wasserfrei, unschmelzbar:

Leuzit.





fig. 28.

(a:a:½ a); undeutlich spaltbar; Bruch muschelrig; St. weiss; H. 5, 5—6; G. 2, 48; Glas- bis Fettglanz.

In Laven eingewachsen: Albano, Vesuv, Andernach, Kaiserstuhl.

- Wasserhaltig und schmelzbar **Analzim** 75
 93. Schwarz, violett oder roth 94

Grün, grünlich oder gelbgrün	97
94. Schwarz oder fast schwarz	Melanit 81
Violett oder roth, mehr weniger dunkel	95
95. Schön violett	Almandin 81
Hellroth	96
96. Reagirt mit Soda auf Mangan	Spessartin 81
Thut dies nicht.	Eisenkalkgranat 81
97. Stachelbeerengrün oder gelbröthlich	Grossular 81
Smaragdgrün	Uwarowit 81
98. In Wasser unlöslich	99
In Wasser löslich	Alaun 63
99. Mit Tetraëderflächen	Boracit 56
Ohne Tetraëderflächen	100
100. Durchsichtig	101
Undurchsichtig oder kaum durchscheinend	104
101. Ritzt Glas	102
Wird durch Stahl geritzt	103
102. Umrisse eines Octaëders vorherrschend, Flächen gewölbt	Diamant 60
Krystalle, sehr klein ($a:a\infty a$); $\frac{1}{2}$ ($a:a:a$)	Rhodizit 56
103. Würfel vorherrschend; spaltbar $\#$ ($a:a:a$)	Flussspath 65
Leucitoëder vorherrschend, muscheliger Bruch	Analzim 75
104. Hellgefärbt, milchweiss oder graugrün	105
Lebhaft und dunkler gefärbt	Granat 81
105. Milchweiss, mit scharfkantigen Krystallen	Analzim 75
Graugrün; Krystalle oft mit zugerundeten Kanten	Sodalit 88

Mineralien des pyramidalen, oder zwei- und ein- axigen Krystallensystems.

106. Metallglänzend, undurchsichtig	107
Ohne Metallglanz	112
107. Vorherrschende Form $\frac{1}{2}$ ($a:a:c$):	

Kupferkies.**Gelbkupfererz.****Cu Fe.**

fig. 31. 32. 33. 34.

(a:a:c); EK. $109^{\circ} 53'$. RK. $108^{\circ} 52' \frac{1}{2}$ (a:a:c); (a:a: $\frac{1}{2}$ c);
 (a: ∞ a:c); (a: ∞ a:2c); (∞ a: ∞ a:c); (a:a: $\frac{3}{2}$ c); (a:a:2c);
 (a: ∞ a: $\frac{3}{2}$ c); (a: ∞ a: ∞ c); (a:3a: ∞ c); Zwillinge haben (a:a:c)
 gemeinschaftlich; undeutlich spaltbar; Bruch muschelrig; messing-
 gelb, ins Goldgelbe und Stahlgrau; St. graulich - bis grünlichschwarz;
 H. 3, 5—4; G. 4.

Auf Gängen im älteren Gebirge sehr verbreitet.

Vorherrschende Form (a:a:c)	108
- (a:a:c); (a:a: ∞ c)	110
108. Krystalle einer metallischen Masse angewachsen	109
Krystalle frei oder auf älteren Gesteinen mit Quarz und Feldspath angewachsen:	

Anatas.**Octaëdrit.****Ti.**

fig. 35.

(a:a:c) $97^{\circ} 56'$ und $136^{\circ} 24'$ (a: ∞ a:c); (a: ∞ a:2c); (a:a: $\frac{1}{3}$ c);
 (∞ a: ∞ a:c); (a: ∞ a: ∞ c); (a: $\frac{1}{3}$ a: $\frac{1}{3}$ c); Krystalle, klein und sehr
 klein; (a:a:c) ist horizontal gestreift; theilbar $\parallel$ (∞ a: ∞ a:c);
 metallähnlicher Demantglanz; indigblau, schwärzlich, graulich, grün-
 lich, röthlich und bräunlich; halbdurchsichtig bis durchscheinend;
 St. ungefärbt; H. 5, 5—6; G. 3, 8; unschmelzbar.

Auf schmalen Gängen: Dauphinee, Graubünden, Spanien, Brasilien.

109. Hart, Glas ritzend; braunes Strichpulver; was-
 serhaltig:

Hartmanganerz.**Braunit.****Mn.**

fig. 36.

(a:a:c) $109^{\circ} 53'$ und $108^{\circ} 39'$ (∞ a: ∞ a:c); (a:a:2c);
 (a: $\frac{1}{3}$ a:c); theilbar $\parallel$ (a:a:c); auch derb, mit körniger Structur.

Bruch uneben; Farbe und St. dunkelbräunlichschwarz, undurchsichtig; H. 6—6, 5; G. 4, 8; unschmelzbar.

Auf Gängen: Ilfeld, Elgersburg, Leimbach, Neukirchen, St. Marcel. Der Marcelin aus Piemont scheint ein Gemenge von Hartmanganerz und einem Manganoxydulsilicate zu sein.

Ritzt kein Glas, aber Flussspath; Strich rothbraun, wasserfrei:

Scharfmanganerz.

Hausmannit, schwarzer Braunstein, Schwarzmanganerz.

Mn Mn.

fig. 37.

(a : a c) $105^{\circ} 25'$ und $117^{\circ} 54'$; (∞ a : ∞ a : c); (a : a : $\frac{1}{3}$ c); (a : a : $\frac{1}{2}$ c). Zwillinge mit (a : a : c) verwachsen. Auch derb, körnig. Bräunlich schwarz, ins Pechschwarze; undurchsichtig; H. 5—5, 5; G. 4, 7.

Auf Porphyrgängen: Ilfeld, Ilmenau, Battenberg.

110. Krystalle deutlich 111
Nadelförmige Krystalle:

Neukirchit.

Eisenmanganerz.

Schwarz; G. 3, 8. Auf Rotheisenstein zu Neukirchen im Elsass

111. Findet sich mit Blende und Manganspath;
Krystalle blättrig **Blättertellur** 243

Ist auf metallischem Gestein angewachsen . . . 109

112. Vorherrschende Gestalt: erste und zweite Säule,
mit der ersten und zweiten Pyramide . . . 120


Vorherrschende Gestalt (a : a : c) 113

113. Wasserhell, milchweiss, graugrün oder schmutzig
gelblich 114

Gelb, orange- oder hyacinthroth 115

Schwarz, braun oder gelbbraun 119

114. Krystalle sehr glänzend; G. höchstens 2:

Faujasit.

(a:a:c); farblos oder braun, ritzt Glas kaum; spröde; G. 1, 92.
In Drusen des Mandelsteins am Kaiserstuhle.

G. wenigstens 6.	149
115. Gelb oder orangeroth	116
Hyacinthroth, ins Bräunliche	118
116. Gelb	117
Orangeroth:	

Gelbbleierz.

Molybdänsaures Blei, Molybdänbleispath, Bleigelb.




fig. 38. 39.

(a:a:∞ c) 99° 40' und 131° 35'; (a:a:½ c); (a:∞ a:c);
(a:∞ a:⅔ c); (a:⅓ a:c); (a:a:∞ c); (a:2a:∞ c); (∞ a:∞ a:c);
oft tafelartig; undeutlich spaltbar; auch derb, körnig; H. 3; G. 6, 8;
St. weiss; wachs-, isabell-, pommeranzengelb, ins Morgenrothe,
graulichweiss; durchscheinend; Fett- bis Diamantglanz; schmelzbar.

Auf Gängen und Lagern: Bleiberg, Annaberg, Rezbanya.

117. Leicht, brennbar, nicht schmelzbar:



Honigstein.

fig. 40.


(a:a:c) 118° 4' und 93° 22'; (a:∞ a:c); (a:∞ a:∞ c);
(∞ a:∞ a:c); undeutlich spaltbar; H. 2—3; G. 1, 6; honiggelb,
ins Hyacinthrothe, wachsgelb; St. weiss; Fettglanz.

Mit Braunkohlen bei Artern.

Eine ähnliche Verbindung ist der Pigotit, welcher Granit-
klippen an der Küste von Cornwall überzieht.

G. bedeutend; schmelzbar . . . **Gelbbleierz** 116
118. Unschmelzbar, Krystalle ungleichförmig, blättrig;
auf Feldspathgesteinen angewachsen:

Phosphorsaure Yttererde.



(a:a:c) 120° und 90° (a:a:∞ c); Bruch uneben und splitterig; Fettglanz; gelblichbraun; St. lichtbraun, schwarz durchscheinend; H. 4, 5—5; G. 4, 55.

Auf einem Granitgange zu Lindesnaes in Norwegen.

Kleine, zusammengehäufte, schmelzbare Krystalle, auf Manganerzen:

Romein.



(a:a:c) SK etwa 111°. Zirkon- oder honiggelb; ritzt Glas. Auf Mangangängen zu St. Marcel.

119. Vollkommene, kleine Krystalle; unschmelzbar:

Fergusonit.

Syanaphinerz.





fig. 41.

(a:a:c) 100° 28' und 128° 27'; $\frac{1}{2}$ (a: $\frac{1}{3}$ a:c); (a: $\frac{1}{3}$ a:∞ c); (∞ a:∞ a:c); Bruch muschelig; unvollkommener Metallglanz bis Fettglanz; schwärzlichbraun bis pechschwarz; St. blassbraun, undurchsichtig; H. 5, 5—6; G. 5, 8.

In Quarz eingewachsen bei Kilkertaursak in Grönland.

Krystalle unvollkommen; Bruch körnig; decrepirt ohne zu schmelzen:

Nitrotantalit.



Prismen mit rauhen Flächen; auch in eckigen, eingewachsenen, körnigen Massen. Eisenschwarz bis gelblichbraun; H. 5—5,5; G. 5, 4—5, 8.

Im Feldspath des Gneises zu Ytterby und im Albit zu Finbo.

120. Durchsichtig, milchweiss oder hellgrau, stark glänzend 121
 Lebhaft gefärbt; nie weiss 136
121. Gewicht bis höchstens 3, bisweilen Perlmutterglanz, deutliche Krystalle 122
 Gewicht wenigstens 6, Demantglanz, undeutliche Krystalle 135
122. Wasserhell oder doch stark durchscheinend . 123
 Milchweiss 126
123. Lebhafter Glasglanz; theilbar $\#$ ($\infty a : \infty a : c$):

Apophyllit.

Ichthyophthalm, Albin, Tesselit, Oxahverit.

fig. 42. 43.


($a : a : c$) $104^{\circ} 2' - 11'$ und 120° ; $- 120^{\circ} 40'$; ($a : \infty a : \infty c$); ($a : 2a : \infty c$); ($\infty a : \infty a : c$); ($a : a : \frac{1}{3}c$); ($a : a : \frac{1}{5}c$); ($a : \infty a : \frac{1}{2}c$); ($a : \infty a : \frac{1}{3}c$); auch derb, schalig; farblos, weiss, gelblich - und grünlichweiss, rosen-, fleischroth; H. 4—5; G. 2, 4. Albin milchweiss, wenig durchscheinend; bei Aussig.

Andreasberg, Utö, Cziklowa, Seisser Alp, Faröer, Aussig.

- Pyramide nicht entscheidet 124
124. Prismenflächen längsgestreift 125
 Prismenflächen glänzend, niedrig:

Edingtonit.

Antiedrit.



($a : a : \infty c$); $\frac{1}{2}$ ($a : a : c$) $92^{\circ} 41'$; $58^{\circ} 20'$; $\frac{1}{2}$ ($a : a : \frac{1}{4}c$); deutlich spaltbar $\#$ ($a : a : \infty c$); graulichweiss; halbdurchsichtig bis durchscheinend; H. 4—4,5; G. 2, 7; schwer schmelzbar; in Säuren, unter Abscheidung von Kieselgallerte löslich.

Auf Thomsonit bei Dumberton in Schottland.

Prismenflächen glänzend, eben und lang gezogen:

Skapolit.

Wernerit, Mejonit, Paranthine, Dipyre, Schmelzstein, Ekebergit, Chelmsfordit, Spreustein.


Fig. 44.

(a:a:c) $136^{\circ} 7'$ und $63^{\circ} 48'$; (a:∞ a:c); $\frac{1}{2}$ (a: $\frac{1}{3}$ a:c); (a:a:∞ c); (a:∞ a:∞ c); (a: $\frac{1}{3}$ a:∞ c); selten (∞ a:∞ a:c), Säulen vorherrschend; spaltbar $\parallel$ (a:a:∞ c) und $\parallel$ (a:∞ a:∞ c); Bruch etwas muschelrig bis uneben; H. 5—6; G. 2,6; Glasglanz, auf den Spaltungsflächen perlmutterartig. — 1) Mejonit $2 \text{Äl} \ddot{\text{Si}} + \text{Ca}^3 \ddot{\text{Si}}^2$; auch körnig, durchsichtig bis halbdurchsichtig. — Am Vesuv 2) Skapolit (Wernerit, Ekebergit) $2 \text{Äl} \ddot{\text{Si}} + (\text{Ca}^3 \text{Na}^3) \ddot{\text{Si}}^2$; auch stängelig, derb; grünlich-, graulichweiss, graulichgrün, spargel-, olivengrün, ziegelroth; durchscheinend bis undurchsichtig. — Arendal, Pargas, Franklin; Dipyr bei Mauleon in den Pyrenäen.

- | | | |
|---|-----------------|-----|
| 125. Krystalle mit deutl., scharfen Flächen | Mesotyp | 282 |
| - nadelförmig | Skolezit | 353 |
| 126 Ritzt Glas | | 127 |
| Ritzt Glas nicht | | 128 |
| 127. Kleine, 8seitige Säulen; zu einem blasigen Glase
schmelzbar; sitzt in Talkgesteinen . | Dipyr | 124 |
| Unschmelzbar, 4seitige Säulen: | | |

Gehlenit.

Stylobat.




(a:∞ a:∞ c); (∞ a:∞ a:c); etwas spaltbar $\parallel$ (∞ a:∞ a:c); auch derb, fast körnig; Bruch unvollkommen muschelrig; Fettglanz bis Glasglanz; grau, ins Braune und Grüne; St. weiss; an den Kanten durchscheinend; H. 5, 5—6; G. 3.

Mit Kalkspath am Monzoniberge im Fassathale.

- | | | |
|--|--------------|-----|
| 128. Vierseitige Prismen; spaltbar $\parallel$ (∞ a:∞ a:c) | Albin | 123 |
| 4—8seitige Prismen, mit 4 Flächen zugespitzt | | 129 |
| 129. Säule mit vier einspringenden Winkeln | | 133 |
| Ohne einspringende Winkel | | 130 |
| 130. Ritzt den Apatit | | 131 |

- Wird vom Apatit geritzt 134
131. Perlmutterglanz, milchweiss 132
- Deutl. Fettglanz; undeutl. Bruch $\#$ der Prismenflächen, muschliger Bruch **Paranthin** 124
132. Deutl. Krystalle, $(a:a:c)$; $(a:\infty a:\infty c)$ 133
- Krystalle selten deutlich; leicht spaltbar $\#$ $(a:\infty a:\infty c)$:

Mittalit.

$(a:\infty a:\infty c)$ grau, glasglänzend; im Bruche fettglänzend, etwas opalisirend, wird vom Skapolit geritzt.

Wohl Skapolit; mit Granat bei Bolton in Massachusetts.

133. In Säuren löslich, dann durch Schwefelsäure Schwerspath gefällt; schmelzbar:

Kreuzstein.

H a r m o t o m.




fig. 45.

$(a:b:c)$ $121^\circ 27'$; $120^\circ 1'$; $(\infty a:b:c)$; $(a:\infty b:\infty c)$; $(\infty a:b:\infty c)$; $(\infty a:b:2c)$; $(x:a:b:c)$; gehört wohl dem rhombischen Systeme an. Gewöhnliche Zwillinge mit gemeinschaftlicher Längsaxe, auch Sechslinge mit sich rechtwinklig kreuzenden Längsaxen; deutlich spaltbar $\#$ $(a:\infty b:\infty c)$. Selten derb; H. 4—5; G. 2, 4; farblos, weiss, röthlich; St. weiss; halbdurchsichtig bis durchscheinend; schmelzbar, ohne Aufblähen.

Auf Gängen und in Blasenräumen von Mandelsteinen und Basalten: Andreasberg, Kupferberg, Kongsberg, Giessen, Oberstein, Campsie.

Nur durch etwas geringeres Gewicht (2, 15) und dadurch, dass die Bayterde durch Kalkerde und Kali vertreten wird, ist der Phillipsit (Kali- und Kalkkreuzstein), zu den auch der Morvenit zu gehören scheint, verschieden.

In Lava, Basalt und Klingstein: Vesuv, Acireale, Capo di Bove, Kaiserstuhl, Marburg, Meissen.

Reagirt nicht auf Baryt, unschmelzbar:

Zeagonit.

Gismondin, Abrazit.




fig. 45.

(a:b:c) $122^{\circ} 54'$; $85^{\circ} 2'$; (a:∞ b:∞ c); (∞ a:b:∞ c); nach dem Prisma unvollkommen theilbar; auch wohl rhombisch; Octaëdkanten oft gerundet; Prismen demantglänzend; Bruch muschelrig; blass smalteblau, milchweiss, perlgrau, röthlich, rosenroth; H. 7—7,5; G. 2, 18.

In Laven des Vesuvs und am Capo di Bove bei Rom.

134. Deutliche, sehr kleine Krystalle, mit niedrigem Octaëd, auf einem Gange im Geis:

Braumontit.

(a:a:∞ c); (a:a:a) $147^{\circ} 18'$; $84^{\circ} 40'$; nach der Grundform und auch basisch spaltbar; graulich; perlmutterglänzend; durchscheinend.

Mit Haydenit auf einem körnigen Gemenge von letzterem und Quarz sitzend; bei Baltimore.


Prismen von 120° , sitzt auf Chloritgestein

Margarit 338

135. Verflüchtigt sich auf Kohle:

Quecksilber - Hornerz.

Hornquecksilber, Chlormerkur, Merkurkerat, Chlorquecksilber.



(a:a:c) $98^{\circ} 4'$; 136° ; (a:∞ a:∞ c); (a:a:∞ c); (a:∞ a:c); auch als Ueberzug und derb; graulichweiss, asch- und gelblich-grau; St. weiss; durchscheinend; H. 1—2; G. 6, 4—6, 5.

Auf Zinnober- und Eisengängen: Moschellandsberg, Idria, Almaden.

Giebt im Reductionsfeuer einen Bleiregulus:

Hornbleierz.

Bleihornerz, Chlorbleispath, Phosgenit.




fig. 46.

(a:a:c) 120° ; 90° ; (a:a:∞ c); (a:∞ a:∞ c); (∞ a:∞ a:c); theilbar $\nparallel$ (a:a:∞ c); fettähnlicher Demantglanz; graulich- und

gelblichweiss, gelblichgrau, strohgelb, weingelb, ins Spargelgrüne und Braune; durchsichtig bis durchscheinend; H. 3; G. 6.
Mit Bleierzeu bei Matlock in Derbyshire.

136.	Krystalle immer gleichfarbig, ohne Zeichnung	137
-	- mit dunklem Kreuz im Querbruch	Chiastolith 308
137.	Krystalle sehr niedrig	138
-	langgezogen	141
138.	- fast blattartig, wie Glimmerblättchen	139
-	etwas höher und mit deutl. Endflächen	140
139.	- schön smaragdgrün	Chalkolith 139

Uranoglimmer.

Uranoxyd, Uranit, Chalkolith.

fig. 47.

(a:a:c) $95^{\circ}46'$; 143° ; ($\infty a:\infty a:c$); ($3a:3a:2c$); ($a:a:\frac{1}{2}c$); ($a:a:\infty c$); leicht theilbar $\parallel$ ($\infty a:\infty a:c$); auch derb und angeflagen; Demantglanz, auf der Endfläche Perlmutterglanz; hellgelbgrün bis schwefelgelb; St. etwas heller; durchscheinend; H. 2—2,5; G. 3—3,6. Er ist 1) kalkhaltig: Uranit; $\text{Ca}^{\text{a}}\ddot{\text{P}} + 2\ddot{\text{U}}\ddot{\text{P}} + 24\text{H}$; St. schwefelgelb, in dünnen Blättchen biegsam; auf Erzgängen bei Autun und in Sachsen; 2) kupferhaltig: Chalkolith $\text{Ca}\ddot{\text{P}} + 2\ddot{\text{U}}\ddot{\text{P}} + 24\text{H}$; giebt ein Metallkorn; St. apfelgrün; in dünnen Blättchen nicht biegsam. Auf Gängen bei St. Austle, Michaelsberg, Baltimore.

	Schwefelgelb ins Goldgelbe	Uranit 139
140.	Gelbe Krystalle	Gelbbleierz 116
	Orangerothe -	Chromhaltiges Gelbbleierz 116
141.	G. wenigsten 6.	142
	G. 3—3,6	143
142.	Krystalle stark glänzend, dunkelbraun, sehr hart:	

Zinnstein.

Z i n n e r z.

$\ddot{\text{Sn}}$.

fig. 48—51.

(a:a:c) $121^{\circ}35'$; $87^{\circ}16'$; ($a:\infty a:c$); ($a:\infty a:\infty c$); ($a:a:2c$); ($\infty a:\infty a:c$); ($a:\infty a:\infty c$); ($a:\frac{1}{2}a:c$); ($a:2a:c$). Zwillinge
3*

(Visirgrauen) haben $(a:\infty a:c)$ gemein; auch derb, eingesprengt, concentrisch faserig, nierenförmig, undeutlich spaltbar; H. 5—7; G. 6, 4—7; gelblich- und röthlichbraun bis pechschwarz; St. hellgrau und hellbraun; halbdurchsichtig bis undurchsichtig; Diamantglanz bis Fettglanz, der faserige schimmernd; schwer schmelzbar.

Auf Gängen und Stöcken im Granit: Erzgebirge, Cornwall.

Krystalle lang gezogen braunroth, Strich roth;
wenig hart und blättrig.

Rutil.

Nigrin, Titanschörl, Gallizinit, Sagenit, Turrit, Crispit.

Ti.

fig. 52. 53.

$(a:a:c)$ $122^{\circ} 24'$; $83^{\circ} 58'$ $(a:\infty a:c)$; $(a:a:\infty c)$; $(a:\infty a:\infty c)$; $(a:3a:\infty c)$; nach der ersten und zweiten Säule ziemlich spaltbar. Zwillinge haben $(a:\infty a:c)$ gemein und sind knieförmig gebogen; auch nadelförmig, derb, eingesprengt, Geschiebe; H. 6—7; G. 4, 3; hyacinth-, blutroth, gelblich-, röthlichbraun; durchsichtig bis undurchsichtig; Diamant- bis Fettglanz; St. gelblich; unschmelzbar.

Auf Gängen und eingesprengt im Granit und Glimmerschiefer: Freiberg, Aschaffenburg, Saualpe, Zillerthal, St. Gotthard, St. Yrieux.

Wahrscheinlich gehört hierher auch der graulichbraune bis schwärzliche, perlmutterartig metallglänzende, ein dunkel chocolate-braunes Strichpulver gebende Warwikit von Warwik im Staate New-York 322.

143. Kleine honiggelbe Krystalle in vulkanischen Gesteinen:

Mellilit.

$(a:a:\infty c)$; $(a:\infty a:\infty c)$; $(\infty a:\infty a:c)$; gelb, ins Rothe, Braune und Grüne; Fettglanz bis matt; H. 5—6; G. 3; ist wahrscheinlich nur Varietät des Humboldttiliths.

Capo di Bove, Tivoli, Vesuv, Laach.

Roth, rosenroth 144

Braun, rothbraun, gelb-, olivengrün, bisweilen blau 145

144. Roth; Krystalle selten mit Endflächen, blättriger Bruch, Fettglanz; mit Hornblende

rother Skapolit 124

- Hellrosenroth, muscheliger Bruch, mit Glimmer
 bekleidet, sehr hart **Andalusit** 297
145. Sehr hart, leicht Glas ritzend 146
 Glas nicht ritzend 148
146. Krystalle langgezogen, etwas walzenförmig,
 mit grosser Scheitelfläche, sehr glänzend und
 schön blau . . . **kupferhaltiger Vesuvian** 147
 Braun, rothbraun, olivengrün oder gelblich . 147
147. Fast immer mit gerader Endfläche und mit
 stumpfem Octaëd, sehr flächenreich, leicht
 schmelzbar:

Vesuvian.

Idokras, Cyprin, Loboit, Egeran, Frugardit, Gökumit,
 Wiluit.




fig. 54. 55.

(a:a:c) $129^\circ 29'$; $74^\circ 14'$; (a:a: $\frac{1}{3}c$); (a: ∞ a:c); (a: $\frac{1}{3}a$:c),
 (a: $\frac{1}{3}a$: $\frac{1}{2}c$); (a:a: ∞ c); (a: ∞ a: ∞ c); (a: $\frac{1}{2}a$: ∞ c); (a: $\frac{1}{3}a$: ∞ c);
 undeutlich spaltbar; auch derb, schalig, stängelig; H. 6—7; G 3, 4;
 gras-, pistazien-, oliven-, schwärzlichgrün; gelblich-, röthlich-;
 leberbraun, himmelblau (Cyprin); durchsichtig bis durchscheinend;
 St. weiss.

Auf Gängen und Lagern oder eingewachsen: Mussaalpe,
 Monzoniberg, Vesuv, Oravicza, am Wilui, Haslau.

Octaëd spitzer, ohne gerade Endfläche, un-
 schmelzbar:

Zirkon.

H y a c i n t h.




fig. 56. 57.

(a:a:c) $123^\circ 19'$; $84^\circ 20'$; (a:a:3c); (a:a:2c); (a: $\frac{1}{3}a$:c);
 (a: $\frac{1}{4}a$:c); (a: $\frac{1}{5}a$:c); (a:a: ∞ c); (a: ∞ a: ∞ c); spaltbar $\#$
 (a:a: ∞ c); H. 7—8; G. 4, 5; graulich-, bläulichweiss, rauchgrau,
 gelblich-, röthlichbraun, hyacinthroth, pommeranzengelb, oliven-,
 pistaziengrün; Glas- bis Demantglanz, durchsichtig bis kantendurch-
 scheinend; St. weiss. Säuren ohne Wirkung.


Im Syenit: Frederikswärn; im Granit: Ilmengebirge; im vulkanischen Gestein: Laach; im Basalt: Unkel; im Flusssande: Ceylon, Expailly, Ohlapian.

Der Malakon von Hitteröe in Norwegen ist wahrscheinlich ein etwas zersetzter Zirkon; deshalb wasserhaltig, leichter und weniger hart.

148. Kleine braune, braungelbliche, deutliche Krystalle:

Humboldtilit.

Zurlit, Sarkolith, Sommervillit, Mellilith.




(a:a:c) $146^\circ 31'$; $48^\circ 5'$; $\frac{1}{2}$ (a:a:2c); (a:xa:c); (∞ a: ∞ a:c); (a:a: ∞ c); (a: ∞ a: ∞ a); theilbar $\frac{1}{2}$ (∞ a: ∞ a:c); H. 5—5,5; G. 3,1; weiss, ins Gelbe, Graue, Braune, schmutzig weingelb und grünlichgrau; halbdurchsichtig bis durchscheinend; Glasglanz; schwer schmelzbar.

Auf Auswürflingen des Vesuvs; gehört vielleicht zum Gehlenit.

Undeutliche lang gezogene Krystalle im Granit:

Pyrrargillit.



Auch derb, eingesprengt; ohne Theilbarkeit; Bruch uneben; Fettglanz; graulich- bis schwärzlichblau, leberbraun bis ziegelroth; an den Kanten durchscheinend bis undurchsichtig; H. 3,5; G. 2,5.

Bei Helsingfors in Finnland.

149. Weissliche oder gelblich bräunliche, stark glänzende, schwer schmelzbare Krystalle:

Schwerstein.

Scheelit, Scheelkalk, Scheelspath, Tungstein.




fig. 58. 59.

(a:a:c) $108^\circ 12'$; $112^\circ 1'$; (a:a: $\frac{1}{2}$ c); (a:a: $\frac{1}{3}$ c); (a: ∞ a:2c); (a: ∞ a: $\frac{2}{3}$ c); (∞ a: ∞ a:c); $\frac{1}{2}$ (a:2a:4c); $\frac{1}{2}$ (a: $\frac{2}{3}$ a:2c); $\frac{1}{2}$ (a: $\frac{1}{3}$ a: $\frac{1}{2}$ c); Zwillinge haben (a:a: ∞ c) gemein. Auch derb, körnig, als Ueberzug, knospenförmig; H. 4—5; G. 6; gelblich- und graulichweiss;

erbsengelb, ins Braune; Glas- bis Demantglanz; St. weiss; halbdurchsichtig bis an den Kanten durchscheinend.

Auf Zinnlagerstätten im Erzgebirge, Böhmen, Cornwall.

Sehr kleine, grünlich- oder gelblichgraue, leicht schmelzbare Krystalle, welche einen Bleiregulus geben:

Scheelbleierz.

Bleischeelat, Scheelbleispath.

Pb W.

fig. 60.

(a:a:c) $99^{\circ} 43'$; $131^{\circ} 30'$; (a:a:2c); (a: ∞ a:c); (a:a: ∞ c); undeutlich spaltbar; auch knospenförmig; H. 3; G. 8; Fettglanz; durchscheinend bis kantendurchscheinend.

Mit Zinnerzen zu Zinnwald in Böhmen.

Krystallisirte Körper des hexagonalen, oder rhomboedrischen Systems.

150. Die Krystalle sind Rhomboëder, Skalanoëder oder 6—12seitige Säulen mit Rhomboëderflächen. Hemiëdrisch 3- und 1axig 151
- Die Krystalle sind sechsseitige Säulen mit der geraden Endfläche oder der sechsseitigen Pyramide; 3- und 1axig 184
151. Metallglanz oder halber Metallglanz 152
- Ohne Metallglanz 152
- (Man wähle die zweite der folgenden Verweisnummern.)
152. Ein oder mehrere Rhomboëder, allein oder mit
- gerader Endfläche 153—157
- Sechsseitige Säulen mit Rhomboëderflächen 156—176
- Skalanoëder 155—175
153. Deutlicher Metallglanz 154
- Glanz schwach oder halb metallisch 153^a
- 153^a. Verflüchtigt sich auf Kohle und reagirt auf Quecksilber:

Zinnober.

Merkurblende, Quecksilberlebererz.

Hg.

fig. 61.

(a:a:∞ a:c); Endkante 71° 48'; (a:a:∞ a:½ c); (a:a:∞ a:⅔ c); (a:a:∞ a:⅓ c); (a:a:∞ a:¼ c); (a:a:∞ a:∞ c); (∞ a:∞ a:∞ a:c); spaltbar ∥ (a:a:∞ a:∞ c); auch derb, eingesprengt, angeflogen, körnig, faserig; H. 2—3; G. 8; cochenilleroth bis bleigrau; St. scharlachroth; Bruch muschelrig; Demantglanz bis schimmernd.

Auf Gängen: Siegen, Horzowitz, Moschellandsberg, Almaden, Idria, Mexico, Peru.

Ist feuerbeständig und unschmelzbar; leicht

spaltbar ∥ (∞ a:∞ a:∞ a:c) 153^b

153^b. Härte 5—5,5. unschmelzbar, undurchsichtig; dunkel eisenschwarz:

Titaneisen.

Ilmenit, Menakanit, Menakeisenstein, Kibdelophan, Basanomehan, Eisenrose, Hystatit.

Ti Fe.

fig. 63.

(a:a:∞ a:c) 85° 59'; ½ (a:½ a:a:⅔ c); (ā:ā:∞ a:½ c); (ā:ā:∞ a:2 c); (∞ a:∞ a:∞ a:c); (a:½ a:a:∞ c); auch derb, eingesprengt, in Körnern; halbmatt glänzend; oft dem Magnete folgsam; St. schwarz; G. 4,6—4,8.

Gastein, Zillerthal, Norwegen, Ilmengebirge, Dauphinée.

Kaum schmelzbar; nur auf der Spaltungsfläche halbmatt glänzender Glanz; grünlich bis braunroth; Härte 2—3:

Pennin.

(Mg³ Fe³) Si² + Äl Si + 7 Mg H.

fig. 62.

(a:a:∞ a:c) 63° 15'; (∞ a:∞ a:∞ a:c); schwärzlichgrün bis schwarz, auch smaragd- und lauchgrün, oder braun- bis hyacinthroth; durchscheinend; Glasglanz; H. 2—3; G. 2,65; St. hellgrünlich weiss.

Im Glimmerschiefer bei Zermatt in der Schweiz.

154. Ganz kleine, stahlgraue, an Quarzkrystallen anhängende Krystalle; Strich schwarz:

Trichtonit.

fig. 62.

($a:a:\infty a:c$) $61^{\circ} 29'$; ($\infty a:\infty a:\infty a:c$); ($a:\frac{1}{2}a:a:c$); theilbar $\parallel$ Endfläche; undurchsichtig; H. 6; G. 4—5.

Mit Anatas auf Gängen bei Bourg d'Oisans.

Nur Zwillinge, auf von Chlorit grün gefärbtem Quarz:

Mohsit.

($a:a:\infty a:c$); ($\dot{a}:\dot{a}:\infty a:\frac{1}{2}c$); ($\dot{a}:\dot{a}:\infty a:2c$); ($a:\frac{1}{2}a:a:\infty c$); ($a:xa:ya:c$); Zwillinge haben die gerade Endfläche gemein und sind nur um 90° verdreht; eisenschwarz, undurchsichtig; starker Metallglanz; Fundort unbekannt.

Zinnweiss, bisweilen grau oder gelb anlaufen:

Gediegen Antimon.

Gediegenes Spiessglas.

Sb.

($a:a:\infty a:c$) $117^{\circ} 15'$; ($\infty a:\infty a:\infty a:c$); ($\dot{a}:\dot{a}:\infty a:2c$); ($\dot{a}:\infty \dot{a}:\infty a:\infty a$); meist in krystallischen Massen, derb, eingesprengt, körnig; H. 3—4; G. 6, 7; starker Metallglanz; schmelzbar und flüchtig.

Auf Gängen bei Allemont und Andreasberg.

Grössere Krystalle, Rhomboëderflächen oft längsgestreift, Strich blutroth:

Eisenglanz.

Rotheisenerz, Blutstein, Eisenoxyd.

Fe.

fig. 64.

($a:a:\infty a:c$) $85^{\circ} 58'$; ($a:a:\infty a:\frac{1}{4}c$); ($a:a:\infty a:\frac{1}{2}c$); ($\infty a:\infty a:\infty a:c$); ($a:\frac{1}{2}a:a:c$); ($a:\frac{1}{2}a:a:\frac{2}{3}c$); ($a:\frac{1}{2}a:a:\frac{1}{3}c$); ($a:\frac{2}{7}a:\frac{2}{7}a:\frac{1}{2}c$); ($a:3a:a:\frac{1}{2}c$); spaltbar $\parallel$ Endfläche; blutroth bis eisen-

schwarz; H. 6; G. 5; unschmelzbar. Varietäten sind: der tafelförmig krystallisirte Eisenglimmer (Spiegeleisen) und der strahlige oder strahligschuppige Glanzeisenstein; ferner der nicht, oder undeutlich krystallisirte, bald faserige (rother Glaskopf), bald schuppige (Rotheisenrahm, Eisenschaum), bald dichte, bald ocherige (Rotheisenoher) Rotheisenstein, der wieder in Kieselrotheisenstein, rothen Thoneisenstein, Röthel und rothen Kalkeisenstein (Korim) übergehen kann.

Auf Gängen und Lagern weit verbreitet. Die schönsten Krystalle finden sich auf Elba, bei Bourg d'Oisans, Framont, Gotthard, Ursernthal, Tyrol, Salzburg, Altenberg.

155. Rother Wiederschein, cochenilleroth Strich;
reagirt auf Antimon:

Rothgültigerz.

Pyrargyrit, Antimon- und Arsen-Silberblende,
Proustit.

fig. 65. 66. 67.

($a:a:\infty a:c$) $108^{\circ} 18'$; ($\infty a:\infty a:\infty a:c$); ($a:\frac{1}{2}a:a:\infty c$); ($a:a:\infty a:\infty c$); ($a:a:\infty a:\frac{1}{2}c$); ($a:a:\infty a:\frac{1}{4}c$); ($a:a:\infty a:2c$); ($a:\frac{1}{3}a:\frac{1}{2}a:\frac{1}{2}c$); ($a:\frac{1}{3}a:\frac{1}{2}a:\frac{1}{4}c$); ($a:\frac{1}{5}a:\frac{1}{2}a:c$); ($a:\frac{1}{3}a:\frac{1}{2}a:c$); ($\frac{1}{2}a:\frac{1}{5}a:\frac{1}{3}a:c$); spaltbar $\parallel$ ($a:a:\infty a:c$); Zwillinge haben Hauptaxe gemeinschaftlich, oder letztere kreuzen sich rechtwinklig; auch derb, angeflogen; H. 2—2,5; G. 5, 4—5, 8; Bruch muschelrig; eisenschwarz, schwärzlichbleigrau bis carmoisinroth, (dunkles R. $\text{Ag}^3 \text{Sb}$); cochenille- bis carminroth, ins Blutrothe (lichtes R., Proustit $\text{Ag}^3 \text{As}$); halbdurchsichtig bis undurchsichtig.

Auf Gängen im älteren Gebirge: Andreasberg, Freiberg, Przibram, Ungarn, Siegen, Cornwall, Mexico, Peru.

Ohne Wiederschein, Strich hellroth, reagirt
auf Arsenik Proustit 155

Eisenschwarz, dunkel und lichtbleigrau; Strich
bräunlichschwarz:

Fahles Rothgültigerz.

Erscheint in spitzen Skalanoëdern und stumpfen Rhomboëdern und bildet Ueberzüge auf Rothgültigerz und Bleiglanz; auch derb. Bruch flachmuschelrig; starker Metallglanz bis matt; zum Theil bun

angelaufen; H. 2, 5; schmilzt sehr leicht. Enthält Schwefelsilber und Schwefelantimon.

Findet sich zu St Andreasberg.

156. Krystalle sehr glänzend, sehr hart, fast immer mit der Endfläche; Strich braunroth

Eisenglanz 154

Weich, leicht einen rothen Strich gebend . . . 155

157. Durchsichtig, milchweiss oder sehr hellgelb . . . 158


Anders gefärbt 168

158. Dreifacher Blätterdurchgang nach dem Rhomboëder 161

Ohne deutliche Spaltungsflächen 159

Basisch spaltbar; lässt sich mit dem Nagel ritzen, vom Messer schneiden:

Teuchtenbergit.



Rhomboëder oder sechsseitige Tafeln; grosse, undeutliche Krystalle sind zusammengehäuft; gelblich; in dünnen Blättchen durchsichtig, weiss; H. 2, 5; G. 2, 7. Vielleicht Chlorit.

Von Slatoust am Ural.

159. Mittleres Gewicht kaum 4 160

Gewicht über 6; einen Bleiregulus gebend:

Leadhillit 349

160. Härter als Quarz:

Korund.

Saphir, Salamstein, Schmirgel, Demantspath.

Al.

fig. 68.

(a : a : ∞ a : c) 86° 6'; (∞ a : ∞ a : ∞ a : c); (a : ½ a : a : ∞ c); (a : ½ a : a : c); (a : ½ a : a : 2 c); (a : ½ a : a : ⅔ c); auch in Körnern und derb; H. 9; G. 4; blau (Saphir), roth (Rubin), grün, gelb, weiss, braun, grau; Glasglanz; St. weiss; unschmelzbar.

St. Gotthard, Isernwiese, Egerösund, Piemont, Ceylon, China, Brasilien.

- Ritzt Quarz nicht 165
 161. Spaltungsflächen leicht zu erhalten 163
 - - nicht leicht zu erhalten, perl-
 mutterweiss 162

162. In Säuren mit Aufbrausen löslich, unschmelzbar:

Zinkspath.

G a l m e i.

$\text{Zn } \ddot{\text{C}}.$

Fig. 62.

$(a:a:\infty a:c)$ $107^{\circ} 40'$; $(a:a:\infty a:4c)$; $(a:\frac{1}{2}a:a:\infty c)$; $(\infty a:\infty a:\infty a:c)$; spaltbar $\ddagger$ $(a:a:\infty a:c)$; auch traubig, nierenförmig, als Ueberzug, derb, faserig, körnig, dicht; weiss, graulich-, grünlich-, gelblichweiss, isabell-, ochergelb; durchscheinend; Glas-, Perlmutterglanz, schimmernd, matt; H. 5; G. 4, 4; unschmelzbar.

Auf Gängen, Stöcken und Lagern: Altenberg, Brilon, Tarnowitz, Reibel.

Ohne deutliches Aufbrausen löslich, schmelzbar:

Dreelit.

$\text{Ba } \ddot{\text{S}}, \text{Ca } \ddot{\text{S}}, \text{Ca } \ddot{\text{C}}, \ddot{\text{Si}}.$

$(a:a:\infty a:c)$ 93° ; weiss; H. 3; G. 3, 3. Auf Sandstein bei Beaujeau im Dep. d. Rhone.

163. In Säuren schwach und nicht sofort aufbrausend 164

In Säuren schnell und stark aufbrausend:

Kalkspath.

Doppelspath, Bergmilch, Kreide, Kalktuff, Schieferspath, Stinkstein, Anthrakolith, kohlensaurer Kalk, Erbsenstein.

$\text{Ca } \ddot{\text{C}}.$

Fig. 69—80. 62. 65.


$(a:a:\infty a:c)$ $105^{\circ}, 5'$; $(\dot{a}:\dot{a}:\infty a:\frac{1}{2}c)$; $(a:a:\infty a:\frac{1}{4}c)$; $(\dot{a}:\dot{a}:\infty a:2c)$; $(a:a:\infty a:4c)$; $(\dot{a}:\dot{a}:\infty a:8c)$; $(a:a:\infty a:\infty c)$; $(a:\frac{1}{2}a:a:\infty c)$; $(\frac{1}{2}a:\frac{1}{7}a:\frac{1}{5}a:\infty c)$; $(\infty a:\infty a:\infty a:c)$; $(a:\frac{1}{3}a:1\frac{1}{2}a:c)$; $(\frac{1}{2}a:\frac{1}{5}a:\frac{1}{3}a:c)$; $(\frac{1}{3}a:\frac{1}{7}a:\frac{1}{4}a:c)$; $(\dot{a}:\frac{1}{4}\dot{a}:\frac{1}{3}\dot{a}:c)$; $(a:\frac{1}{1\frac{1}{2}}a:\frac{1}{2}a:c)$; $(a:\frac{1}{5}a:\frac{1}{3}a:c)$; $(a:\frac{2}{5}a:\frac{1}{2}a:c)$; $(a:\frac{4}{5}\dot{a}:\frac{1}{3}\dot{a}:c)$ und noch mehrere

Rhomboëder. Zwillinge haben die Hauptaxe, das zweite oder das Hauptrhomboëder gemein. Spaltbar deutlich $\#$ ($a:a:\infty a:c$). Auch derb, stängelig, faserig, dicht, erdig; H. 3 bis zerreiblich; G. 2,7—3; alle Farben; durchsichtig bis undurchsichtig; glasglänzend bis matt, seltener Perlmutterglanz; unschmelzbar.

Findet sich fast überall, am schönsten krystallisirt auf Gängen: Andreasberg, Erzgebirge, England.

In Wasser auflöslich und mit Säuren nicht brausend:

Natron-Salpeter.




($a:a:\infty a:c$) $106^{\circ} 30'$; auch krystallinische Masse mit körniger Zusammensetzung; Bruch muschelrig; weiss; Glasglanz; schmeckt bitterlich und kühlend; schmelzbar; verpufft auf Kohle.

Auf Lagern in Peru.

164. Die Auflösung enthält Kalk:

Dolomit.

Braunspath, Bitterspath, Rautenspath, Tharandit, Magnesit, Bitterkalk, Konit, Miemit, Gurhoffian.




($a:a:\infty a:c$) $106^{\circ} 15'$; ($\dot{a}:\dot{a}:\infty a:2c$); ($\dot{a}:\dot{a}:\infty a:\frac{1}{2}c$); ($a:\frac{1}{3}a:\frac{1}{2}\dot{a}:c$); ($\infty a:\infty a:\infty a:c$); spaltbar $\#$ ($a:a:\infty a:c$), welches oft als sattelförmige Linse erscheint. Auch derb, traubig, nierenförmig, strahlig, faserig, körnig, dicht (Konit); weiss, ins Graue, Rothe und Gelbliche, spargelgrün (Miemit); Glas- bis Perlmutterglanz; durchscheinend; unschmelzbar; H. 3, 5—4; G. 2, 88.

Im Talk- und Chloritschiefer der Alpen, sowie auf Erzgängen brechen die schönsten Krystalle ein; der körnige als Gebirgsart häufig.

Die Lösung enthält keinen Kalk, wohl aber Bittererde:

Talkspath.

Breunerit, Magnesitspath.




($a:a:\infty a:c$) $107^{\circ} 22'$; ausserdem derb; Bruch muschelrig; Glasglanz; weiss, grau, gelblich, bräunlich; H. 4—4,5; G. 3; durchsichtig bis durchscheinend.

Hall, Fassathal, St. Gotthard, Unst.

Die Auflösung enthält Talkerde, Kalk und Eisenoxydul:

Ankerit.

Rohwand, Rosszahn, Wandstein.



(a:a:∞ a:c) 106° 12'; (∞ a:∞ a:∞ a:c); (á:á:∞ a:½ c);
derb; weiss, ins Graue und Rothe geneigt; St. weiss; schwach
durchscheinend; H. 3, 5—4; G. 3.

Auf Lagern im Glimmerschiefer in den östlichen Alpen.

165. Krystalle sitzen in Mandelsteinen; ohne Auf-
blähen schmelzbar 166

Krystalle vor dem Löthrohre decrepirend . . . 167

166. Leicht in Salzsäure löslich:

Chabasit.

Kuboizit, Chabasin, Levyn.




fig. 81. 70.

(a:a:∞ a:c) 94° 46'; (á:á:∞ a:½ c); (á:á:∞ a:2 c); (∞ a:∞ a:∞ a:c); (a:½ a:¼ a:⅙¾ c); (a:⅓ a:½ a:¼ c); (a:½ a:a:∞ c). Die häufigen Zwillinge haben die Endfläche, selten (a:a:∞ a:c) gemein; undeutlich spaltbar; auch derb; Glasglanz; weiss, selten röthlich oder gelblich; halbdurchsichtig; H. 4—4, 5; G. 2, 1; schmelzbar.


In Blasenräumen von Mandelsteinen und Basalt: Aussig, Oberstein, Faröer, Schottland, Sicilien; auf Gängen: Andreasberg. Auch der Acadiolith aus Neu-Schottland wird hierher gehören; dergleichen vielleicht der Haydenit von Baltimore.

Schwer in Säuren löslich **Levyn** 166

167. Decrepirt, färbt die Löthrohrflamme grün,
schmilzt aber nicht:

Willemitt.

Williamit, Hebetin, wasserfreies Kieselzinkerz.




(a:a:∞ a:c) 133°; (a:a:∞ a:∞ c): (∞ a:∞ a:∞ a:c); undeutlich spaltbar; auch derb; Bruch muschelrig; Glasglanz; weiss

ins Gelbe und Braune; halbdurchsichtig bis durchscheinend; H. 5, 5; G. 4, 1.

Mit Kieselzinkerz bei Lüttich, Aachen, Reibel.

Decrepirt, wird in der Flamme bräunlichroth, und reagirt mit Soda auf Blei; braust mit Säuren auf:

Plumbocalcit.




(a : a : ∞ a : c) 104° 53'; auch derb, von körniger Zusammensetzung; durchsichtig bis undurchsichtig; H. 3; G. 2, 8.

In alten Halden zu Wanlockhead in Dumfriesshire.

Decrepirt und giebt eine erdige, stark nach Alaun schmeckende Masse:

Alaunstein.

Alunit.



(a : a : ∞ a : c) 92° 50'; (∞ a : ∞ a : ∞ a : c); gewöhnlich derb, kleinkörnig bis dicht. Glasglanz bis Perlmutterglanz; weiss, röthlich, graulich, gelblich; St. weis; durchsichtig bis durchscheinend. H. 3, 5—4; G. 2, 7; unschmelzbar. Der Alaungrammit von Muzsey soll ein- und einaxig sein.

Als Lager im Porphyrgebirge; Beregszaz, Mussay und Bodrog in Ungarn; Tolfa, Milo, Argentiera.

168. Schön grüne Mineralien 169

Gefärbt, aber weder weisslich, noch grün . . . 170

169. Krystalle deutliche Rhomboëder mit der zweiten Säule:

Dioplas.

Kupfersmaragd.




fig. 65.


(a : a : ∞ a : c) 95° 48'; (a : ½ a : a : ∞ c); selten (ā : ā : ∞ a : ½ c); auch körnig; H. 5; G. 3, 3; smaragdgrün, durchsichtig bis durchscheinend, glasglänzend; unschmelzbar, verknisternd.

In der Kirgisensteppe in einem Mergel.

Krystalle tafelförmig, fast glimmerartig:

Kupferglimmer.

Euchlor-Glimmer, Erinit.



(a:a:∞ a:c) 68° 45'; (∞ a:∞ a:∞ a:c); auch derb, körnig; theilbar $\ddagger$ Endfläche; smaragd-, gras- bis spangrün; St. heller; Demant- bis Glasglanz; auf der Endfläche Perlmutterglanz; durchsichtig bis durchscheinend. H. 2; G. 2,5; schmelzbar.

Auf Gängen bei Redruth.

170. Rosenroth oder violet 171

Gelblich oder dunkelbraun, oft mit röthlichem


Wiederschein 172

171. Ritzt leicht Glas **Rubin** 160

Ritzt Glas nicht leicht; theilbar $\ddagger$ (a:a:∞ a:c):

Manganspath.

Rother Braunstein, Braunspath, Rohdochrosit; kohlen-saures Mangan.




(a:a:∞ a:c) 106° 51'; (ā:ā:∞ a:½ c); auch derb, körnig; rosenroth, röthlichweiss, blass fleischroth; Glass- bis Perlmutterglanz; St. weiss; durchscheinend; H. 3,5; G. 3,55; unschmelzbar.

Auf Gängen bei Freiberg, Elbingerode, Rübeland.

172. Blättrig, braun mit rothem Wiederschein:

Croosit.



(a:a:∞ a:c) 115—124°; (a:ā:∞ a:½ c); (a:½ a:a:∞ c); theilbar $\ddagger$ Säule; auch derb, körnig; Bruch muschelrig; auch spargelgrün, gelb, grau; durchsichtig bis durchscheinend; H. 5,5; G. 4. Wird vor dem Löthrohre durchsichtig und schmilzt an den Kanten.

Zu Franklin und Sparta in New Jersey.

Gelblich- oder dunkelbraun 173

173. Leicht spaltbar $\#$ ($a:a:\infty a:c$) 174
 Unspaltbar? **Beudantit** 73
 174. Mit Säure aufbrausend; starker Eisengehalt:

Spath Eisenstein.


Kohlensaures Eisen, Junkerit, Haydenit, Flinz, Stahlstein, Eisenspath, Sphärosiderit, Oligonspath.

($a:a:\infty a:c$) 107° ; ($\acute{a}:\acute{a}:\infty a:\frac{1}{2}c$); ($\acute{a}:\acute{a}:\infty a:2c$); ($a:a:\infty a:4c$); ($a:a:\infty a:\infty c$); ($a:\frac{1}{2}a:a:\infty c$); ($\infty a:\infty a:\infty a:c$). Haupt-rhomboëder oft sattelförmig gekrümmt; auch halbkugelförmig, nierenförmig, derb, körnig, concentrisch schalig, faserig und dicht; H. 4; G. 3, 7—3, 9; gelblichgrün, erbsengelb, ins Röthlich- und Schwärzlichbraune; der dichte dunkelgrau und braun. Durchscheinend bis undurchsichtig; Glas- bis Perlmutterglanz (Fe Mn) C ; enthält meist auch Mg C und Ca C ; unschmelzbar. Hierher scheint auch der angeblich in quadratischen Octaëdern mit krystallinisch körniger Zusammensetzung vorkommende, blass honiggelbe Thomäit vom Siebengebirge zu gehören.

Sehr verbreitet auf Gängen und Lagern.

Braust wenig mit Säure und enthält viel Talk:

Mesitinspath.



($a:a:\infty a:c$) $107^\circ 14'$; ($\acute{a}:\acute{a}:\infty a:\frac{1}{2}c$); ($\infty a:\infty a:\infty a:c$); ($a:a:\infty a:\infty c$); oft linsenförmige Gestalten; graulichweiss bis gelblichgrau; St. weiss; durchscheinend; H. 3, 5—4; G. 3, 35.

Findet sich bei Traversella in Piemont.

175. Durchscheinend oder durchsichtig, leicht spaltbar **Kalkspath** 163
 Undurchsichtig, milchweiss oder ochergelb, nicht spaltbar **Zinkspath** 162
 176. Ritzt leicht Glas 177
 Ritzt Glas nicht 179
 177. Säulenflächen ungleich, Durchschnitt dreiseitig:

Turmalin.

Schörl, Rubellit, Indicolith.

 $\ddot{\text{Si}}$, $\ddot{\text{Al}}$, $\ddot{\text{Fe}}$, $\ddot{\text{Ka}}$, $\ddot{\text{Na}}$, $\ddot{\text{L}}$, $\ddot{\text{B}}$.

fig. 82. 83.

$(a:a:\infty a:c)$ $133^{\circ} 26'$; $(a:a:\infty a:4c)$; $\frac{1}{2}(\dot{a}:\dot{a}:\infty a:\frac{1}{2}c)$; $\frac{1}{2}(\dot{a}:\dot{a}:\infty a:2c)$; $(\frac{2}{7}\dot{a}:\frac{2}{7}\dot{a}:\infty a:c)$; $\frac{1}{2}(a:a:\infty a:\infty c)$; $(a:\frac{1}{2}a:a:\infty c)$; $\frac{1}{2}(a:\frac{1}{3}a:\frac{1}{4}a:c)$; $\frac{1}{2}(\infty a:\infty a:\infty a:c)$; $(\frac{1}{2}a:\frac{1}{3}a:a:c)$; $(\frac{1}{3}a:\frac{1}{5}a:\frac{1}{2}a:c)$; undeutlich spaltbar; Prismen längsgestreift; auch nadel- und büschelförmig, derb, eingesprengt; H. 7—7,5; G. 3—3,2; farblos, grünlich-, bläulich-, röthlichweiss, rosenroth, pfirsichblüthroth; indigblau (Indicolith), seladon-, gras-, apfelgrün; nelkenbraun, schwarz; bisweilen mehrere Farben an demselben Krystalle; durchsichtig bis undurchsichtig; Glasglanz; St. weiss; theils schmelzbar, theils un- schmelzbar (Lithionturmalin, Rubellit).

Eingewachsen in plutonische Gebirgsarten: Campo longo, Elba, Rozena, Penig, Mursinsk, Utön, Modum, Arendal, Andreasberg, England, Brasilien.

Durchschnitt der Säule nicht dreiseitig.. 178
178. Durchsichtige, sehr glänzende Krystalle:

Phenakit. $\ddot{\text{Be}}$ $\ddot{\text{Si}}^2$.

fig. 84.

$(a:a:\infty a:c)$ $116^{\circ} 40'$; $(\dot{a}:\dot{a}:\infty a:\frac{1}{2}c)$; $(\dot{a}:\dot{a}:\infty a:2c)$; $(a:\frac{1}{2}a:a:\frac{1}{3}c)$; $(a:\frac{1}{2}a:a:\infty c)$; $(a:a:\infty a:\infty c)$; $\frac{1}{2}(a:\frac{1}{3}a:\frac{1}{2}a:c)$; $\frac{1}{2}(\dot{a}:\frac{1}{3}\dot{a}:\frac{1}{2}\dot{a}:\frac{1}{2}c)$; Zwillinge: Endfläche gemein; deutlich spaltbar $\ddagger$ $(a:\frac{1}{2}a:a:\infty c)$; farblos, gelblichweiss, wein-, ochergelb, nelkenbraun; durchsichtig bis durchscheinend; Glasglanz; H. 8; G. 3; unschmelzbar.

Im Glimmerschiefer: Katharinenburg; im Brauneisensteine Framont.

Undurchsichtig, bräunlich roth:

Eudialith.

$$\text{Na Cl} + 3 (\ddot{\text{Ca}} \ddot{\text{Si}} + \ddot{\text{Na}} \ddot{\text{Si}} + \ddot{\text{Fe}} \ddot{\text{Si}} + \ddot{\text{Zr}} \ddot{\text{Si}}.)$$

fig. 85.

$(a:a:\infty a:c)$ $73^{\circ} 24'$; $(a:a:\infty a:\frac{1}{4}c)$; $(\infty a:\infty a:\infty a:c)$; $(a:\frac{1}{2}a:a:\infty c)$; seltener auch $(\dot{a}:\dot{a}:\infty a:\frac{1}{2}c)$ und $(a:a:\infty a:\infty c)$; theilbar

Endfläche. Auch derb, körnig; Glasglanz; St. weiss; H. 5—5,5; G. 2,8; schmilzt leicht zu einem graugrünen Glase.
Auf einem Lager im Gneus zu Kangerdluarsuk in Grönland.

179. Schön smaragdgrün **Diopas** 169
Durchsichtig, milchweiss, etwas grünlichweiss
oder gelblich, oder mehr weniger dunkel-
braun 180
180. Mittleres Gewicht 181
Gewicht 6, oder höher **Leadhillit** 349
181. Wasserhell, milchweiss, durchsichtig oder un-
durchsichtig, schlecht krystallisirt 182
Gelbbraun, braun, giebt eine Eisenschlacke:
Spatheisenstein 174
182. Braust in Säuren stark auf **Kalkspath** 163
Braust darin langsam und schwer auf: **Dolomit** 164
183. Ritzt Glas 219
Ritzt Glas nicht 221
184. Vollkommener oder unvollkommener Metallglanz 185
Kein Metallglanz 196
185. Deutlicher Metallglanz 187
Halber Metallglanz 186
186. Nicht deutlich spaltbar; eisenschwarz, sehr
schwer:

Schwerbleierz.

Pb.


(a:a:∞ a:∞ c); (a:a:∞ a:c); (∞ a:∞ a:∞ a:c); eisen-
schwarz; dem Anlaufen und Mattwerden unterworfen; St. braun;
undurchsichtig; G. 9,4.

Mit andern Bleierzen wahrscheinlich bei Leadhills.

Spaltet # der Endfläche in dünne, elastische
Blättchen:

Einaxiger Glimmer.

Rhomboëdrischer Talkglimmer, Phyllit.



(a:a:∞ a:∞ c); (∞ a:∞ a:∞ a:c); (a:a:∞ a:c); tafelartig,
derb, schuppig; H. 2—2,5; G. 2,85; tombakbraun, ins Pechschwarze;

schwärzlichgrün, ins Rabenschwarze; in dünnen Blättchen durchsichtig; oft nur perlmutterglänzend; schwer schmelzbar; wasserfrei.

Eingewachsen im Granit, Basalt, Wacke etc. Mittelgebirge, Miask, Karosulik, Monroe, Vesuv, Andernach.

Spaltbar $\#$ der Endfläche in dünne, biegsame, nicht elastische Blättchen 186^a

186^a. In dünnen Blättchen in starker Schwefelsäure auflöslich; Strich grünlich grau bis berggrün:

Chorit.

Talkglimmer, z. Th. Talk, z. Th. Ripidolith.

Dünne sechsseitige Tafeln oder tafelförmige und cylindrische Krystallgruppen oder schuppige Aggregate; angeflogen, derb und eingesprengt. Grün in vielen Abänderungen; durchsichtig bis durchscheinend; H. 1—1,5; G. 2,7; wasserhaltig. Man unterscheidet:

Chlorit: $2 \text{Mg}^2 \text{Si} + \text{Mg} \text{Al} + 4 \text{H}$ und Ripidolith:

$2 \text{Mg}^2 \text{Si} + \text{Mg}^2 \text{Al} + 3 \text{H}$; jener brennt vor dem Löthrohre weiss und trübe und giebt ein graugelbes Email; während letzterer eine schwarze Masse giebt.

Bildet als Chloritschiefer Gebirgsmassen in den Alpen, in Norwegen und dem Fichtelgebirge und kommt schuppig oder erdig auf Gängen und Lagern verbreitet vor. Der Chloritoid vom Ural unterscheidet sich hauptsächlich durch grössere Härte (5).

In Schwefelsäure nicht löslich, Strich weiss bis grasgrün, fettig anzufühlen:

Talk.

Talkglimmer z. Th., Nakrit.

$\text{Mg}^6 \text{Si}^5$.

Gestalten des Chlorit; oft derb, in grossblättrigen, häufig wellenförmig gebogenen Massen; gewöhnlich schuppig, faserig und schiefrig als Talkschiefer. Weiss, ins Graue und Gelbliche, grünlichweiss, spargel-, apfel-, lauchgrün bis entenblau; H. 1—1,5; G. 2,6—2,8; unschmelzbar; der erdige Talk ist wohl Nakrit genannt.

Als Lager und als Gemengtheil: Alpen, Bodemais, Schweden, Ural. Ein Gemenge von Talk, Chlorit, Glimmer und Asbest bildet den Topfstein.

Farbe indigblau, bisweilen ins Stahlgraue, Strich glänzend schwarz:

Kupferindig.

Cu .

($a:a:\infty a:\infty c$); ($\infty a:\infty a:\infty a:c$); auch kugelig, nieren- und plattenförmig, derb, angeflogen; Fettglanz, in deutlichen Metallglanz geneigt; undurchsichtig; H. 1,5—2; G. 3,8; leicht zu einem Kupferkorne schmelzbar.

Leogang bei Salzburg, Sangershausen, Badenweiler und am Vesuv.

187. Bronzefarbig oder Kupferroth, selten stahlgrau 188
Silberweis bis grau 189

188. Zieht den Magnet an und giebt eine Eisenschlacke:

Magnetkies.

Leberkies, magnetischer Pyrrhotin, hexagonaler Eisenkies.

$\text{Fe}^{\text{e}} \text{Fe}$.

($a:a:\infty a:\infty c$); ($\infty a:\infty a:\infty a:c$); ($a:a:\infty a:c$) $126^{\circ} 52'$; seltener auch ($a:a:\infty a:\frac{1}{2}c$); ($a:\frac{1}{2}a:a:c$); ($a:\frac{1}{2}a:a:\infty c$); gewöhnlich dünn, tafelartig, spaltbar $\perp$ Geradendfläche, auch derb, dicht, eingesprengt, stalaktitisch, knollig; H. 3,5—4,5; G. 4,6; St. sich verdunkelnd, grünlichschwarz; schmelzbar.

Krystalle auf Gängen bei Andreasberg und im Meteorsteine von Juvenas; derb auf Lagern im Gneis, Granit, Grünstein: Bodemais, Schreibershau, Kupferberg.

Nicht magnetisch, reagirt auf Antimon:

Antimonnickel.

Ni Sb .

($a:a:\infty a:\infty c$); ($\infty a:\infty a:\infty c$); undeutlich spaltbar; auch derb, eingesprengt, dendritisch; licht kupferroth, ins Violblaue; H. 5; St. röthlichbraun; schwierig schmelzbar.

Auf dem Andreaser Orte bei St. Andreasberg.

189. Silberweiss, undeutliche Krystalle:

Antimonsilber.

Spiessglanzsilber, Arseniksilber, Silberspiessglanz.

$\text{Ag}^2 \text{Sb}$.

($a:a:\infty a:c$); ($a:a:\infty a:\infty c$); ($\infty a:\infty a:\infty a:c$); ist aber wahrscheinlich rhombisch oder beides; deutlich spaltbar $\ddagger$ Endfläche; auch derb, eingesprengt, körnig; H. 3—4; G. 9,8; oft bronzefarbig, gelb oder schwarz angelaufen; St. unverändert; schmelzbar.

Auf Gängen: Andreasberg, Wolfach in Baden.

Zinnweiss, unschmelzbar; selbst in Königswasser unlöslich:

Osmium - Iridium.

Jr Os.

($a:a:\infty a:c$) 124° ; $127^\circ 36'$; ($a:a:\infty a:\infty c$); ($\infty a:\infty a:\infty a:c$); tafelartig; theilbar $\ddagger$ ($\infty a:\infty a:\infty a:c$); meist in kleinen, losen Körnern; H. 7; G. 19,2—19,4; lässt sich mit Salpeter im Kolben zu einer grünlichen Salzmasse schmelzen und riecht dabei nach Osmium.

In Seifenwerken Brasiliens und des Urals. Man unterscheidet ein bleigraues, dunkles Osmium-Iridium (Jr Os³) mit G. 21—22,5 und auf Kohle schwarz werdend.

Blaugrau oder Eisengrau	190
190. Hell blaugrau, dünne Tafeln und danach spaltbar	191
Eisengrau	192
191. Unschmelzbar, färbt die Flamme grün, raucht auf Kohle etwas, giebt einen weissen Beschlag und riecht nach schwefeliger Säure; in heisser Salpetersäure löslich:	

Wasserblei.

Molybdänkies, Molybdänglanz.

Mo.

($a:a:\infty a:c$); ($a:a:\infty a:\infty c$); ($\infty a:\infty a:\infty a:c$); leicht spaltbar $\ddagger$ Endfläche; auch fächerförmig, derb, eingesprengt. Biigsam, milde, abfärbend, (auf Porzellan grünlichgrau) schreibend; St. unverändert.

Auf Gängen im Granit: Altenberg; im Glimmerschiefer in Tyrol; im Syenit bei Arendal.

Unschmelzbar, in starker Hitze entzündbar; eisenschwarz bis dunkel stahlgrau; in Säure unlöslich:

Graphit.

Eisengraphit, Reissblei.

C.


$(a:a:\infty a:c)$; $(a:a:\infty a:\infty a)$; $(a:\frac{1}{2}a:a:\infty a)$; $(\infty a:\infty a:\infty a:c)$; meist derb, plattkörnig, schuppig; eingesprengt, als Ueberzug; spaltbar $\parallel (\infty a:\infty a:\infty a:c)$; St. graulichschwarz, glänzend; undurchsichtig; in dünnen Blättchen sehr biegsam: H. 1—2; G. 1, 8—2, 1.

Borrowdale, Passau, Wunsiedel, Pargas, New-York.

Leicht schmelzbar:

Tellurwismuth.

Tetradymit, Wismuthspiegel.



$\frac{1}{2}(a:a:\infty a:c)$ $66^\circ 40'$; $(\infty a:\infty a:\infty a:c)$; $(a:a:\infty a:\frac{1}{2}c)$; meist Zwillinge mit sich kreuzender Hauptaxe; gehört also eigentlich in die hemiëdrische Abtheilung; erscheint als dünne sechseitige Tafeln; auch derb und in Körnern; dünne Blättchen biegsam, H. 2; G. 7, 5; bisweilen silberweiss; läuft leicht grau an.

Im Trachytconglomerate zu Schubkau bei Chemnitz; selenhaltig bei Tellemarken.

192. Krystalle langgezogen, längsgestreift; Tellur-reaction:

Gediegenes Tellur.

Gediegen Sylvan.

Te.


$(a:a:\infty a:c)$ $130^\circ 4'$; $115^\circ 12'$; $(a:a:\infty a:\infty c)$; $(\infty a:\infty a:\infty a:c)$; undeutlich spaltbar; kleine Krystalle, auch derb und körnig; zinnweiss; St. unverändert; H. 2—2, 5; G. 6, 1; leicht schmelzbar; enthält etwas Eisen und Gold.

Gänge in Grauwacke: Facebay in Siebenbürgen.

- Krystalle mit vorherrschender Endfläche . . . 193
 - mit sechseitiger Pyramide . . . 194
193. Dehnbar, an einer gewöhnlichen Wachslicht-
 flamme schmelzbar . . . **Kupferglanz** 243^a
 Nicht dehnbar; giebt auf Kohle ein Bleikorn:
Bleiantimonerz 244
194. Strich glänzend; sehr leicht schmelzbar:
Kupferglanz 243^a
 Zerbrechlich, von der Feile zerbröckelt . . 195
195. Giebt auf Kohle ein Silberkorn und Antimon-
 rauch . . . **Schilfglaserz** 245
 Giebt auf Kohle ein kupferhaltiges Silberkorn
 und Arsengeruch:

Mildglanzerz.

Eugenglanz, Polybasit.



(a:a:∞ a:c); (∞ a:∞ a:∞ a:c); tafelartig, undeutlich spalt-
 bar, auch eingesprengt; eisenschwarz bis schwärzlichbleigrau; St.
 unverändert; H. 2—2,5; G. 6—6,2.

Auf Gängen: Freiberg, Chemnitz, Andreasberg, Mexico.

196. Bedeutend schwer 197
 Mittleres Gewicht 202
 Leichter als Wasser:

Eis.

H.

(a:a:∞ a:∞ c); (∞ a:∞ a:∞ a:c); (a:a:∞ a:c); undeut-
 lich spaltbar, meist gestrickt, baumförmig; derb, körnig; farblos,
 durchsichtig, glasglänzend; H. 1—2; G. 0,94; bei 0° C zu Wasser,
 schmelzbar.

Krystalle finden sich häufig im Frühjahr unter wegschmelzen-
 den, Nachts wieder gefrorenen, dünnen Schneemassen.

197. Sehr schwer, über 6,5; gelb, grün oder braun . . 198
 Schwer, über 4; milchweiss bisweilen ins
 Grünliche, halbdurchsichtig 200

198. Gelb 199
Grün oder braun:

Buntbleierz.

Braun- und Grünbleierz, Pyromorphit, Traubenblei, Bleiblüthe, Flockenerz, Hedyphan, Miesit, Mimetesit, Kampylit, phosphorsaures und arsensaures Blei; Nussierit, Polysphärit.




fig. 86.


(a:a:∞ a:c) 80° 37'—81° 47'; (a:½ a:a:∞ c); (∞ a:∞ a:∞ a:c); (a:a:∞ a:2c); Zwillinge haben (a:a:∞ a:c) gemein; auch traubige, staudenförmige Gestalten und derb; grün, braun, gelb, morgenroth, hyacinthroth, braun, grau; St. weiss, ins Gelbliche, Fettglanz; durchscheinend; H. 3, 5—4; G. 6, 9; der Pyromorphit enthält $\ddot{\text{P}}$, der Mimetesit $\ddot{\text{A}}$, der Hedyphan beide; der Nussierit viel Ca.

Auf Bleierzgängen, meist im oberen Teufe, sehr verbreitet.

199. Sehr kleine, tafelförmige Krystalle:

Vanadinbleierz.

Erythronbleierz.



(a:a:∞ a:∞ c); (∞ a:∞ a:∞ a:c); auch kugelig und als Ueberzug; strohgelb, wachsgelb, röthlichbraun, kastanienbraun; St. weiss; undurchsichtig; Fettglanz; H. 3; G. 6, 8—7, 2; schmelzbar.

Zimapan in Mexico; bei Wanlockhead und Beresow.

Langgezogene, meist geringelte Krystalle:

Buntbleierz 198

200. Grosse, milchweisse Krystalle mit deutlichen Flächen 201


Kleine, zarte, nadelförmige, fast freie, oft etwas

grünliche Krystalle **Strontian** 265

201. Fast ohne Rückstand in Salpetersäure löslich:

Witherit 264

Ein grosser Theil bleibt ungelöst:

Schwefelkohlensaurer Baryt.

(a:a:∞ a:c); (a:a:∞ a:∞ c) weiss; Glasglanz, durchscheinend; H. 3; G. 4,14.

Brownley-Hill in Cumberland.

202. Krystalle sind 6seitige Säulen mit der geraden Endfläche 203
 Krystalle sind 6seitige Säulen mit der 6seitigen Pyramide und ohne gerade Endflächen 183
 203. Sie ritzen das Glas 204
 Sie ritzen Glas nicht 206
 204. Durchsichtig oder durchscheinend 205
 Undurchsichtig, schmutziggrau, braungrau, mit drei Spaltungen auf den abwechselnden Kanten **Korund** 160
 205. Smaragd- oder meergrün, oder himmelblau; enthält Beryllerde.

Smaragd.

B e r i l, A q u a m a r i n.




fig. 86. 87.

(a:a:∞ a:c) 151° 9'; 59° 46'; (a:a:∞ a:2:c); (a:a:∞ a:3:c); (a:½:a:a:c); (a:½:a:a:2:c); (a:⅓a:½:a:c); (a:a:∞ a:∞ c); (∞ a:∞ a:∞ a:c); spaltbar $\ddagger$ Endfläche; auch derb, stängelig, in Körnern; auch farblos, weiss und gelb; Glasglanz; St. weiss; H. 7—8; G. 2,7; schwer schmelzbar.

Eingewachsen in granitischem Gestein und auf Gängen: Pinzgau, Schlesien, Baiern, Schweden, Ural, Elba; Beril und Aquamarin haben längsgestreifte, lang gezogene Säulen.

Es gehört hierher wahrscheinlich der grünlichgelbe, durchscheinende, bei Aberdeen in Schottland vorkommende, Davidsonit.

Lichtegrün, graulichgrün; enthält phosphorsaure Thonerde und Talkerde;

Chlorophyllit.

Niedrige sechsseitige Säulen; basisch spaltbar; Bruch uneben ins Muschelige; durchscheinend; St. weiss; fatter Glasglanz; H. 7;

G. 2,7; unvollkommen schmelzbar. Enthält Kieselsäure 45; phosphorsaure Thonerde 28; Talkerde 10; Eisenoxydul 8; Manganoxydul 4; Wasser 4.

In den Gruben von Neal in Nordamerika.

In der Richtung der Axe blau, senkrecht auf dieselbe gelblichgrau **Dichroit** 285

206. Krystalle durchscheinend, milchweiss oder doch sehr hell gefärbt 207

Krystalle grün, blaugrün, blauviolett, schwarzbraun 213

Krystalle hemiëdrisch; honiggelb, orangeroth, selten bräunlich:

Greenockit.

Cd .

($a:a:\infty a:c$); ($a:a:\infty a:c$); $136^\circ 20'$; ($a:a:\infty a:\frac{1}{2}c$); ($a:a:\infty a:2c$); ($\infty a:\infty a:\infty a:c$); am einen Ende nur ($a:a:\infty a:\frac{1}{2}c$) und ($\infty a:\infty a:\infty a:c$); demantartiger Fettglanz; durchscheinend bis halbdurchsichtig; H. 3,5; G. 4,8.

Bei Bishopton in Schottland im Trapp.

207. Blätterdurchgang des **Kalkspath** 163

Keine Spaltungsflächen 208

208. Ritzt den Kalkspath 209

Ritzt ihn nicht 210

209. Krystalle kurz, durchscheinend, weiss, grau, violett, rosenroth, grünlich; gelblichweiss, ochergelb:

Apatit.

Spargelstein, Phosphorit, phosphorsaurer Kalk, Moroxit, Euklasit.




fig. 88.

($a:a:\infty a:c$); $142^\circ 15'$; $80^\circ 38'$; ($a:a:\infty a:\frac{1}{2}c$); ($a:a:\infty a:2c$); ($a:\frac{1}{2}a:a:c$); ($a:\frac{1}{2}a:a:\frac{1}{2}c$); ($a:\frac{1}{2}a:a:2c$); ($a:a:\infty a:\infty c$); ($a:\frac{1}{2}a:a:\infty c$); $\frac{1}{2}$ ($a:\frac{1}{3}a:\frac{1}{2}a:\infty c$); $\frac{1}{2}$ ($a:\frac{1}{4}a:\frac{1}{3}a:\infty c$); und die gedrehten Zweimalsechsfächner $\frac{1}{2}$ ($a:\frac{1}{2}a:\frac{1}{2}a:c$); ($a:\frac{1}{4}a:\frac{1}{3}a:c$); spaltbar


‡ Endfläche und Hauptpyramide. Auch nierenförmig, eingesprengt, faserig, derb, erdig; Glasglanz, Fettglanz, matt; H. 5; G. 3,2; schmelzbar.

In granitischen und vulkanischen Gesteinen, auf Lagern und Gängen: Laacher See, Vesuv, Arendal, Sachsen, Böhmen, Tyrol, Gotthard. Talkerdehaltig ist der Talkapatit von Kusiusk.

Krystalle dunkelgrau bis schwarz: **Perowskit** 34
210. Wasserfrei; sitzt auf vulkanischem Gestein:

Nephelin.

Fettstein, Eläolith, Giesekit, Cavolinit, Indianit, Davyn, Cancrinit.



(a:a:∞ a:c); 139° 19'; 88° 6'; (a:a:∞ a:∞ c); (∞ a:∞ a:∞ a:c); undeutlich spaltbar; auch derb, körnig; farblos, weiss, grün, blau, roth; St. weiss; durchsichtig bis schwach durchscheinend; H. 5,5—6; G. 2,5; schwer schmelzbar. Der nur am Vesuv gefundene Davyn zeigt meist auch die zweite Säule, enthält 6—12 pC. Kalk, ist etwas leichter schmelzbar und ärmer an Kali.

Nephelin: Vesuv, Capo di Bove, Mittelgebirge, Löbau; Eläolith (derb): Laurwig, Frederiksvärn; Giesekit: Grönland; Cancrinit: im Miascit des Ilmengebirges. Zum Eläolith scheinen auch der Phönit und Lithrodes aus Norwegen zu gehören.

Wasserfrei; kommt in Feldspathporphyr vor:

Liebenerit.


Pseudomorph; blass grünlichgrau; etwas fettglänzend; kantendurchscheinend; Bruch uneben; erdig; H. 3; unschmelzbar. Besteht vielleicht aus Steinmarkmasse.

Fleimser Thal in Tyrol.

Wenigstens 15 pC. Wasser haltend 211
211. Mandelsteinen angewachsen; zu einem weissen Email schmelzbar:

Emelinit.

H y d r o l i t, S a r k o l i t h.



(a:a:∞ a:c) 141° 1'; 83° 36'; (a:a:∞ a:∞ c); (∞ a:∞ a:∞ a:c); weiss, ins Fleischrothe; St. weiss; durchscheinend; H. 4,5; G. 2,05.

Bei Vicenza und zu Glenarm.

Unschmelzbar 212

212. Aus der Lösung in Säuren fällt Ammoniak
wenigstens 60 pC. Thonerde:

Hydrargillit.

(a:a:∞ a:c); (∞ a:∞ a:∞ a:c); (a:a:∞ a:∞ c); leicht spaltbar $\#$ Endfläche; auch derb; licht röthlichweiss; Endfläche perlmutterglänzend, übrigens Glasglanz; durchscheinend; H. 2—2,5; auf der Endfläche 3. Äl, H und sehr wenig Ca.

Im Talkschiefer bei Slatoust.

Aus der Lösung fällt kohlen-saures Ammoniak
Bittererde:

Talkhydrat.

N e m a l i t, B r u c i t.

Mg H.

(a:a:∞ a:∞ c); (∞ a:∞ a:∞ a:c), auch plattenförmig, schalig, derb. Leicht spaltbar $\#$ Endfläche. Perlmutterglanz; weiss, ins Grüne und Graue; durchscheinend; in dünnen Blättchen biegsam; H. 2; G. 2,35; unschmelzbar. Der Nematit enthält auch Kieselsäure, Eisenoxyd und Kohlensäure.

Im Serpentin: Hoboken in New-Jersey, Unst, Portsoy.

213. Hellgrün bis bouteillengrün 214

Braun, schwarzbraun, schwarz 216

Blauviolett, aussen dunkel; Strich weiss; fettig
anzufühlen:

Kämmerelit.

2 Mg Si + (Äl Cr) Si + 2 H.

(a:a:∞ a:∞ c); undeutliche Endflächen; basisch spaltbar; auch blättrige Massen und eingesprengte Schuppen; dünne Blättchen biegsam und durchsichtig; H. 2; G. 2,76; blättert sich in der Flamme auf und giebt brenzlich riechendes Wasser, ohne zu schmelzen.


Im Chromeisen bei Bisersk in Sibirien.

214. Spaltbar $\#$ Endfläche 215

Bruch muschelrig oder körnig:

Pinit.


G i e s e k i t.



(a:a:∞ a:∞ c); (a:½ a:a:∞ c); (a:a:∞ a:c); (∞ a:∞ a:∞ a:c); undeutlich spaltbar; auch derb, eingesprengt; grünlichgrau, olivengrün, bräunlichroth, röthlichbraun; undurchsichtig; schimmernd, bis schwach fettglänzend; H. 2—2,5; G. 2,8; schwer schmelzbar.

Im Granit: Schneeberg, Iglau, Auvergne, Grönland. Es gehört hierher vielleicht der schneeweisse, leicht schmelzbare Oosit aus dem Feldspathporphyr von Geroldsau im Badenschen.


215. Reagirt auf Chlor:

Pyrosmalith.

(a:a:∞ a:∞ a); (∞ a:∞ a:∞ a:c); vollkommen theilbar # Endfläche; auch derb, körnig; hell leberbraun ins Graue und Grüne; fast undurchscheinend; St. etwas heller; H. 4—4,5; G. 3.

Auf Eisengruben in Wermeland in Schweden.

Reagirt nicht auf Chlor:


Bonsdorffit.

(a:a:∞ a:∞ c); (∞ a:∞ a:∞ a:c); fast cylindrisch; spaltbar # Endfläche; grünlichbraun, dunkel olivengrün; kantendurchscheinend.

Im Granit bei Abo in Finnland.

216. Krystalle spaltbar nach der Endfläche . . . 217
 - nicht spaltbar . . . 218

217. 12seitige Prismen mit der Endfläche; nimmt vom Nagel Eindrücke an; Strich braun:


Gigantolith.

Bis 1½ Zoll dick; bräunlichgrau; fettig anzufühlen; leicht schmelzbar zu einer grünlichen Schlacke.

Im Gneis bei Tammela in Finnland.

So hart wie Kalkspath; Strichpulver lauchgrün:

Cronstedtit.



(a:a:∞ a:∞ c); (∞ a:∞ a:∞ a:c); auch nierenförmig, dickstängelig, derb; Prismen längsgestreift; Glasglanz; sammetschwarz; undurchsichtig; dünne Blättchen elastisch; H. 2,5—3; G. 3,35; schwer schmelzbar.

Auf einem Gange bei Przibram.

Sechsseitige Säule, ritzt Flussspath, kaum an den Kanten schmelzbar, durchscheinend, Strich gelblichgrau:

Clintonit.

C h r y s o p h a n, H o l m i t.

(a:a:∞ a:∞ c); (∞ a:∞ a:∞ a:c); auch derb; gelblichbraun, ins Kastanienbraune; Glasglanz, auf der Spaltungsfläche Perlmutterglanz; H. 4—4,5; G. 3; brennt sich weiss und undurchsichtig.

Findet sich im körnigen Kalkstein bei Warwick in New-York.

Ritzt nur Steinsalz, unschmelzbar; Strich schwarz bis braunroth; sechsseitige Säule:

Rubellan.


A s t e r g l i m m e r.

(a:a:∞ a:∞ c); (∞ a:∞ a:∞ a:c); deutlich spaltbar $\ddagger$ Endfläche und undeutlich nach einem Rhomboëder; pechschwarz bis brannroth, undurchsichtig; Perlmutterglanz; St. wie die Farbe; H. 2—3; G. 2,7.

In vulkanischen Gesteinen: Böhmisches Mittelgebirge, Laacher See, Vesuv; in Wacke und Porphyr: Sachsen.

218. Sammtscharz, leicht schmelzbar:

Sideroschisolith.




(a:a:∞ a:c); (a:a:∞ a:∞ a); (∞ a:∞ a:∞ a:c) $\frac{1}{2}$ (a: $\frac{1}{2}$ a:a:xc); spaltbar $\ddagger$ Endfläche(?); St. dunkellauchgrün; H. 2,5; G. 3.

Mit Spatheisenstein zu Conghonas do Campo in Brasilien.

Hellbraun, bis braunschwarz, unschmelzbar.

Fluocerit.

Flusssaures Cerium.



($a:a:\infty a:c$); ($\infty a:\infty a:\infty a:c$); in Platten, derb; auch blassziegelroth; St. gelblichweiss; undurchsichtig bis kantendurchscheinend; H. 3—7; G. 4, 7.

Zu Brodbo und Finbo bei Fahlun in Albit und Quarz.

219. Sehr hart; Krystalle klein, bläulich, blau oder rosenroth **Saphir** 160
Ritzt nur Glas 220

220. Prismen horizontal gestreift, gross; ($a:a:\infty a:c$) sehr glänzend und meist ungleich:

Quarz.

Bergkrystall, Citrin, Rauchquarz, Amethyst, Morion, Eisenkiesel.

Si.

fig. 89. 90.

($a:a:\infty a:c$) $133^\circ 44'$; $103^\circ 35'$; ($a:a:\infty a:3c$); ($a:a:\infty a:\infty c$); ($a:\frac{1}{2}a:a:c$); $\frac{1}{2}$ ($a:\frac{1}{2}a:a:c$); $\frac{1}{2}$ ($a:\frac{1}{4}a:\frac{1}{3}a:c$); ($a:\frac{1}{8}a:\frac{1}{5}a:c$); $\frac{1}{2}$ ($a:\frac{1}{8}a:\frac{1}{7}a:c$); $\frac{1}{2}$ ($a:\frac{1}{5}a:\frac{1}{4}a:c$); undeutlich spaltbar; Bruch muschelig; auch derb; farblos, graubraun, roth, gelb, blau, violett, schwarz; St. weiss; wasserhell bis undurchsichtig; H. 7; G. 2, 6; unschmelzbar.

Namentlich im älteren und plutonischen Gebirge überall

Zum dichten Quarz gehört der traubige, nierenförmige oder tropfsteinartige, matte, im Bruche flachmuschelige oder grobsplittrige: Chalcedon (mit Dendriten gezeichnet: Mookastein; mit weisser und brauner Lage: Onyx); der blutrothe: Karniol; der lauchgrüne: Plasma; der apfelgrüne: Chrysopras; der dunkellauchgrüne, blutroth punktirte: Heliotrop; der grau-, gelb-, roth-, braungefärbte, undurchsichtige: Jaspis; der grobschiefrige, graue oder schwarze, flachmuschelige: Kieselschiefer (Lydischer Stein); der kantendurchscheinende, unrein gefärbte: Hornstein und der durch Glühen weiss werdende: Feuerstein. Achat ist ein Gemenge verschiedener Quarzvarietäten.

Zum erdigen Quarz gehören: der Schwimmstein, der Kieseltuff, Kieselsinter, Fiorittrippel und der Fulgurit-quarz (Blitzsinter, Blitzröhren); mit Glimmerschüppchen verwachsener Quarz bildet den Avanturin; mit Cyanit und Amianth gemengter das Katzenauge.

Meist undeutliche, kleine Krystalle mit platten

Säulenflächen **Humit** 362

221. Etwas härter als Kalkspath 222

Härte höchstens der des Kalkspaths gleich . 223

222. Krystalle gelb oder gelbgrün; in Säuren löslich

Apatit 209

Krystalle durchsichtig, milchweis, unlöslich in

Säuren:

Gerschelit.

Si, Al, K.

(a:a:∞ a:c) 124° 45'; (a:a:∞ a:∞ c); (∞ a:∞ a:∞ a:c); theilbar $\nparallel$ Endfläche; Bruch muschelrig; Perlmutterglanz, Endfläche matt; H. 4, 5; G. 2, 1. Bei Acireale auf Sicilien.

223. Spaltet in Rhomboëder **Kalkspath** 163

Keine deutliche Spaltungsflächen 224

224. Giebt beim Calciniren gesäuertes Wasser und einen Rückstand von schwefelsaurem Eisen:

Coquimbite.

Fe Si³ + 9 H.

(a:a:∞ a:c) 128° 8'; 58°; (a:a:∞ a:∞ c); (a:½ a:a:∞ c); (∞ a:∞ a:∞ a:c); undeutlich spaltbar $\nparallel$ (a:a:∞ a:c) und (a:a:∞ a:∞ c); auch derb, körnig; Bruch muschelrig; weiss, ins Violblaue; bei Copiapo in Chili.

Entwickelt nur reines Wasser beim Calciniren, ohne sein Ansehen zu ändern:

Federerit.


(Ca³ Na³) Si² + 3 Al Si + 6 H.

(a:a:∞ a:c); (a:a:∞ a:∞ c). Findet sich am Cap Blomidon in Neu-Schottland.

Mineralien des rhombischen oder ein- und einaxigen Systems.

225. In Wasser löslich 226
 In Wasser unlöslich 229
 226. Durchscheinend, farblos oder milchweiss . . . 227
 Schwach gelb gefärbt **Uranvitriol** 319^a
 Blass fleisch- bis ziegelroth, ins Gelbe, rauch-
 und perlgrau:

Polnhalit.



(a:b:∞ c) 115°; (a:∞ b:∞ c); (∞ a:∞ b:c); meist derb;
 Fettglanz; St. ungefärbt; durchscheinend; H. 3—3,5; G. 2,77; Ge-
 schmack mehr bitter als salzig; schmelzbar; löst sich unter Ab-
 scheidung von Gyps leicht in Wasser.

Mit Steinsalz bei Aussen, Ischel, Berchtesgaden.

227. Auf Kohle decrepirend 228
 Auf Kohle schmelzend, salzigkühlend schmeckend:

Kalialpeter.




fig. 91.


(a:b:∞ c) 119°; (a:∞ b:∞ c); (a:∞ b:c); (a:∞ b:2 c);
 (a:∞ b:3 c); (a:b:c); (a:b:½ c); auch krustenförmig, flockig,
 dünnstängelig; Bruch muschelrig; Glasglanz; H. 2; G. 1,9.

Efflorescirt aus Erde und Steinen: Ungarn, Spanien, Ostindien.

Auf Kohle schmelzbar, dann zu einer un-
 schmelzbaren Masse sich aufblähend; Ge-
 schmack zusammenziehend und widerlich
 metallisch:

Zinkvitriol.

Weisser Vitriol, Gallitzenstein.




(a:b:∞ c) 90° 20'; (∞ a:b:∞ c); (a:b:c) 127° 27'; 126° 45';
 78° 5'; (a:∞ b:c); (∞ a:b:c); auch tropfsteinförmig und derb;

deutlich theilbar $\ddagger$ ($\infty a:b:\infty c$); weiss, ins Röthliche und Bläuliche; durchsichtig bis durchscheinend; H. 2—2,5; G. 2.

Rammelsberg bei Goslar, Chemnitz, Fahlun.

Auf Kohle schmelzbar; mit Säuren aufbrausend, luftbeständig:

Urao.




($a:2b:\infty c$) $107^{\circ} 50'$; ($a:\infty b:c$); ($a:\infty b:c$) $83^{\circ} 50'$; ($a:b:c$) $141^{\circ} 48'$; $52^{\circ} 9'$; $145^{\circ} 52'$; weiss oder gelblichgrau; durchsichtig bis durchscheinend; H. 2,5—3; G. 2,1; schmeckt scharf laugenhaft.

In Natronseen in Columbien, Aegypten, Russland.

Auf Kohle schmelzend und sich verflüchtigend:

Alascagnin.

Schwefelsaures Ammoniak.



($a:b:\infty c$) $72^{\circ} 27'$; ($\infty a:b:\infty c$); ($a:b:c$) $112^{\circ} 24'$; $131^{\circ} 54'$; $78^{\circ} 12'$; deutlich spaltbar $\ddagger$ ($\infty a:b:\infty c$); auch tropfstein- und krustenförmig; weiss, ins Graue und Gelbe; durchsichtig bis durchscheinend; schmeckt scharf urinös und bitter.

Vesuv, Solfatara, Aetna, Siena.

Auf Kohle schmelzend; schmeckt unangenehm salzigbitter und reagirt auf Kali und Schwefelsäure, aber geschmolzen nicht alkalisch:

Schwefelsaures Kali.




fig. 100.

($a:2b:\infty c$) $67^{\circ} 52'$; ($a:b:c$) $131^{\circ} 15'$; $112^{\circ} 32'$; $87^{\circ} 34'$; ($a:b:\infty c$); ($a:\infty b:\infty c$); ($\infty a:b:\infty c$); ($a:c:\infty b$); auch als windenartiger Ueberzug; weiss, graulich und gelblich; durchsichtig bis durchscheinend; H. 2,5—3; G. 1,73.

Findet sich auf Laven am Vesuv.

228. Schmeckt sehr bitter:

Bittersalz.

H a a r s a l z.





fig. 92.

(a:b:∞ c) 90° 38'; (a:b:c) 127° 22'; oft nur halbflächig; (b:∞ a:∞ c); (a:∞ b:c); (∞ a:b:c); (a:2b:c); auch trauben-, nieren-, krustenförmig, mehlartig, stängelig; Glasglanz; durchsichtig bis durchscheinend; H. 2—2,5; G. 1,75.


Efflorescirt aus Erde und Gestein: Ungarn, Böhmen, Freiberg, Clausthal, Spanien, Sibirien.

Schwacher Kochsalzgeschmack:

Chenardit.

(a:b:∞ c); (a:b:c); (∞ a:∞ b:c); spaltbar $\ddagger$ Endfläche; weiss, halbdurchsichtig; G. 2,7. In den Salinen von Espartinas bei Madrid.

229. Glanz vollkommen oder unvollkommen metallisch	230
Glanz nicht metallisch	249
230. Deutlicher Metallglanz	231
Unvollkommener Metallglanz	312
231. Gelbgrünlich oder bronzefarbig	232
Silberweis. grün oder eisengrau	234
232. Gelb oder gelbgrün	233
Bronzefarbig oder tombackbraun:	

Sternbergit.

(a:b:c) 128° 49'; 84° 28'; 118°; (a:b:2c); (a:½b:c); (∞ a:∞ b:c); (∞ a:b:2c); (∞ a:b:3c); (a:∞ b:⅓c); (∞ a:b:∞ c); stets tafelartig, auch derb; spaltbar $\ddagger$ Endfläche; in dünnen Blättchen biegsam; St. schwarz; H. 1—1,5; G. 4,2; schmelzbar.

Auf Silbergängen zu Joachimsthal, Johann Georgenstadt und Schneeberg.

Vielleicht gehört hierher der tafelartige, anscheinend ein- und

eingliedrige, schwärzliche, sehr wenig biegsame Silberglanz aus Ungarn oder Sachsen.

233. Hell speisgelb, ins Grüne und Graue fallend:

Binarkies.

Strahlkies, Leberkies, Speerkies, Wasserkies, Graueisenkies, Vitriolkies.

Fe.

fig. 93. 94.

(a:b:∞ c) 106°; (∞ a:∞ b:c); (a:b:c); (∞ a:b:c); (a:∞ b:c); (∞ a:b:½ c); Zwillinge haben (a:b:∞ c) gemein; spaltbar $\parallel$ (a:b:∞ c); auch kammförmig, kugelig, nierenförmig, röhrenförmig, derb, stängelig; H. 6; G. 4, 8; Str. schwärzlich.

Auf Gängen im älteren Gebirge überall.

Dunkel grünlichgelb	Kupferkies	107
234. Silberweiss		235
Grau bis eisengrau		236
235. Giebt auf Kohle starken Arsengeruch, Strich graulichschwarz		235 ^a
Giebt oft einen Rettichgeruch; undeutliche Prismen:		

Weisstellur.

Gelberz, Tellursilberblei, Sylvanerz.




fig. 99 ähnlich.

(a:b:∞ c) 105° 30'; (a:b:c); (a:∞ b:c); (∞ a:b:c); (∞ a:∞ b:c); meist in flachen, nadelförmigen Prismen oder eingewachsene Blätter; undeutlich spaltbar; silberweiss, ins Gelbliche geneigt; weich; G. 10, 6.

Auf Gängen bei Nagy-Ag in Siebenbürgen.

235^a. Schmilzt auf Kohle leicht, undeutlich spaltbar:

Arsenikkies.

Rauschgelbkies, Weisserz, (Giftkies, Mispickel, Vermonit, Dalarnit und Akonit), Danait.




fig. 95.

(a:b:∞ c) 111° 53'; (∞ a:b:c); (∞ a:b:½ c); 118° 32'; (∞ a:b:¼ c); 145° 26'; (a:∞ b:c) 59° 22'; Zwillinge (a:∞ b:c) oder

(a:b:∞ c) gemein; auch derb, eingesprengt; H. 5—6; G. 6; oft gelblich angelaufen; der Danait hat 6 pC. Kobalt.

Auf Lagern und Gängen im älteren Gebirge: Freiberg, Schladming, Reichenstein, Kupferberg, Andreasberg, Tunaberg, Sala, Amerika.

Schmilzt schwer und nur an der Oberfläche;
deutlich spaltbar $\#$ (∞ a:∞ b:c):

Arsenikalkies.

Arsenikeisen, Glanzarsenikkies, Arsenosiderit.

Fe As².

fig. 96.

(a:b:∞ c) 122° 26'; (a:∞ b:c) 51° 20'; auch derb, eingesprengt, stängelig; H. 5—6; G. 7, 2; bis stahlgrau; enthält auch wohl etwas Ni und Co.

Auf Lagern: Hüttenberg, Schladming, Reichenstein, Ehrenfriedrichsdorf, Fossum, Modum.

236. Hell graublau, starker Metallglanz	237
Eisengrau, ins Schwarze	241
237. Säulenflächen vorherrschend	238
Säulen kurz, mit der Querfläche	240
238. Blätterig, leicht schmelzbar	239
Nicht blättrig; leicht schmelzbar	238 ^a
238 ^a . Strich bleigrau:	

Wismuthglanz.

Bi.

(a:b:∞ c) 91° 30'; (a:∞ b:∞ c); (a:∞ b:c); (∞ a:b:c); (a:∞ b:x:c); vollkommen theilbar $\#$ (a:∞ b:∞ c); meist derb, körnig, stängelig; bleigrau, etwas ins Stahlgrau; H. 2—2, 5; G. 6, 5.

Auf Gängen und Lagern: Erzgebirge, Württemberg, Ungarn, Schweden, Cornwall, Sibirien.

Strich schwarz:

Kupferantimonglanz.

Cu + Sb.

∞ c) 135° 12 und ein anderes Prisma von 110° mit der theilbar nach letzterer, die längsgestreift ist; bisweilen

pfauenschweifig angelaufen; St. matt und schwarz; H. 3, 5; G. 4, 75.
Bei Wolfsberg am östlichen Harze.

239. Sehr blättrig $\#$ ($\infty a:b:\infty c$), sehr leicht
schmelzbar; Antimonrauch:

Grauantimonerz.

Antimonglanz, Grauspiessglanzerz, Federerz, z. Th.

Sb.

fig. 97.

($a:b:c$) $109^{\circ} 16'$; $108^{\circ} 10'$; $110^{\circ} 59'$; ($a:b:\frac{1}{3}c$); ($\frac{1}{2}a:b:c$);
($a:2b:\frac{2}{3}c$); ($a:\infty b:\frac{2}{3}c$); ($a:\infty b:\frac{1}{2}c$); ($a:b:\infty c$); ($a:\infty a:\infty c$);
auch nadelförmig, büschelförmig, derb, strahlig; H. 2, etwas biegsam;
G. 4, 6; St. unverändert.

Auf Gängen: Untrop, Neudorf, Wolfsberg, Goldkronach, Alle-
mont, Felsöbanya.

Blättrig; leicht schmelzbar; Rettichgeruch:

Schrifterz.

Schrifttellur, Schriftglanz, Tellurgold, Schriftgold.

$\text{Ag Te} + 6 \text{ Au Te}^3.$

fig. 98.

($2a:b:x:c$) $85^{\circ} 40'$; ($a:\infty b:\infty c$); ($\infty a:b:\infty c$); ($b:c:\infty a$)
 125° ; ($a:b:c$); ($a:b:2c$); ($4a:3b:2c$); ($a:\frac{1}{2}b:c$); spaltbar $\#$
($\infty a:b:\infty c$); meist knieförmig verwachsene; Nadeln, gestrickt;
H. 1—2; G. 5, 8.

Auf Gängen bei Offen-Banya in Siebenbürgen.

240. Hellgrau bis eisenschwarz; glänzender musche-
liger Bruch; reagirt auf Kupfer:

Bournonit.

Antimonbleierz, Schwarzspiessglanzerz, Bleifahlerz
und Spiessglanzbleierz; Rädelerz.

$\text{Cu}^3 \text{Sb} + 2 \text{Pb}^3 \text{Sb.}$

fig. 99.

($2a:b:\infty c$) $96^{\circ} 31'$; ($a:\infty b:\infty c$); ($\infty a:\infty c:b$); ($a:\infty b:c$)
 $50^{\circ} 51'$; ($2a:\infty b:c$); ($\infty a:b:2c$) $54^{\circ} 48'$; ($\infty a:b:c$); ($\infty a:b:\frac{1}{2}c$);


($a:b:c$); ($a:\frac{1}{2}b:\frac{1}{2}c$); ($\infty a:\infty b:c$); Zwillinge haben ($\infty a:b:c$)
gemein; auch derb, zackig, zerfressen, angeflogen; St. unverändert;
Papier etwas schwärzend; H. 2, 5—3; G. 5, 76; leicht schmelzbar.
Auf Gängen: Redruth, Kapnik, Andreasberg, Neudorf, Wolfsberg.

Bleigrau; Bruch unvollkommen muschelrig; in
zwei Richtungen spaltbar; reagirt nicht auf

- Kupfer **Plagionit** 323
241. Stahlgrau; starker Metallglanz 242
Schwarz, fast unvollkommener Metallglanz 247
242. Hart, ritzt Glas **Manganepidot** 279
Längliche Prismen, weich, ritzt Glas nicht. 243
243. Gewicht 7, leicht schmelzbar, beschlägt die
Kohle gelb und hinterlässt ein Goldkorn:

Blättertellur.

Tellurglanz, Blättererz, Graugolderz, Nagyager Erz.



($a:b:\infty c$); ($\infty a:\infty b:c$); ($a:\infty b:\infty c$); ($a:b:c$); ist spaltbar
‡ ($a:\infty b:\infty c$); gewöhnlich derb; in Blättchen eingesprengt;
schwärzlichbleigrau; St. unverändert; in dünne Blättchen sehr biegsam;
H. 1—1, 5; G. 7—7, 2.

Auf Gängen bei Nagy-Ag und Offenbanya.

Gewicht 5, 7; sehr milde, lässt sich wie Blei
schneiden 243^a

243^a. Giebt auf Kohle ein Kupferkorn; spritzt beim
Schmelzen stark und reagirt auf Kupfer:

Kupferglanz.

Kupferglas.

Cu.


($a:2b:\infty c$) $54^{\circ}20'$; ($\frac{2}{3}a:b:\infty c$); ($a:\infty b:\infty c$); ($\infty a:b:\infty c$);
($\infty a:\infty b:c$); ($a:b:c$) $126^{\circ}53'$; $125^{\circ}22'$; $80^{\circ}6'$; ($a:b:3c$);
($a:\infty b:c$); ($3a:\infty b:4c$); Zwillinge haben ($a:\infty b:c$) oder ($a:b:2c$)
gemein; undeutlich spaltbar; auch derb, schwärzlichbleigrau; ins
Stahlgrau, Eisenschwarze und Nelkenbraune, oft lasurblau oder
stahlfarbig angelauten; H. 2, 5—3; G. 5, 7.

Auf Gängen: Redruth, Frankenberg, Nassau, Kapnik, Kongsberg.

Giebt bei der Cupellation ein Silberkorn:

Silberkupferglanz.

Kupfersilberglanz.



(a:2b:∞ c) 50° 58'; (∞ a:b:∞ c); (a:∞ b:∞ c); (a:b:c) 51° 37'; 155° 17'; 135° 47'; (a:∞ b:c); Zwillinge wie bei voriger Art; auch derb, in Platten, eingesprengt; schwärzlichbleigrau; H. 2, 5—3; G. 6, 25.

Zu Rudolstadt in Schlesien und am Schlangenberge im Altai.

G. 5—6; leicht schmelzbar mit Antimonrauch 244

G. etwa 4; unschmelzbar und kein Antimonrauch; reagirt auf Mangan 246

244. Sechsseitige Prismen, ohne Spaltungsfläche, reagirt weder auf Kupfer noch auf Blei:

Sprödglanzerz.

Sprödglanzerz, z. Th. Schwarzgültigerz, z. Th. Schwarzsilberglanz, Antimonsilberglanz.




fig. 100.


(a:b:∞ c) 111° 8'; (2a:b:∞ c); ($\frac{1}{2}$ a:b:c); (a:∞ a:∞ c); (∞ a:b:∞ c); (∞ a:∞ b:c); (a:b:c); (a:2b:c); (a:∞ b:c); Zwillinge haben (a:∞ b:c) gemein; auch kugelig, derb, angeflogen, zerfressen, eingesprengt; Bruch muscheligen bis uneben; H. 2—2, 5; G. 6, 3; St. unverändert; leicht schmelzbar.

Auf Gängen: Freiberg, Joachimsthal, Przibram, Chemnitz.

Anscheinend sechsseitige, längsgestreifte Säulen mit auf den Kanten aufgehäuften, niedrigen Bipyramidaldodekaederflächen; reagirt auf Blei:

Bleiantimonerz.

Zinkenit.




Die Endflächen bilden mit den Säulenflächen einen Winkel von 102° 42'; die Winkel der Säulenkanten sind ungleich; vielleicht

sind die Krystalle Drillinge; undeutlich theilbar; dunkelstahlgrau, ins Bleigraue geneigt; Strich unverändert; H. 3—3,5; G. 5,31; decrepitirt und schmilzt.

Auf der Jost-Christianszeche bei Wolfsberg am Harze.

Sechsseitige Säule mit dem Querprisma; reagirt auf Kupfer und Blei:

Antimonkupferglanz.



(a:b:∞ c); (a:∞ b:∞ c); (a:∞ b:c); ziemlich deutlich spaltbar $\ddagger$ (a:∞ b:∞ c); auch derb; schwärzlichbleigrau, ins Eisenschwarze; St. unverändert; H. 3; G. 5,7; unter Brausen schmelzbar.

Mit Spatheisenstein im Lavanthale in Kärnthen.


Rhombische Säulen von höchstens 102°, oder sechsseitige Säulen mit deutlichen, verschiedenen Winkeln von 100—130°

245

245. Zwei deutliche Spaltungsrichtungen, dem rhombischen Prisma von 100° parallel; auf Kohle ein Silberregulus:

Schilfglaserz.

Biegsames Schwefelsilber, Basitomglanz.




(a:b:∞ c) 89°; (∞ a:b:∞ c); (∞ a:∞ b:∞ c); (∞ a:b:c) 68°; Zwillinge ähnlich, wie beim Staurolith; auch derb und eingesprengt; Säulenflächen längsgestreift; St. nicht verändert; H. 2—2,5; G. 5,5—6.

Auf Gängen bei Freiberg, Ratiborzig.

Keine Spaltungsflächen, viel Blei enthaltend:

Querantimonerz.

Jamesonit, Stahlantimonglanz.



(a:b:∞ c) 101° 20'; (a:∞ b:∞ c); auch derb; büschelförmig, stängelig; spaltbar $\ddagger$ (∞ a:∞ b:∞ c) c $\ddagger$ (a:b:∞ c); Strich unverändert; H. 2—2,5; G. 5,56.

Cornwall, Ungarn, Sibirien, Spanien, Brasilien.

246. Strich graulich schwarz; abfärbend, wasserfrei:

Graumanganerz.

Pyrolusit, Weichmanganerz, Mangan-Hyperoxyd;
Polyanit.

Mn.

fig. 101.

(a:b:∞ c) 93° 40'; (∞ a:b:∞ c); (a:∞ b:∞ c); (∞ a:b:c); (∞ a:∞ b:c); deutlich spaltbar $\nparallel$ (∞ a:b:∞ c); auch traubig, nadelförmig, derb, dünnstängelig, erdig; H. 2—2,5; G. 4,8—4,9.

Auf Gängen: Tarnowitz, Ilmenau, Ilfeld, Ehrendorf, Platten in Böhmen; Hirschberg in Westphalen. Es gehört hierher auch wohl der bei Ilfeld in Afterskrystallen, nach Kalkspathformen, vorkommende Varvicit.

Lang gezogene, längsgestreifte Säulen; Strich bräunlich; wasserhaltig:

Braunmanganerz.

Glanzmanganerz, Manganit.

Mn H.

fig. 102.

(a:b:c) 130° 49'; 120° 54'; 80° 22'; ($\frac{1}{2}$ a: $\frac{1}{2}$ b:c); $\frac{1}{2}$ (8a:4b:5c); (a: $\frac{1}{2}$ b:c); (a:2b:c); (a:3b:c); (3a:2b:c); (a:b:∞ c) 99° 40'; (3a:2b:∞ c); (2a:b:∞ c); (a:2b:∞ c); (a:∞ b:c); (∞ a:b:c); (∞ a:∞ b:c); Zwillinge haben (∞ a:b:c) oder (∞ a:b:∞ c) gemein. Deutlich spaltbar $\nparallel$ (∞ a:b:∞ c); auch traubenförmig, derb, stängelig, eingesprengt; H. 4—3,5; G. 4,3; eisenschwarz, ins Bräunlichschwarze und Stahlgraue; unschmelzbar.

Auf Gängen: Ilfeld, Granan, Undelsnäes, Christiansand, Groroi.

247. Weich, ritzt Glas nicht 248

Krystalle lang gezogen, ritzt Glas:

Tantalit.

Schwertantalerz.

Fe³ Ta³ oder (Fe² Mn²) Ta³.

(a:b:∞ c) 130°; (a:b:c) 147°; 100°; 88°; unvollkommen spaltbar; graulich - bis pechschwarz; St. bräunlich; undurchsichtig; H. 6—6,5; G. 7,85; unschmelzbar.

Auf Gängen von Granit in Finnland. Tantalit aus Nord-Amerika ist als Torrelit beschrieben.

248. Dünne, biegsame, tafelförmige Krystalle; auf Kohle kein Antimonrauch. **biegsamer Silberglanz** 232
 Krystalle lang gezogen, undeutlich; Antimonrauch **Sprödglasserz** 244
249. Krystallform ein Octaëd 250
 Zugespitzte oder abgeschnittene Prismen . . . 258
250. Weiss, durchsichtig oder milchig 251
 Gelb, gelblich, orangegelb, grün, oder blau . . 252
251. Krystalle sehr klein, weiss, durchscheinend; verwittern nicht:

Fluëllit.

Äl Fl².

(a:b:c) 109°; 82°; 105°. Im Wawellit von Cornwall.

- Schmutziggrau; verwittert leicht . . . **Thenardit** 228
252. Gelb, gelblich oder orangegelb 253
 Grün, olivengrün, blau 257
253. Ritzt leicht Glas; unschmelzbar 254
 Weich, ritzt Glas nicht 255
254. Topasgelb bis weiss, scharfkantige, durchsichtige, glänzende Krystalle; spaltbar # Endfläche:

Topas.

Phisalit, Pyrophysalith, Piknit, schörlartiger Beril.




fig. 103.

(a:b:c); (a:b:∞ c) 124° 19'; (2 a:b:∞ c) (∞ a:b:c) 92° 59'; (∞ a:∞ b:c); (b:a:3 b:4 c); (a:b:2 c); (a:b:1/3 c); (a:∞ b:2 c); am Ural noch complicirtere Formen; auch derb, stängelig, als Geschiebe; H. 8; G. 3, 4—3, 6; auch grünlich, bläulich.

Auf Gängen und im Granit: Auerbach, Altenburg, Schlaggenwald, Fahlun, Sibirien, Brasilien.

Krystalle gelbgrün bis bräunlich, abgerundet, opalisirend:

Chrysoberil.

C y m o p h a n.

Be Äl.

fig. 104.

($a:\frac{1}{3}b:\infty c$) $70^{\circ}41'$; ($a:\infty b:\infty c$); ($\infty a:b:\infty c$); ($a:\infty b:c$) $119^{\circ}46'$; ($a:b:c$); ($a:\frac{1}{3}b:c$); Prismen längsgestreift; undeutlich spaltbar. Parallel der Hauptaxe ein milchweisser Lichtschein; durchsichtig bis halbdurchsichtig; Glasglanz; H. 8, 5; G. 3, 75.

Im Granit und Gneuss: Marschendorf, Beresow, Nordamerika; im Sande von Ceylon und Brasilien.

255. Schwefelgelb, glänzend, leicht zerbrechlich, brennbar:

Schwefel.

S.

fig. 105.

($a:b:\infty c$) $101^{\circ}59'$; ($a:b:c$) $106^{\circ}38'$; $84^{\circ}58'$; $143^{\circ}17'$; ($a:b:\frac{1}{3}c$); ($a:b:\frac{1}{5}c$); ($\infty a:\infty b:c$); ($\infty a:b:c$); ($a:\infty b:c$); ($a:\infty b:\infty c$); undeutlich spaltbar; auch dicht und erdig; Bruch muschelig; schwefelgelb, ins Rothe und Grüne; durchsichtig bis kantendurchscheinend; H. 1, 5—2, 5; G. 2.

Im Gyps: Girgenti, Cadix, Gallizien, Lauenstein; an Vulkanen: Neapel, Stromboli; auf Gängen bei Siegen.

Der Selen Schwefel von der Insel Volcano ist orangegelb, ins Bräunliche und entwickelt auf Kohle selenig- und schwefligsaure Dämpfe.

256. Bruch blättrig, braust mit Säuren . **Junkerit** 174
Orangegelb bis braunroth. Härte 5,5

Hyalosiderit 292

Gelblichweiss, weingelb, ochergelb oder blassgelblichbraun:

Childrenit.


($a:b:c$) $130^{\circ}20'$; $102^{\circ}30'$; $97^{\circ}50'$; ($a:b:\frac{4}{3}c$); ($\infty a:b:\infty c$); ($\infty a:b:x:c$); ($\infty a:\infty b:c$); undeutlich theilbar $\ddagger$ ($\infty a:b:\infty c$);

auch als krystallinischer Ueberzug; St. weiss; Glasglanz bis Fettglanz; H. 4, 5—5; enthält Thonerde, Eisenoxyd und Phosphorsäure. Findet sich bei Tavistock.

257. Himmelblau bis spangrün:

Linsenerz.

L i r o k o n i t.



(a:b:∞ c) 119° 45'; (a:∞ b:c) 71° 59'; unvollkommen spaltbar; auch derb; körnig; Glasglanz bis Fettglanz; halbdurchsichtig bis durchscheinend; H. 2—2, 5; G. 2, 9; schmelzbar.

Auf Gängen bei Redruth; selten.

Olivengrün bis braun:

Olivenerz.

O l i v e n i t.




fig. 106.

(a:b:∞ c) 92° 30'; (a:∞ b:∞ c); (∞ a:b:c) 110° 50'; kaum spaltbar; auch nierenförmig, stängelig, körnig, derb; halbdurchsichtig bis undurchsichtig; H. 3; G. 4, 2; schmelzbar.

Auf Gängen bei Redruth.

258. Wasserhell oder etwas bläulich, röthlich oder grünlich, oder durchscheinend und milchweiss 259
 Verschieden gefärbt, mehr weniger durchscheinend 283
 259. Bedeutend schwer 260
 Gewicht nicht über 3,5 270
 260. Gewicht über 6 261
 Gewicht 4 bis 6 664
 261. Krystalle platt gedrückt:

Weissantimonerz.

Antimonblüthe, Antimonoxyd, Spiessglanzweiss; Antimonspath, Antimonphyllit, Gelbspiessglanzerz.

Sb.

fig. 107.

(2:a:b:∞ c) 136° 68'; (a:∞ b:∞ c); (a:∞ b:½ c) 70° 32'; (a:∞ b:⅓ c); (a:b:c); leicht spaltbar $\ddagger$ (2 a:b:∞ c); nadelförmig; kugel-, stern-, büschelförmig verwachsen; auch derb, eingesprengt und angeflogen; gelblich, graulich, röthlich, asch-, gelb-, schwärzlichgrau, karmoisinröthlich; St. weiss; H. 2, 5—3; G. 5, 56; sehr leicht schmelzbar.

Auf Gängen: Przibram, Bräunsdorf, Wolfsberg, Horrhausen, Wolfach, Ungarn.

Krystalle nicht platt gedrückt 262

262. Wasserhell oder milchweis, gelblich, grau, sehr glänzend 263

Lasurblau **Kupferbleivitriol** 285

263. In Säuren fast unauflöslich:

Bleivitriol.

Vitriolbleierz, Bleisulphat, Bleiglas.

Pb S.

fig. 108. 109.

(a:b:c) 128° 58'; 89° 59'; 111° 48'; (2 a:b:∞ c) 101° 35'; (a:∞ b:∞ c); (∞ a:b:∞ c); (a:∞ b:c); (∞ a:b:c); (2 a:b:c); (a:½ b:c); (a:∞ b:½ c); (a:∞ b:⅓ c); (∞ a:∞ b:c); undeutlich spaltbar; auch derb; Bruch kleinmuschelartig; Demantglanz bis Glas- und Fettglanz; H. 3; G. 6, 2; schmelzbar.

Auf Gängen: Zellerfeld, Siegen, Wolfach, Tarnowitz, Anglesea, Leadhills.

In Salpetersäure mit Aufbrausen löslich:

Weissbleierz.

Bleicarbonat, kohlensaures Blei; Schwarzbleierz, Bleierde, Bleiglimmer.

Pb C.

fig. 110. 111. 112.

(a:b:c) 130°; 108° 28'; 92° 19'; (a:∞ b:½ c); (a:∞ b:∞ c); (a:b:∞ c) 117° 13'; (a:⅓ b:∞ c); (∞ a:b:∞ c); (∞ a:b:c); (∞ a:

$b:\frac{1}{2}c$); ($\infty a:b:2c$); ($\infty a:b:3c$); ($\infty a:b:4c$); ($\infty a:\infty b:c$); Zwillinge haben ($a:b:\infty c$) gemein und sind sehr häufig, auch nadelförmig, derb, dicht, erdig; auch grünlich, bläulich, schwärzlich; Demantglanz bis Fettglanz; H. 3—3,5; G. 6,5; schmelzbar.

Auf Bleigängen: Siegen, Badenweiler, Zellerfeld, Freiberg, Brilon, Mins, Przibram, Alstonmoor, Leadhills. Der Zinkbleispath von Sardinien ist ein zinkoxydhaltiges Weissbleierz.

264. Fast regelmässige sechsseitige Prismen und Pyramiden; in Säuren mit Brausen löslich. 265

Deutliche rhombische Prismen; in Säuren unlöslich 266

265. Deutliche, milchweisse, oder graue oder durchsichtige Krystalle; schmelzbar:

Witherit.

Kohlensaurer Baryt.

Ba C.

fig. 113.

($a:b:\infty c$) $118^{\circ}30'$; ($\infty a:b:\infty c$); ($\infty a:b:c$) $106^{\circ}54'$; ($\infty a:b:\frac{1}{2}c$); ($\infty a:b:2c$); ($a:b:c$); ($\infty a:\infty b:c$); Zwillinge haben ($a:b:\infty c$) gemein; auch traubig, knollig, derb; stängelig; halbdurchsichtig bis durchscheinend; H. 3—3,5; G. 4,3.

Auf Gängen und Lagern: Strontian, Neuberg, Salzburg, Ungarn, Sibirien.

Krystalle undeutlich; oft grünlich; kaum schmelzbar:

Strontianit.

Kohlensaurer Strontian.

fig. 114.

($a:b:\infty c$) $117^{\circ}19'$; ($\infty a:b:\infty c$); ($a:b:c$) $130^{\circ}1'$; $92^{\circ}11'$; $108^{\circ}35'$; ($a:b:\frac{1}{2}c$); ($\infty a:b:2c$); ($\infty a:\infty b:c$); Zwillinge haben ($a:b:\infty c$) gemein; unvollkommen spaltbar $\#$ ($a:b:\infty c$); auch kugelig, stängelig, derb; H. 3,5; G. 3,6.

Auf Gängen: Strontian, Leogang, Bräunsdorf, Clausthal. Der Stromnit oder Barytostromnit scheint nur ein Gemenge von Strontianit und Schwerspath zu sein; der Emmonit aus Massachusetts ein kalkhaltiger Strontian.

266. Einfache rhombische Säulen 267

Mehrere Flächen combinirt 268

267. Bläulich oder milchweiss; die Flamme purpurroth färbend; schmelzbar; mit Schwefel vorkommend:

Cölestin.

Strontianspath; schwefelsaurer Strontian.

Sr. $\ddot{S}$.

fig. 115.

(a:b:∞ c) $103^{\circ} 58'$; (a:b:c); (∞ a:b:c) $76^{\circ} 2'$; (a:∞ b: $\frac{1}{2}$ c); (∞ a:∞ b:c); spaltbar $\ddagger$ (∞ a:∞ b:c) und (a:b:∞ c); (∞ a:b:c) und (∞ a:∞ b:c) bilden gewöhnlich eine lang gezogene Säule. Auch büschelförmig, derb, schalig, faserig, dicht; H. 3—3,5; G. 3,85; schmelzbar.

Girgenti, Jena, Göttingen, Rüdersdorf, Seisser Alpe, Bristol, Meissen, Euganeen, Paris. Etwas kalkhaltig ist er als Gyps-cölestin bei Bristol vorgekommen.

Durchscheinend; fast unschmelzbar; auf Ganggesteinen; fast unschmelzbar; färbt die Flamme gelblichgrün:

Schwerspath.

Baryt, schwefelsaurer Baryt, Hepatit, Schoharit, Bologneserspath; Wolnyn.

Ba $\ddot{S}$.

fig. 116—120.

(a:b:c) $91^{\circ} 25'$; $128^{\circ} 34'$; $112^{\circ} 7'$; (∞ a:∞ b:c); (a:∞ b:∞ c); (∞ a:b:∞ c); (a:c:∞ b) $78^{\circ} 18'$; (b:c:∞ a); (a:b:∞ c); (2a:b:∞ c); (3,4,5 a:b:∞ c); (2a:c:∞ b); (a:2c:∞ b); (2a:b:c); spaltbar $\ddagger$ (a:c:∞ b) und (∞ a:b:∞ c); auch rosen-, kamm-, staudenförmig, zerfressen, derb, körnig, dicht, erdig; H. 3—3,5; G. 4,4; farblos, weiss, fleischroth, smalteblau, wachsgelb, braun; durchsichtig bis durchscheinend; Glas- bis Fettglanz, oder matt.

Auf Gängen und Lagern sehr verbreitet; sehr schön bei Marienberg, Przibram, Harzowitz, Felsöbanya, Grund, Royat, Dufton. Der Allomorphit von Saalfeld enthält etwas schwefelsauren Kalk. Der Calstronbaryt von Shohary in New-Jersey scheint eine Verbindung von Schwerspath mit Witherit und Strontian zu sein.

268. Krystalle mit sehr entwickelter Endfläche . . . 269
 - lang gezogen . . . **Schwerspath** 267
 269. In der Richtung einer Diagonale der Endfläche
 verlängert . . . **Schwerspath** 267
 In ein niedriges Doma auslaufend . **Cölestin** 267
 270. Krystalle tafelförmig, spaltbar $\#$ Endfläche . 271
 Krystalle mehr lang gezogen . . . 313
 271. Hart, ritzt Glas; die Tafeln an den Ecken oft
 aufblättern:

Prchnit.

Kupholith, Edelith.




fig. 121.

(a:b:∞ c) 99° 56'; (∞ a:∞ b:c); (∞ a:b:c); (∞ a:b:3 c)
 33°; (a:∞ b:∞ c); (a:b:c) 112° 6'; 96° 41'; 120° 30'; (a:∞ b:
 $\frac{3}{4}$ c); (a:∞ b: $\frac{3}{8}$ c); auch wulstförmig, nierenförmig, derb, faserig;
 Glasglanz, auf der Endfläche Perlmutterglanz; H. 6; G. 9; farblos,
 graulich-, grünlichweiss; lauch-, gras-, apfelgrün; strohgelb;
 schmelzbar.

Auf Gängen und in Mandelsteinen: Ratschings, Bourg d'Oisans,
 Salzburg, Fassathal.

- Ritzt Glas nicht 272
 272. Krystalle klein, trapezförmig; unschmelzbar:

Kieselzinkerz.

Zinksilicat, Zinkglas.




fig. 122.

($\frac{1}{2}$ a:b:c) 76° 7'; (∞ a:b:∞ c); (a:b:c) 132° 9'; 101° 9';
 97° 47'; (a:∞ b:c); (a:∞ b:2 c); (∞ a:b: $\frac{1}{2}$ c); (∞ a:b: $\frac{3}{2}$ c);
 bisweilen am einen Ende nur (a:b:c); am andern (a:∞ b:2 c)
 und (∞ a:b: $\frac{3}{2}$ c) vorhanden; deutlich spaltbar $\#$ (a:2b:∞ c);
 auch fächer- und garbenförmig, traubig, derb, strahlig, körnig,
 weiss, rauchgrau, nelken-, leberbraun, ochergelb, ölgrün; durch-
 sichtig bis durchscheinend; Glas- bis Diamantglanz; H. 5; G. 3, 37.

Auf Gängen und Stöcken: Aachen, Hofgrund, Tarnowitz,
 Raibel, Nertschinsk, England. Erdiges Kieselzinkerz mit Braun-
 eisenocher bildet den Zinkocher (Galmeierde).

Die Octaëdflächen sind auf die Kanten der Säule aufgesetzt; schmelzbar:

Stilbit.

Desmin, Sphärostilbit, Hypostilbit.




fig. 123.

(a:b:c) 119° 15'; 114°; 96°; (∞ a:b: ∞ c); (a: ∞ b: ∞ c); (a:b: ∞ c) 94° 15'; (∞ a: ∞ b:c); deutlich spaltbar $\ddagger$ (∞ a:b: ∞ c); tafelartig; garben-, fächer-, nierenförmig, concentrisch strahlig; farblos, gelblich, röthlich, bräunlich; durchsichtig bis durchscheinend; Glasglanz; auf (∞ a:b:c) Perlmutterglanz; H. 3, 5—4; G. 2, 16.

Auf Gängen: Andreasberg, Kongsberg; in Höhlen von Mandelsteinen: Island, Faröer, Schottland, Hindostan; auch der weisse, durchsichtige oder durchscheinende (a:b: ∞ c) = (20°) Linkolnit aus Nord-Amerika wird hierher gehören.


273. Ritzt Quarz **Topas** 254

Ritzt Glas nicht 274

Ritzt Glas und hat zwei rechtwinklige Blätter-
durchgänge 273^a

273^a. Giebt im Kolben kaum Spuren von Wasser:

Porzellanspath.



(a:b: ∞ c) 92°; (a: ∞ b: ∞ c); (∞ a:b: ∞ c); nach den beiden letzten Richtungen spaltbar; weiss, ins Gelbliche, Bläuliche, Grauliche; Glas- bis Perlmutterglanz; durchscheinend bis kantendurchscheinend; meist derb, körnig; H. 5—6; G. 2, 67.

Im Gneis bei Obernzell unweit Passau.

Giebt viel Wasser im Kolben:

Mesolith.

M e s o l i t h.




fig. 135.

(a:b: ∞ c) 91°; (a: ∞ b: ∞ c); (∞ a:b: ∞ c); (∞ a:b:c) 177° 35'; deutlich spaltbar $\ddagger$ (a: ∞ b: ∞ c) und (∞ a:b: ∞ c)
6 *

häufig büschelförmig, halbkugelförmig, nierenförmig, knollig; weiss, ins Graue, Gelbe und Rothe; Glasglanz; St. weiss; durchsichtig bis durchscheinend; H. 5—5,5; G. 2,3; schmelzbar.

Im Basalt, Klingstein und Lava: Vesuv, Kaaden, Seeberg, Tyrol, Island.

274. Krystalle haben drei rechtwinklige Blätterdurchgänge:

Anhydrit.

Muriazit, Karstenit, Vulpinit, Gekrösstein.

$\text{Ca } \ddot{\text{S}}.$

fig. 124.

(a:b:c) $100^{\circ} 10'$; (∞ a:b: ∞ c); (a: ∞ b: ∞ c); (∞ a: ∞ b:c); (a:b:c) $121^{\circ} 32'$; $108^{\circ} 35'$; $99^{\circ} 7'$; (a:b: $\frac{1}{2}$ c); (a:b: $\frac{1}{3}$ c); gewöhnlich dick tafelförmig; auch derb, strahlig, körnig; farblos, weiss, smalteblau; H. 3—4; G. 2,9; Glas- bis Fettglanz; auf (∞ a: ∞ b:c) Perlmutterglanz; schmelzbar.

Mit Gyps und Steinsalz: Salzburg, Aussee, Bex, Sulz, Harz; auf Gängen: Riechelsdorf, Kapnik.

Leicht nach der Längsfläche spaltbar, reagirt auf Arsen:

Gaidingerit.

$\text{Ca}^2 \ddot{\text{As}} + 4 \text{H}.$

(a:b: ∞ c) 100° ; (a: ∞ b: ∞ c); (∞ a:b: ∞ c); (∞ a:b:c) $126^{\circ} 58'$; (a: ∞ b:c); (a: ∞ b:2c); (a: ∞ b: $\frac{1}{2}$ c); (a: ∞ b:3c); ($\frac{1}{2}$ a: ∞ b: ∞ c); (4a:5b:2c); deutlich spaltbar $\nparallel$ (∞ a:b: ∞ c); auch als drusige Rinden; weiss; durchsichtig bis durchscheinend; Glasglanz; dünne Blättchen biegsam; H. 2—2,5; G. 2,8; schmelzbar.

Mit Pharmakolith; wahrscheinlich von Joachimsthal.

Keine oder undeutliche und dann nicht rechtwinklige Spaltungsflächen

275

275. Rhombische oder sechsseitige Säulen, oft Zwillinge; mit Säuren aufbrausend; wasserfrei; unschmelzbar:

Arragonit.

Arragon, Eisenblüthe.





fig. 125—128.

(a:b:∞ c) 116° 12'; (∞ a:b:∞ c); (∞ a:∞ b:c); (a:b:c) 129° 37'; 93° 30'; 107° 34'; (2a:b:c); (a:b:2c); (∞ a:b:c); (∞ a:b:2c); (∞ a:b:½ c); (∞ a:b:3c); (∞ a:b:4c); (∞ a:b:6c); Zwillinge mit (a:b:∞ c) verwachsen; auch spiessig, nadelförmig, ästig, kugelig, stängelig, faserig, schalig; H. 3, 5—4; G. 2, 39; weiss, ins Gelbliche, Grünliche, Bläuliche; St. graulichweiss; durchsichtig bis durchscheinend; unschmelzbar.

Auf Gängen: Leogang, Grund; im Basalt und Wacke: Böhmen, Hofgeismar; im Gyps: Bastènes, Dax, Molina.

Rechtwinklige oder sechseitige Säulen; braust in Säuren nicht; wasserhaltig; schmelzbar . 275°
275°. Ritzt nur Kalkspath:

Stellit.

Zarte, sternförmig - strahlig - zusammengehäufte, rhombische Prismen; schneeweiss; durchscheinend; Perlmutterglanz; H. 3—3, 5; G. 2, 6.

Auf Klüften im Diorit bei Kilsyth in Schottland.

Ritzt Flussspath:

Thomsonit.

C o m p t o n i t.




Fig. 129.

(a:b:∞ c) 90° 40'; (∞ a:∞ b:c); (a:∞ b:∞ c); (∞ a:b:∞ c); (a:∞ b:c) 125°; auch derb, stängelig; büschelförmig; Glas-, Perlmutterglanz; durchsichtig bis durchscheinend; H. 5; G. 2, 37.

Bei Dumbarton in Schottland, Faröer, Seegeberg bei Kaaden.

276. Grünlich, auf Bor reagirend, Bruch muschelrig;
auf Hornblendegestein **Datolith** 329

- Milchweiss oder durchsichtig 277
 277. Ritzt Glas leicht; unschmelzbar 278
 Ritzt Glas nicht 279
 278. Grosse, glänzende, Quarz ritzende Krystalle **Topas** 254
 Ritzt Quarz kaum:

Forsterit.

Mg, Si.

(a:b:∞ c) 128° 54'; (∞ a:b:∞ c); (a:b:c); (∞ a:∞ b:c);
 ungefärbt, stark glänzend, durchsichtig; spaltbar $\#$ Endfläche.
 In Auswürflingen des Vesuvs.

279. Ritzt den Apatit 280
 Ritzt den Apatit nicht 282
 280. Fast rechtwinklige Säulen, mit Endfläche

Comptonit 275^v

Rhombische Prismen von 115°—122° 281

281. Säulenwinkel 121° 40'; von Kalkspath und
 Kreuzstein begleitet **Edingtonit** 124
 Säulen von 115° 7'; mit Flussspath und Apatit:

Herderit.

Allogonit.

fig. 130.

(3a:2b:∞ c) 115° 7'; (a:∞ b:∞ c); (a:b:c) 141° 17'; 77° 22';
 116° 3'; (∞ a:b:c); unvollkommen theilbar; Glasglanz; gelblich-
 bis grünlichweiss; durchsichtig; H. 5; G. 3; schwer schmelzbar;
 scheint phosphorsaure Thon- und Kalkerde zu sein.

Auf Gängen bei Ehrenfriedrichsdorf in Sachsen; sehr selten.

282. Vierseitige Säulen von 135° 10', mit niedrigen
 Endflächen:

Epistilbit.

(Ca Na) Si + 3 Al Si + 5 H.

fig. 131.

(a:b:∞ c); selten (∞ a:b:∞ c); (a:∞ b:c) 109° 46'; seltener
 (∞ a:b:c); (a:½ b:c); Zwillinge haben (a:b:∞ c) gemein; auch
 derb, körnig; Glas- und Perlmutterglanz; H. 3,5—4; G. 2; schmelzbar.
 In Blasenräumen von Mandelsteinen auf Island.

Säulen vierseitig und fast rechtwinklig, oder sechsseitig, mit einem niedrigen Octaëd:

Natrolith.

Mesotyp, z. Th, Faserzeolith, z. Th.




fig. 132.


(a:b:∞ c) 91° 20'; (a:b:c) 143° 20'; 142° 40'; 53° 20'; der Säule nach leicht spaltbar; auch nierenförmig, drusig, krummschalig, concentrisch strahlig und derb; Bruch muschelrig; weiss, ins Graue, Gelbe und Rothe; auch ochergelb; H. 5—5,5; St. weiss; schmelzbar.

In Blasenräumen mandelsteinartiger Gesteine: Island, Faröer, Aussig, Tyrol; nur ein kalkhaltiger Natrolith scheint der Harringtonit aus Irland zu sein, sowie auch der Poonahlit aus Ostindien.

Sechsseitige Säule mit dem Querprisma:

Wawellit.

Lasionit, Devonit, Peganit, Striegisan, Hydrargillit.



(a:b:∞ c) 126° 25'; (∞ a:b:∞ c); (∞ a:∞ b:c); (a:∞ b:c) 106° 46'; deutlich spaltbar $\ddagger$ (∞ a:b:∞ c); (a:∞ b:c); gewöhnlich kugelig, traubig, nierenförmig, concentrisch strahlig, faserig; weiss, gelblichweiss, ölgrün, grasgrün, spangrün; Glas- und Seidenglanz; durchscheinend; H. 3,5—4; G. 2,33; unschmelzbar.

Giessen, Frankenberg, Amberg, Böhmen, England, Brasilien. Auch der nierenförmige, apfelgrüne Variszit von Massbach im Voigtlande scheint hierher zu gehören.

4—8 Säulen- und 6 Pyramidenflächen:

Hopeit.

Stilbit von Aachen.

fig. 133.

(2a:b:∞ c) 81° 34'; (a:∞ b:∞ c); (∞ a:b:∞ c); (a:b:c) 139° 41'; 107° 2'; 86° 49'; (a:∞ b:c); deutlich spaltbar $\ddagger$ (a:∞ b:∞ c); Glasglanz; Spaltfläche; Perlmutterglanz; graulichweiss; H.

2, 5—3; G. 2, 76; leicht schmelzbar; enthält Zinkoxyd und eine feuerfeste Basis; ist wasserhaltig.

Mit Galmei, am Altenberge bei Aachen.

283. Blau oder grün, mehr weniger intensiv	284
Gelb oder gelblich	300
Roth, rothbraun, braun oder schwarz	296
284. Blau oder blaugrün	285
Grün	286
285. Schön blau; ritzt Glas; ist unschmelzbar:	

Lazulith.

Blauspäth, Lasurpāth.




fig. 134.

(a:b:∞ c) 91° 30'; (a:∞ b:∞ c); (a:b:c); (a:b:2 c); (∞ a:b:2 c); (∞ a:b:c); (a:∞ b:2 c); gewöhnlich derb; Glasglanz und Perlmutterglanz; smalteblau, ins Weisse und Grüne; kantendurchscheinend bis undurchsichtig; St. weiss; H. 5—6; G. 3; unschmelzbar.

Auf Klüften im Thonschiefer und Granit: Werfen bei Salzburg, Gastein; auf Lagern im Glimmerschiefer: Waldbach in Steiermark.

Violblau, oft ins Graue oder Schwarze, ritzt Glas; ist schmelzbar:

Dichroit.

Jolith, Peliom, Cordierit, Steinheilith, harter Fahlunit.




fig. 143.

(a:b:∞ c) 120°; (3 a:b:∞ c); (a:∞ b:∞ c); (∞ a:b:∞ c); (∞ a:∞ b:c); (a:b:c) 96° 53'; 134° 57'; 100°; (3 a:b:c); (a:b:½ c); (∞ a:b:c); undeutlich spaltbar; Bruch muschelrig; St. weiss; durchsichtig bis durchscheinend; in der Richtung der Axe blau; senkrecht darauf gelblichgrau; H. 7—7, 5; G. 2, 58.

Bodenmais, Orijerfvi in Finnland, Fahlun, Spanien.

Blaugrün, ritzt Glas nicht; ist schmelzbar	285 ^a
285 ^a . Giebt auf Kohle keinen Arsengeruch; löst sich in Säuren unter Aufbrausen:	

Casurigbleivitriol.

Kaledonit, Halblasurblei.




fig. 107.

(a:b:∞ c) 109°; (a:∞ b:∞ c); (∞ a:b:∞ c); (a:∞ b:c) 95°; (a:b:c); undeutlich spaltbar; dunkelspangrün, ins Berggrüne; St. grünlichweiss; Fettglanz; H. 2, 5—3; G. 6, 4.

Findet sich zu Leadhill in Schottland.

Giebt auf Kohle Arsenikgeruch und löst sich in Salzsäure ohne Aufbrausen:



Skorodit.

fig. 135.

(a:b:c) 156° 6'; 102° 1'; 111° 34'; (a:2b:∞ c); (a:∞ a:∞ c); (∞ a:b:2c); (∞ a:∞ b:c); (a:b:∞ c); (a:b:½ c); unvollkommen spaltbar; auch traubig, nieren-, rindenförmig, derb: St. grünlichweiss; lauch-, seladon-, schwärzlichgrün, ins Oelgrüne und Leberbraune; durchsichtig bis kantendurchscheinend; H. 3, 5—4; G. 3, 16; schmelzbar.

Auf Lagern: Schwarzenberg, Johann Georgenstadt, Hüttenberg, St. Austle.

286. Hellgrün oder grünlich	291
Smaragd-, oder dunkel olivengrün	287
287. Mehr weniger dunkel smaragdgrün	288
Olivengrünlich:	

Kupferschaum.

(a:b:∞ c); (∞ a:∞ b:c); (∞ a:b:∞ c); spaltbar vollkommen # (∞ a:∞ b:c); auch nierenförmig, traubig, krummschalig, derb; Perlmutterglanz auf (∞ a:∞ b:c); Glasglanz auf der Säule; apfel- und spangrün, ins Himmelblaue; lichtedurchscheinend; H. 1—1, 5; G. 3, 1; schmelzbar.

Auf Lagern und Gängen: Bannat, Schwatz in Tyrol, Libethen, Saalfeld. Der Kupferschaum von Altai, büschelförmige Blättchen, enthält 45 pC. Zinkoxyd.

288. Dunkel smaragdgrün, ins Schwärzliche . . . 290
 Smaragdgrün 289
 289. 8—10seitige Säulen mit stumpfem Längsprisma:

Brochantit.

K r i s t a l l i t.




fig. 136.

(a:b:∞ c) 104° 10'; (a:½ b:∞ c) 75° 23'; (∞ a:b:∞ c);
 (∞ a:b:c) 114° 20'; leicht theilbar $\ddagger$ (∞ a:b:∞ c); auch nieren-
 förmig, stängelig; Glasglanz; St. lebhaftgrün; durchsichtig bis durch-
 scheinend; H. 3, 5—4; G. 3, 9; schmelzbar.

Auf Malachit bei Katharinenburg.

Säulenflächen schwach gewölbt; giebt vor dem
 Löthrohr Arsengeruch:

Euchroit.




fig. 137.


(a:b:∞ c) 117° 20'; (3 a:2 b:∞ c); (2 a:b:∞ c); (∞ a:b:∞ c);
 (∞ a:b:c) 87° 52'; St. apfelgrün; H. 3, 5—4; G. 3, 39; durch-
 sichtig bis durchscheinend; Glasglanz; schmelzbar.

Auf einem Lager bei Libethen bei Neusohl.

290. Giebt ein Kupferkorn und reagirt auf Chlor,
 (stark blaugrüne Flamme):

Salzkupfererz.

Smaragdocalcit, Atacamit.



(a:b:∞ c) 67° 15'; (a:∞ b:∞ c); (a:∞ b:c); spaltbar $\ddagger$
 (∞ a:b:∞ c); auch nierenförmig, derb, angeflogen; oliven-, lauch-,
 gras-, smaragd- und schwärzlichgrün; St. apfelgrün; halbdurch-
 sichtig bis kantendurchscheinend; H. 3—3, 5; G. 4—4, 3; schmelzbar.

Auf Brauneisenstein in Chili und Peru; auf Laven des Vesuvs.

Schmilzt zu einer schwärzlichen Kugel und
 reagirt auf Phosphorsäure:

Libethkupfererz.

Libethenit, octaëdrisches phosphorsaures Kupfer;
Ehlit?




fig. 138.

(a:b:∞ c) 95° 2'; (∞ a:b:c) 111° 58' und bisweilen (a:b:c) 122° 58'; 117° 8'; 89° 59'; dunkelolivengrün; St. ebenso; Glasglanz; kantendurchscheinend; H. 4; G. 3, 6—7, 8.

Auf einem Lager mit Quarz bei Libethen in Ungarn.

Reagirt auf Schwefelsäure und Kupferoxyd:

Königin.

(a:b:∞ c) 105°; (a:∞ b:∞ c); (∞ a:∞ b:c); (∞ a:b:xc); leicht spaltbar $\ddagger$ (∞ a:∞ b:c); smaragd- und schwärzlichgrün; Glasglanz; durchscheinend; H. 2.

Im Werchoturigebirge in Sibirien.

291. Hart, ritzt Glas 292

Ritzt Glas nicht

292. Einzelne, längsgestreifte, kurze Säulen, meist mit der Endfläche:

Chrysolith.

Olivin, Peridot, Hyalosiderit.




fig. 139.


(a:b:∞ c) 10° 2'; (a:½ b:∞ c); (a:⅓ b:∞ c); (a:∞ b:∞ c); (∞ a:b:∞ c); (a:b:c) 85° 15'; 139° 55'; 108° 31'; (a:½ b:c); (a:⅓ b:c); (a:∞ b:c); (∞ a:b:2c); (∞ a:b:c); (∞ a:b:4c); (∞ a:∞ bc); theilbar $\ddagger$ (a:∞ b:∞ c); auch derb, körnig; grün; gelb, braun; St. weiss; Glasglanz; durchsichtig bis durchscheinend; H. 6, 5—7; G. 3, 4; unschmelzbar.

In Basalten, Laven und Meteorsteinen; der Hyalosiderit mit 3 Atomen Eisenoxydul von Sassbach am Kaiserstuhle.

Vielleicht gehört hierzu auch der durchsichtige bis fleischrothe Monticellit vom Vesuv und der Batrachit vom Rizoniberge in Tyrol.

- Undeutliche Krystalle; rechtwinklige oder 8seitige Säulen auf einem Gestein der Somma am Vesuv **Zurlit 148**
 293. Vor dem Löthrohre schmelzbar:

Pyrosklerit.




Vollkommen theilbar $\ddagger$ ($a:\infty a:b$); unvollkommen $\ddagger$ ($\infty a:b:\infty c$); meist derb; Bruch uneben; Perlmutterglanz bis matt; apfelgrün bis graulichgrün; St. weiss; H. 3; G. 2, 7.

Mit Conikrit auf Elba.

- Unschmelzbar 294
 294. Rhombenoctaëder, bisweilen mit der Geradenfläche:

Villarsit.



($a:b:\infty c$) $119^\circ 59'$; ($a:b:c$); ($\infty a:\infty b:c$); auch derb; grünlich- und graulichgelb; durchscheinend; H. 3; G. 3; unschmelzbar. Auf Eisensteinlagern von Traversella in Piemont.

- In mehr weniger deutlichen Prismen 295
 295. 4—6 seitige Säulen mit einem Querprisma, unschmelzbar:

Pikrosmine.





fig. 140.

Spaltet $\ddagger$ ($\infty a:b:\infty c$); ($a:\infty b:\infty c$); ($a:\infty b:c$) $117^\circ 49'$; ($a:b:\infty c$) $126^\circ 52'$; derb; Perlmutterglanz; grünlichweiss bis grünlichschwarz; St. weiss; fast undurchsichtig; H. 2, 5—3; G. 2, 6. Giebt angehaucht einen bitteren Geruch.

Auf einem Lager im Gneis bei Pressnitz in Böhmen.

4—6—8—12seitige Prismen mit abgerundeten Kanten und Ecken; undeutlich spaltbar; an den Kanten schmelzbar;

Praseolith.

Grün; schwacher Glanz, kantendurchscheinend bis undurchsichtig; H. 3, 5; G. 2, 75.

Zu Bräkke bei Brevig in Norwegen im Granit.

296. Rosenroth bis olivenroth 297
 Braunroth, braunschwarz, schwarz 301
 297. Fleischroth, sehr hart; 4seitige, fast rechtwinklige Säulen:


Andalusit.

fig. 141.

(a:b:∞ c) 91° 33'; (∞ a:∞ b:c); seltener: (∞ a:b:c) 109° 28'; (∞ a:b:∞ c); deutlich theilbar: (a:b:∞ c); auch derb; gewöhnlich mit Glimmer bedeckt; fleischroth bis perlgrau, aschgrau, violblau; St. weiss; schwacher Glasglanz; H. 7, 5; G. 3, 1.

Im Glimmerschiefer: Lisens in Tyrol; Herzogau, Kaplitz, Albenreuth, Iglau, Freiwaldau, Bräunsdorf, Elba, England, Nordamerika.

Roth, oder röthlich.

298. Roth 299
 Röthlich, mit einem Strich ins Gelbe; Krystalle tafelartig; unschmelzbar; in Säuren unlöslich:



Brookit.

fig. 142.

(2a:b:∞ c) 100°; mit sehr vorherrschender (a:∞ b:∞ c); (a:b:c) 135° 46'; 101° 37'; 94° 44'; (∞ a:b:∞ c); (∞ a:4b:3c); (2a:b:½ c); (4a:3b:½ c); (a:∞ b:c); (a:∞ b:½ c); haarbraun bis dunkelorange gelb; durchsichtig bis undurchsichtig; St. gelblichweiss; H. 5, 5—6.

Bei Bourg d'Oisans und am Snowdon.

299. Sehr kleine, lang gezogene Krystalle von 5,75 Gewicht:

Melanochroit.

Phönizit.

Meist derbe, etwas spaltbare Massen; cochenille- bis hyacinth-roth, durch Verwitterung orangegelb; kantendurchscheinend; Fett- bis Diamantglanz; H. 3, 5; leicht schmelzbar.

Zusammengedrückte Säulen, der breiten Fläche nach spaltbar und in ein Octaëd auslaufend

Rother Stilbit 272

300. Kleine dunkelgelbe, nach der Endfläche spaltbare Säulen; zu einer grauen Perle schmelzbar. In vesuvischen Schlacken **Sommervillit 148**

Kleine 6—8flächige, Glas ritzende, unter Schäumen schmelzende Krystalle in vesuvischem Gestein

Humboldtilit 148

Citrongelb, verflüchtigt sich auf Kohle:

Rauschgelb.

Auripigment, gelbe Arsenikblende.

As.

(2a:b:∞ c) 79° 20'; (∞ a:b:c); (a:b:c) 131° 36'; 94° 20'; 105° 6'; (a:∞ b:c); (a:∞ b:∞ c); (a:b:∞ c); leicht spaltbar $\ddagger$ (∞ a:b:∞ c); auch nierenförmig, tropfsteinartig, angeflogen; derb, eingesprengt; körnig; citrongelb, ins Röthliche, Zeisig- und Olivengrüne, Graue, Braune und Schwarze; auf den Spaltungsflächen metallähnlicher Perlmutterglanz; übrigens Fettglanz; halbdurchsichtig bis kantendurchscheinend; H. 1, 5—2; G. 3, 48.

Auf Gängen im Dioritporphyr: Felsöbanya; auf Thonlagern bei Tajowa in Ungarn.

301. Rothbraun 302

Schwarz; Strich bisweilen braun oder grau . . . 307

302. Stark braunroth, namentlich auf dem Bruche . . . 303

Nelkenbraun, mit einem Strich ins Gelbe . . . 306

303. Rhombische Prismen mit der Endfläche . . . 304

Prismen nadelförmig, oder in ein Octaëd auslaufend 305

304. Fast rechtwinklige (94°) Prismen mit einigen Endflächen **Tephroit 455^a**

Sehr stumpfwinklige Säulen ($129^{\circ} 20'$), bisweilen mit der Längsfläche und dem Quersprisma, und kreuzförmig verwachsen:

Staurolith.




fig. 144. 145.

($a:b:\infty c$) $129^{\circ} 20'$; ($\infty a:b:c$); ($\infty a:\infty b:c$); ($a:\infty b:c$) $70^{\circ} 32'$; Zwillinge durchkreuzen sich rechtwinklig oder unter 120° ; deutlich spaltbar $\#$ ($\infty a:b:\infty c$); röthlich - bis schwärzlichbraun; durchscheinend bis undurchsichtig; St. weiss; H. 7—7,5; G. 3,7; unschmelzbar.

Im Glimmerschiefer und Gneus am St. Gotthard und im Zillertale; Pontivy, St. Jago di Compostella, Oporto, England.

305. Deutliche Krystalle, mit einem Octaëd zugespitzte Prismen:

Nadeleisenerz.

Sammtblende, Lepidokrokit.




fig. 146.


($a:b:\infty c$) $85^{\circ} 7'$; ($a:2b:\infty c$); ($\infty a:b:\infty c$); ($a:b:c$) $121^{\circ} 5'$; $126^{\circ} 18'$; $83^{\circ} 47'$; ($a:2b:c$); ($\infty a:b:c$); ($a:\infty b:c$); spaltbar $\#$ ($a:b:\infty c$); auch nadel- und haarförmig, zu concentrisch-strahligen Drusen verwachsen; derb, dunkelröthlichbraun; St. gelblichbraun; Demantglanz; schwach durchscheinend bis undurchsichtig; H. 5—5,5; G. 4,2; unschmelzbar.

Auf Gängen bei Bristol, Lostwithiel (Cornwall), Przibram, Siegen.

Kleine, nadelförmige oder schuppenförmige Krystalle:

Stilpnosiderit.

Rubinglimmer, Pyrosiderit, Göthit.



Auch nierenförmig, derb; Glas- und Fettglanz; H. 4—4,5; G. 3,6—3,9; St. auch gelblichbraun.

Auf Eisensteinlagern: Siegen, Sachsen, Ungarn; wahrscheinlich stimmt hiermit der Turgit vom Ural überein.

306. Undeutliche, undurchsichtige Krystalle von der Härte des Kalkspaths:

Killinit.

Si, Al, K, F, H.

(a:b:∞ c) 135°; danach theilbar; auch derb; körnig; schwacher Glasglanz; grünlichgrau, ins Gelbe fallend; St. gelblichweiss; schwach durchscheinend; H. 4; G. 2,65; schmelzbar.

Im Granit zu Killiney bei Dublin.

Ritzt Glas, unschmelzbar, in Säuren unauflöslich:

Ostranit.

(a:b:∞ c) 84° 40'; (a:∞ b:c); (∞ a:b:c); (∞ a:∞ b:c); nelkenbraun; St. heller oder weiss; H. 6—6,5; G. 4,35; unschmelzbar.

Findet sich in Norwegen.

307. Schwarzgrau, eisengrau oder dunkler . . . 308

Schwarz; bisweilen etwas röthlich, wenigstens im Striche; auch ganz schwarz und dann unvollkommener Metallglanz . . . 309

308. Prismen cannellirt, undurchsichtig; auf dem Querbruche gleichartig . . . **Pinit** 214

Prismen fast rechtwinklig; im Querschnitte ein schwarzes Kreuz zeigend:

Chiastolith.

H o h l s p a t h.



Fig. 147.

(a:b:∞ c) 91° 50'; (∞ a:∞ b:c); bisweilen auch (∞ a:b:∞ c); (a:∞ b:c); (a:∞ b:c) 120°; undeutlich spaltbar; graulich-, gelblich-, röthlichweiss; im Querbruche mit einem schwarzen Kreuze; (Vierlinge) St. weiss; Glasglanz bis matt; H. 5—5,5; G. 2,9; unschmelzbar.

uu

nn
uu

nn
uu

nn
uu

Im Thonschiefer eingewachsen: Fichtelgebirge, Frankreich, Spanien.


309. Weich, ritzt Glas nicht 310

Ritzt Glas; unschmelzbar 312

310. Deutlich bestimmbare Krystalle 311

Lange, dünne, fadenähnliche Prismen; auf Kohle erhitzt, fängt es Feuer und glimmt weiter; dann schwer schmelzbar:

Pyrrorthit.



Bräunlichschwarz bis schwarz; St. unverändert; undurchsichtig, Fettglanz; H. 2—2,5; G. 2,2.

Im Granit bei Fahlun.

311. Vier- bis zehnsseitige Säulen, mit niedrigem Octäid; leicht zu schwarzem Email schmelzbar:

Lievrit.





fig. 148.

(a:b:∞ c) 111° 12'; (2a:b:∞ c); (a:∞ b:∞ c); (a:∞ b:c) 112° 40'; (a:b:c) 139° 37'; 117° 38'; 77° 16'; (∞ a:∞ b:c); (a:∞ b:3c); undeutlich spaltbar; auch derb, stängelig; sammet-, pech-, graulichschwarz; undurchsichtig; fettglänzend bis ins Halbmetallische; H. 5,5—6; G. 4.

Auf Lagern im Talk- und Hornblendeschiefer: in Schlesien, Sachsen, Norwegen und auf Elba. Wahrscheinlich gehört hierher auch der nur an den Kanten schmelzbare Wehrilit aus Ungarn.

Vierseitige Säulen, zu Kreuzen verwachsen, wie Staurolith:

Cruzit.

Besteht hauptsächlich aus Eisenoxyd und wird wohl aus Staurolithen entstanden sein. Findet sich in Irland.

312. Schwarz, mit halbm metallischem Glanze und braunem Strichpulver; deutliche Krystalle im Zirkon-Syenit:

Polymignit.

Ti, Zr, Fe, Ca, Mn, Ce, Y.

fig. 149.

(a:b:∞ c) 109° 46'; (a:½ b:∞ c); (a:½ b:∞ c); (a:∞ b:∞ c);
 (a:b:c) 136° 28'; 116° 22'; 80° 26'; unvollkommen spaltbar; musche-
 liger Bruch; undurchsichtig; H. 6,5; G. 4,8.

Im Zirkonsyenite von Frederikswärn in Norwegen.

Schwarz, mit graubraunem Strichpulver; nicht
 spaltbar:

Polukras.

(a:b:c); (a:b:∞ c) 140°; (∞ a:b:∞ c); (a:b:xc) 152°;
 lang gezogene Krystalle; Bruch unvollkommen muschelig; H. 5,5;
 G. 5; decrepitirt; ist aber unschmelzbar; in heisser Schwefelsäure
 auflöslich. Enthält Titansäure, Zirkon- und Yttererde, Eisen- und
 Uranoxyd und Ceroxydul; er ist durch diesen Gehalt von Poly-
 mignit verschieden.

Im Ganggranit von Hitterøe in Norwegen.

Undeutliche Krystalle, mit schwarzem Strich-
 pulver:

Aeschynit.

fig. 150.

(a:b:∞ c) 127° 19'; (a:½ b:∞ c); (∞ a:b:∞ c); (∞ a:b:c);
 (a:b:c) 68°; 128°; 158° 36'; Fettglanz bis Halbm Metallglanz; eisen-
 schwarz, ins Bräunliche; H. 5—5,5; G. 5,2; ist ähnlich wie der
 Polymignit zusammengesetzt und findet sich mit Feldspath bei
 Miask am Ural.

Sammtschwarz, mit grauem Striche:

Tantalolith.

(a:b:∞ c) 109° 46'; (a:∞ b:∞ c); (a:∞ b:c) 51° 25'; (a:∞ b:
 xc); unvollkommen theilbar $\ddagger$ (a:b:∞ c) und (a:∞ b:∞ c);
 Glasglanz; H. 6,5—7; G. 3,86; schmilzt zu schwarzer Schlacke.

Im Trachyte am Laacher See; enthält Kieselsäure, Thonerde,
 schwarzes Eisenoxyd und Talkerde.

313. Krystalle mit, oder ohne Octaëdflächen, aber	
mit grosser horizontaler Endfläche . . .	273
Krystalle mit Octaëdflächen versehen . . .	276

Mineralien des zwei- und eingliedrigen oder monoclinoeedrigen Systems.

316. Ganz oder zum Theil in Wasser löslich	317
Unlöslich in Wasser	321
317. Leicht und ganz in Wasser löslich	318
Schwer auflöslich und sich nur mit der Zeit mit einer weissen Kruste bedeckend :	

Glauberit.

B r o g n i a r t i n .



fig. 151.


(a:b:∞ c) 83° 20'; (a:∞ b:∞ c); (∞ a:∞ b:c); (a:b:c) 116° 36'; (ā:b:c); (ā:∞ b:c); (ā:b:2c); Bruch muschelrig; gelblich- und graulichweiss; St. weiss; H. 2, 5—3; G. 2, 8; durchscheinend.

Im Steinsalze zu Villaruba in Spanien.

318. Schmeckt wie Tinte	319
Schmeckt bitter	318 ^a
Schmeckt alkalisch	320
318 ^a . Schmeckt mehr bitter als zusammenziehend, ist lebhaft grasgrün :	

Uranvitriol.

J o h a n n i t .



(a:b:∞ c) 69°; (a:∞ b:c) 85° 40'; (ā:∞ b:c) 38° 32'; undeutlich spaltbar; Glasglanz; St. zeisiggrün; halbdurchsichtig; H. 2—2, 5; G. 3, 2.

Joachimsthal in Böhmen.

Geschmack kühlend, dann salzig bitter; weiss :

Glaubersalz.

Schwefelsaures Natron.



(a:b:∞ c) 86° 31'; (a:∞ b:∞ c); (∞ a:b:∞ c); (ā:∞ b:c) 72° 15'; (a:b:c) 93° 12'; (ā:b:c) 80° 38'; (a:∞ b:c); (ā:∞ b:

2c); ($\infty a : \infty b : c$); ($\dot{a} : b : \frac{1}{2} c$); ($\dot{a} : b : 3c$); leicht spaltbar $\#$ ($a : b : \infty c$); Bruch vollkommen muschelrig; weiss; starker Glasglanz; durchsichtig; H. 1,5—2; G. 1,48; schmelzbar.

Auf Steinsalzlageru; Salzburg, Ischel, Ungarn, Böhmen.

319. Grün; die Lösung durch Ammoniak grün gefällt:

Eisenvitriol.

Grüner Vitriol.



fig. 152.

($a : b : \infty c$) $82^\circ 21'$; ($\infty a : \infty b : c$) $75^\circ 40'$; ($\dot{a} : \infty b : c$) $28^\circ 4'$; ($\infty a : b : \infty c$); ($a : b : c$) $101^\circ 35'$; ($\infty a : b : c$); ($a : \infty b : c$); ($a : \infty b : \frac{1}{3} c$); deutlich spaltbar $\#$ ($a : \infty b : c$); auch haarförmig, tropfsteinartig, erdig; span-, berg-, lauchgrün; durchscheinend; verwittert; H. 2; G. 1,8; glasglänzend bis schimmernd.

In alten Grubenbauen bei Goslar, Schemnitz, Bodenmais, Fahlun.

Hyacinthroth bis gelblichbraun und ochergelb; giebt mit Ammoniak einen braunen Niederschlag:

Botryogen.

Rother Vitriol.




fig. 153.

($a : b : \infty c$) $119^\circ 56'$; ($2a : b : \infty c$); ($\infty a : b : c$); ($\infty a : \infty b : c$); ($\dot{a} : \infty b : 2c$); ($\infty a : b : \frac{1}{2} c$); ($\dot{a} : b : c$) $125^\circ 22'$; auch nierenförmig und meist traubig; derb; Bruch muschelrig; Glasglanz; St. ochergelb; durchscheinend; H. 2—2,5; G. 2.

Findet sich bei Fahlun mit Bittersalz.

320. Braust nicht mit Säuren

Borax.

Tinkal, boraxsaures Natron.




fig. 154.


($a : b : \infty c$) 87° ; ($a : \infty b : \infty c$); ($\infty a : b : \infty c$); ($\infty a : \infty b : c$); ($a : b : c$) $122^\circ 33'$ und ($a : b : 2c$); ($a : \frac{1}{2} b : c$); theilbar $\#$ ($a : \infty b : c$); weiss, ins Graue und Grüne; Fettglanz; verwittert; H. 2—2,5; G. 1,7.

Findet sich in der Dammerde und in Seen in Persien und Thibet.

Braust mit Säuren; schmeckt scharf laugenhaft 320.
320^a. Ritzt Steinsalz; ist luftbeständig:

Trona.

U r a o.




(a:b:∞ c) 47° 30'; (a:∞ b:c) 53° 50'; (a:∞ b:c) 49° 25';
leicht spaltbar $\#$ (a:∞ b:c); weiss bis gelblichgrau; durchsichtig
bis durchscheinend; H. 2,5—3; G. 2,1.

In der Provinz Sukena.

Ritzt nur Talk und zerfällt an der Luft:

Natron.

Kohlensaures Natron.



(a:b:∞ c) 76° 28'; (∞ a:b:c); (a:b:c) 79° 41'; (a:∞ b:c);
(a:∞ b:c); auch derb und staubartig; Bruch muschelrig; weiss;
halbdurchsichtig; H. 1—1,5; G. 1,4.

Aus Gebirgsarten efflorescirend: Ungarn, Tartarei, Persien und
in vielen Mineralquellen.

321. Krystalle mit vollkommenem oder unvollkom-
menem Metallglanze 322


Ohne metallischen Glanz 324

322. Eisengrau 323

Grau, weiss, braun, grün, schwarz, rosenroth,
pfirsichblüthroth, selten schwefelgelb:

Zweiachziger Glimmer.

Lepidolith, Glimmer, Lithionglimmer und Kaliglimmer.



(a:b:∞ c) 120'; (a:∞ b:∞ c); (∞ a:b:∞ c); (∞ a:∞ b:c)
100'; sehr deutlich spaltbar $\#$ (∞ a:∞ b:c); auch tafelartig;
derb, körnig; elastisch, biegsam, milde; H. 2—2,5; G. 2,8—3;
schmelzbar zu grangelbem, blasigem oder farblosem Glase.

Im Granit: Penig, Rozena, Utön, Finbo, Massachusetts.

Kastanienbraun, ins Eisengraue, mit kupfer-
rothen Widerschein auf den Spaltungs-
flächen:

Warwickit.

(a:b:∞ c) 93°; 94°; (∞ a:b:∞ c); spaltbar $\parallel$ (a:∞ b:∞ c); H. 5,5—6; G. 3; enthält Titan, Eisen, Yttrium und Fluor und ist mit Chondroit bei Warwick gefunden.

Broncegelb; St. schwarz; leicht schmelzbar:

Plakodin.

Ni² As.

(a:b:∞ c) 115° 28'; (∞ a:b:∞ c); (3a:2b:∞ c); (∞ a:b:c) 64° 56'; (∞ a:b:2c); (∞ a:b:c) 59° 55'; H. 5—5,5; G. 8.

Auf der Grube Jungfer bei Müsen.

323. Dunkeleisengrau; Strich grau; deutlich blättrig:

Wolfram.

W o l f r a m i t.

Mn W̄ + 3 F̄ W̄.

fig. 156.

(a:b:∞ c) 101° 5'; (a:2b:∞ c); (a:∞ b:∞ c); (a:b:c); (a:½ b:c); (∞ a:b:c) 99° 12'; (a:∞ b:½ c) 61° 39'; (a:∞ b:¼ c) 61° 39'; Zwillinge haben (a:∞ b:∞ c) oder (∞ a:b:c) gemein; leicht spaltbar $\parallel$ (a:∞ b:∞ c); auch derb, strahlig; unvollkommener Metallglanz; H. 5—6; G. 7,2; undurchsichtig; schwer schmelzbar; in heisser Salzsäure zum Theil löslich.

Auf Gängen mit Zinnstein: Zinnwald, Ehrenfriedersdorf, Schlackenwalde.

Graulich - und bräunlichschwarz bis pechschwarz; St. dunkelbräunlichschwarz, nach (a:∞ b:∞ c) spaltbar:

Columbit.

B a i e r i n e.

(Mn Fe Ca) (Ta W̄ Sn.)

fig. 157.

(a:5b:∞ c) 130° 34'; (a:∞ b:∞ c); (a:b:c) 102° 30'; (a:b:c) 120° 30'; (a:∞ b:½ c); (a:∞ b:c) 69° 56'; (a:∞ b:2c); auch derb; unvollkommener Metallglanz; auf Bruchflächen Fettglanz;


undurchsichtig; H. 6; G. 6, 3—6, 46; unschmelzbar; in Säuren unlöslich.

Bodenmais, Finbo, Broddbo; zu unterscheiden ist vielleicht das Harttantalierz von St. Ildefonso.

Schwärzlich bleigrau, ins Eisenschwarze; Strich unverändert; vor dem Löthrohre stark decrepitirend, leicht schmelzbar; reagirt auf Blei:

Plagionit.

R o s e n i t.



(a:b:c); (ā:b:c); (∞ a: ∞ b:c); (a: ∞ b: ∞ c) $107^\circ 32'$; (a:b:2c); (ā:b:2c); ziemlich theilbar $\#$ (a:b:2c); auch derb; H. 2, 5; G. 5, 4.

Auf dem Gange der Jost-Christianszeche bei Wolfsberg.

Hellgrau; dunkelkirschrother Strich; keine deutlichen Blätterdurchgänge; reagirt auf Silber:

Unobinärgülden.

Miargyrit, Hemidomblende.




fig. 158. 159.

(a:b: ∞ c) $89^\circ 38'$; (∞ a: ∞ b:c) $98^\circ 24'$; (a: ∞ b:c); (a: ∞ b: ∞ c); und eine Reihe schiefer Prismen; undurchsichtig; in dünnen Splittern dunkelblutroth durchscheinend; H. 2—2, 5; G. 5, 2—5, 4; leicht schmelzbar.

Auf einem Silbergange bei Bräunsdorf.

- | | |
|---|-----|
| 324. Wasserhelle, weisse oder hellgefärbte, z. B. | |
| hellgraue, graublaue oder grünliche Mineralien | 325 |
| Lebhaft und dunkler gefärbte Körper . . . | 354 |
| 325. Gewicht über 5 | 326 |
| Gewicht zwischen 2,5 und 3,6 | 327 |
| 326. Glänzende, hochlasurblau gefärbte Krystalle: | |

Kupferbleivitriol.

Bleilasur, Kupferbleispath, Linarit.




fig. 160.

(a:b:∞ c) 61°; (a:∞ b:∞ c); (∞ a:b:∞ c); (a:∞ b:c) 77° 15'; (a:∞ a:½ c); (∞ a:∞ b:c) 95° 45'; (a:∞ b:c) 74° 25'; (a:∞ b:½ c); leicht spaltbar $\ddagger$ a:∞ b:∞ c; auch derb; St. hellblau. H. 2, 5—3; G. 5, 4; durchscheinend; leicht schmelzbar.

Auf Gängen zu Leadhills und Linares.

Grünlich- und gelblichweiss, in dünnen Blättchen biegsam:

Kohlenvitriolblei.

Halbvitriolblei, Dioxyolith, Lanarkit.




fig. 161.

(a:b:∞ c); (a:∞ b:½ c); (a:∞ b:⅓ c); nach letzterer Fläche leicht spaltbar; Demantglanz; auf (a:∞ b:c) Perlmutterglanz; St. weiss; durchsichtig; H. 2; G. 6, 8—7; leicht schmelzbar.

Auf Gängen bei Leadhills.

- | | |
|--|-----|
| 327. Vollkommen wasserhell | 328 |
| Durchscheinend, halbdurchsichtig, selten milchweiss, grau oder undurchsichtig | 333 |
| 328. Ritzt Glas | 329 |
| Ritzt Glas nicht | 332 |
| 329. Sehr glänzend, mit vielen Endflächen; hell meergrün; sehr leicht theilbar $\ddagger$ (∞ a:b:∞ c): | |


Euklas.

fig. 162.

(a:b:∞ c) 114° 50'; (2a:3b:∞ c); (5a:12b:∞ c); (∞ a:b:∞ c); (a:b:c); (a:⅓ b:c); (4a:3b:10c); (a:b:c); a:½ b:c; ⅓ a:b:c; (⅓ a:½ b:c); (⅓ a:¼ b:c); Bruch muschelrig; Glasglanz; St. weiss; schmelzbar.

Im Talk- und Chloritschiefer in Brasilien und in Peru.

Mehr weniger glänzend, oft gestreift; deutlich spaltbar; wolkig gefärbt 330

Krystalle mit vielen, sehr verschieden glänzenden Endflächen; keine deutliche Spaltungsrichtung; reagirt auf Borsäure:

Datolith.

Botryolith, Humboldtite.




fig. 163. 164. 165.

(a:b:∞ c) 77° 30'; (a:2b:∞ c); (a:∞ b:∞ c); (∞ a:b:∞ c); (a:b:c); (a:b:½ c) 122°; 133° 47'; 77° 41'; (½ a:b:c); (a:2b:c) (2a:b:c); (4a:2b:c); (a:b:½ c); (⅔ a:b:c); (⅔ a:b:c); (⅔ a:b:½ c); (⅓ a:b:½ c); (a:∞ b:2c); (a:∞ b:c); (a:∞ b:c); (∞ a:b:c); (∞ a:b:½ c); (∞ a:∞ b:c); auch derb, körnig; farblos, weiss, grünlich-, gelblichweiss; durchsichtig bis durchscheinend; glas- bis fettglänzend; (a:∞ b:c) matt; färbt beim Schmelzen die Flamme grün.

Andreasberg, Niederkirchen, Sonthofen, Theiss, Arendal.

Wahrscheinlich ein Afterskrystall ist der bloss aus Kieselerde bestehende, bräunlichrothe bis ochergelbe Haytorit von Hay Tor. in England.

330. Härte des Feldspaths; Gewicht zwischen 2,4 und 2,6; von drei Spaltungsrichtungen zwei sehr deutlich # (a:∞ b:c); (∞ a:b:∞ c):

Feldspath.

Eisspath, Orthoclas, Adular, Murchisonit.




fig. 166. — 175.

(a:b:∞ c) 118° 48'; (3a:b:∞ c); (∞ a:b:∞ c); (a:c:∞ b) 64° 34'; (a:∞ b:2c); (a:⅓ c:∞ b); (a:c:∞ b); (3a:∞ b:2c); (a:3c:∞ b); (⅓ a:½ b:c); (a:¼ b:c); (a:½ b:c); (a:⅓ b:c); (⅓ a:¼ b:c). Zwillinge haben (∞ a:b:∞ c); (a:¼ b:c); oder (a:∞ b:c) gemein. Auch derb; körnig, dicht (Feldstein, Felsit); H. 6; G. 2,6; schwer schmelzbar; durchsichtig, durchscheinend (Adular) bis undurchsichtig (Mikroklin). Der Murchisonit ist ein gelblichgrauer Adular von der Insel Arran; der grünlichgraue oder olivengrüne Hyposklerit von Arendal, und der derbe, lichtbraun-

rothe, kantendurchscheinende, schön in blaue Farbe spielende **Peristerit** aus Ober-Canada gehören auch hierher.

In plutonischen und vulkanischen Gebirgsarten überall häufig.

Weicher als Feldspath; Gewicht 3,2 bis 3,5 331
 331. Fast rechtwinklige, lang gezogene, längsge-
 streifte Säulen mit zwei deutlichen Blätter-
 durchgängen; leicht schmelzbar . **Diopsid** 387
 Rhombische, stumpfe Säule von 130° ; schwer
 schmelzbar; reagirt mit Borax auf Titansäure:

Titanit.

Braun- und Gelb-Menakerz, Sphen, Piktit.



fig. 176 — 180.

($a:b:\infty c$) $133^\circ 54'$; ($3a:b:\infty c$); ($\infty a:b:\infty c$); ($a:b:\frac{1}{2}c$);
 ($a:\frac{1}{2}b:\frac{1}{3}c$); ($\dot{a}:b:\frac{1}{3}c$); ($3\dot{a}:b:\frac{1}{2}c$); ($\infty a:b:c$) $113^\circ 30'$; ($3a:b:$
 c); ($\infty a:\infty b:c$) $85^\circ 6'$; ($a:\infty b:c$); ($\dot{a}:\infty b:c$); ($5a:\infty b:9c$);
 ($14a:\infty b:9c$); bei Zwillingen spiegeln die beiden Endflächen in
 die Seitenflächen ein; deutlich spaltbar $\#$ ($a:b:\infty c$); auch derb;
 gras-, spargel-, ölgrün; isabell-, wein-, honiggelb; röthlichbraun;
 durchsichtig bis undurchsichtig; Demant- bis Fettglanz; H. 5—5,5;
 G. 3, 46.

Auf Gängen: St. Gotthard, Zillerthal, Arendal; im Granit und
 Syenit: Passau, Frederikswärn.

332. Leicht schmelzbar; auf der deutlichen Spal-
 tungsfläche $\#$ ($\infty a:b:\infty c$) Perlmutterglanz:

Heulandit.

Stilbit, Euzeolith.




fig. 181.

($\infty a:b:\infty c$); ($a:\infty b:\infty c$); ($a:\infty b:c$); $60^\circ 20'$; ($\dot{a}:\infty b:c$)
 $63^\circ 40'$; ($2a:b:c$); ($2a:3b:c$); auch derb; Glas-, auf ($\infty a:b:$
 ∞c) Perlmutterglanz; weiss, ins Rothe, Graue, Braune; auch ziegel-
 roth; durchsichtig bis kantendurchscheinend; H. 3, 5—4; G. 2, 2.
 Island; Faröer, Fassathal, Campsin, Arendal, Andreasberg.

Glasglanz; schwer schmelzbar, leicht spaltbar #
($\infty a : b : \infty c$):

Gyps.

Fraueneis.




fig. 182 — 185.

($a : b : \infty c$) $111^{\circ} 14'$; ($2a : b : \infty c$); ($3a : b : \infty c$); ($a : \infty b : \infty c$); ($\infty a : b : \infty c$); ($4a : b : \infty c$); ($5a : 2b : \infty c$); ($a : b : c$) $143^{\circ} 28'$; $122^{\circ} 22'$; $71^{\circ} 33'$; ($\dot{a} : b : c$); Zwillinge haben ($a : \infty b : \infty c$); ($\infty a : b : \infty c$) oder ($a : \infty b : c$) gemein; die Säulenflächen sind längsgestreift; weiss, fleischroth, gelb, grau; St. weiss; durchsichtig bis durchscheinend; H. 1, 5—2; G. 2, 3.

In der Gypsformation und in Thonlagern sehr verbreitet.

333. Stark grau 334

Milchweiss, graulich - oder gelblichweiss, oder
hellgrün 335

334. Lang gezogene, stumpfe Säulen von 124° , längsgestreift und der Länge nach spaltbar; schmelzbar ohne Aufblähen; im Dolomit

Tremolit 381

Säule von 116° ; eine Spaltungsrichtung; mit Aufschwellen schmelzbar

Zoisit 379

335. Ritzt Glas 336

Von Stahl leicht geritzt 346

336. Lang gezogene Krystalle 337

Etwa so lang, wie dick 345

337. Längsgestreift, leicht schmelzbar 338

Schwer zu weissem Email schmelzbar 339

338. Krystalle mit einem Längsprisma; zwei deut-

liche Blätterdurchgänge von 124° **Tremolit 381**

Krystalle mit zahlreichen Endflächen und zwei

fast rechtwinkligen Blätterdurchgängen **Diopsid 387**

Deutlich spaltbar nur nach der schiefen End-

fläche, glimmerartig, perlgrau; schmelzbar

unter Anschwellen:

Perlglimmer.

Margarit.

(a:b:∞ c) 120°; (∞ a:b:∞ c); (a:c:∞ b); gewöhnlich derb, körnig; blass perlgrau, ins Röthlich – und Graulichweisse; St. weiss; halbdurchsichtig bis durchscheinend; Glasglanz; auf der schiefen Endfläche Perlmutterglanz; in dünnen Blättchen elastisch biegsam; H. 3, 5—4, 5; G. 3. Enthält Si 37; Al 40; Fe 4, 5; Ca 8, 96; Na 1, 24; H 1, 00. Lagerartig mit grünem Chlorit bei Sterzing in Tyrol.

339. In Säuren nicht auflöslich 340^a
 In Säuren löslich 340
 340. In Salzsäure zur vollkommenen steifen Gallerte auflöslich:

Feldspath.

Schaalstein, Wollastonit, Zurlit.


Ca^a Si.

(a:b:∞ c) 95° 38'; (a:∞ b:∞ c); (a:∞ b:c) 69° 48'; (a:b:c); deutlich spaltbar $\ddagger$ (a:b:∞ c) und (a:∞ b:∞ c); gewöhnlich derb, schalig, stängelig; weiss, ins Graue, Gelbe, Rothe und Braune; St. weiss; Glasglanz; auf Theilungsflächen Perlmutterglanz; halbdurchsichtig bis kantendurchscheinend; H. 4, 5—5; G. 2, 8—2, 9. Bei Auerbach am Vesuv, im Bannate.

- In Salzsäure, mit Hinterlassung von Kieselerde, aber ohne Gallerte zu bilden, löslich **Labrador** 396
 340^a. Die Krystalle haben die Längsfläche gemein und sind in einander eingewachsen und verdreht 341
 Sie sind diess nicht 343
 341. Die Zwillinge haben keine einspringenden Winkel **Feldspath** 330
 Sie haben einspringende Winkel 344
 342. Perlmutterglanz 343
 Glasglanz, rissig:

Rhyakolith.

Glasiger Feldspath z. Th.



Formen des Feldspaths; weiss, ins Graue; durchsichtig bis durchscheinend; H. 6; G. 2,62; leichter schmelzbar; in Säure scheidet sich die Kieselsäure als Pulver ab.

In Auswürflingen des Vesuvs und der Eifler Vulkane.

343. Nicht farbenspielend **Feldspath** 330

Farbenspielend, gelblichgrau . . . **Murchisonit** 330

344. Perlmutterglanz, halbopalartig; Säule von $119^{\circ}30'$. . . **Albit** 396^a

Glasglanz; wasserhelle Krystalle sehr glänzend;

Säule von $117^{\circ}28'$ **Anorthit** 396^b

345. Etwas grünlich; schwer schmelzbar zu einem dunkeln Glase; reagirt mit Borax auf Titansäure **Titanit** 331

Schmilzt zu weissem Email und reagirt nicht auf Titansäure . . . **Feldspath** 330 oder 340

346. Gewicht etwa 2,6 347

Gewicht etwa 3,6, schmutzigweiss:


Baryto-Calcit.

fig. 186.

(a:b:∞ c) $95^{\circ}15'$; (2 a:b:∞ c); (∞ a:∞ b:c) $69^{\circ}30'$; (a:∞ b:c) 135° ; (ā:∞ b:c) 119° ; (a:b:c); (∞ a:b:xc); vollkommen theilbar $\ddagger$ (a:b:∞ c); granlich-, gelblich-, grünlichweiss; durchsichtig bis durchscheinend; Glasglanz bis Fettglanz; H. 4; G. 3,6.

Bei Alstonmoor in Cumberland.

347. Lebhaft glänzend; bisweilen mit Perlmutterglanz 348

Wenig glänzend; milchartiger Perlmutterglanz;

bisweilen schmutziggrau 350

348. Blättriges Gefüge 349
Weiss; muscheliger Bruch; bedeckt sich an der
Luft mit einem weissen Ueberzuge:

Natro-Calcit.

Gaylussit.




fig. 187.

(a:b:∞ c) 68° 50'; (a:∞ b:∞ c); (∞ a:b:∞ c); (∞ a:∞ b:c) 101° 33'; (ā:∞ b:c) 109° 30'; (∞ a:b:c) 51° 54'; weiss; durchsichtig bis durchscheinend; H. 2, 5; G. 1, 9; schmilzt leicht.

In einer Thonschicht am Natronsee zu Lalagumilla in Columbien.

349. Milde, in Säuren unlöslich **Gyps** 332

Härter; in Säuren löslich **Heulandit** 332

In Salpetersäure löslich mit Rückstand von
weisschwefelsaurem Bleioxyd:

Plumbärblerz.

Leadhillit, Phyllinspath.




fig. 155.

(a:b:∞ c) 59° 40'; (a:4b:∞ c); (a:∞ b:∞ c); (∞ a:∞ b:c) 90° 29'; (a:∞ b:2c); (a:∞ b:c); (a:∞ b:½ c); (ā:∞ b:2c); (a:b:c) 72° 36'; (a:b:½ c); (a:2b:c); (a:4b:2c); (a:4b:c); (a:4b:2c); (∞ a:b:½ c); (∞ a:b:¼ c); (∞ a:b:¾ c); (a:b:c); (ā:b:½ c); (ā:2b:c); (ā:4b:c); (a:4b:½ c); deutlich spaltbar # (∞ a:∞ b:c); Zwillinge haben (a:3b:∞ c) gemein; auch derb; gelblichweiss, ins Graue, Gelbe, Grüne und Braune; St. weiss; durchsichtig bis durchscheinend; Fettglanz, in den Demant-, auf (∞ a:∞ a:c) in den Perlmutterglanz geneigt.

Auf einem Gange bei Leadhills in Schottland.

350. Verändert sich an der Luft nicht 351

Zerfällt an der Luft; spaltbar # Längs- und
Querfläche:

Caumontit.



fig. 188.

(a:b:∞ c) 86° 15'; (∞ a:∞ b:c) 85° 31'; (a:∞ b:∞ c); (∞ a:b:∞ c); (ā:∞ b:c) 113° 30'; (ā:∞ b:½ c); auch derb;

Säule längsgestreift; weiss, ins Gelbliche und Graue; seltener röthlich; durchsichtig bis kantendurchscheinend; H. 5—6; G. 2, 2—2, 3; schmelzbar.

Als Gemengtheil von Felsarten: Prag, Huelgoet, Schemnitz, Monzoniberg, Fahlun.

Sehr nahe steht der Leonhardt von Niederkirchen und Schemnitz; er unterscheidet sich hauptsächlich dadurch, dass die Mittelseiten hier scharf, beim Laumontit stumpf sind, durch geringere Härte (3—3, 5) und durch etwas geringeren Kieselgehalt.

351. Leicht und ohne Geruch schmelzend . . . 352
Schmilzt mit Arsengeruch:

Pharmakolith.

A r s e n i k b l ü t h e .




fig. 189.

(a:b:∞ c) 117° 24'; (a:3b:∞ c); (∞ a:b:∞ c); (∞ a:∞ b:c) 83° 14'; spaltbar $\ddagger$ (∞ a:∞ b:c); auch nadel-, haar- und büschelförmig; nierenförmig, als Ueberzug und angeflogen; weiss; durchsichtig bis durchscheinend; seidenglänzend bis schimmernd; H. 2—3; G. 2, 6—2, 7; etwas biegsam.

Auf Gängen bei Wittichen, Riechelsdorf, Joachimsthal.

352. Nadelförmige, aber erkennbare Krystalle:
schmilzt leicht zu einem weissen Email **Stellit** 275^a
Deutliche, sechsseitige Krystalle, mit einem
Octaëd oder einem Prisma endigend . . . 353

353. Mit vier Flächen zugespitzt; krümmt sich vor
dem Schmelzen wurmförmig:

Skolezit.

Mesotyp von Island.




fig. 190.

(a:b:∞ c) 91° 35'; (a:∞ b:∞ c); (a:b:c) 51° 51'; (Seitenkante); Zwillinge mit einspiegelnder und federartig gestreifter Querfläche; spaltbar $\ddagger$ (a:b:∞ c); auch derb, stängelig; weiss; Glasglanz; durchsichtig bis durchscheinend; H. 5—5, 5; G. 2, 2.

Auf Staffa, Island und in Hindostan.

Endet mit einem niedrigen Prisma; wird vor dem Löthrohre, nach Verlust des Wassers, undurchsichtig und schmilzt dann schwer:

Brewsterit.




fig. 191.

Eine gerundete Säule, aus mehreren Prismen und ($\infty a:b:\infty c$) bestehend und geschlossen durch ($\infty a:b:c$) 172° ; vollkommen theilbar $\parallel$ ($\infty a:b:\infty c$); hier Perlmutter-, übrigenfalls Glasglanz; weiss, ins Gelbe und Graue; H. 5—5,5; G. 2.

Zu Strontian, am Riesenwege in Irland und zu St. Turpet bei Freiburg im Breisgau.

354. Roth, braunroth, nelkenbraun oder gelb . . . 355

Grünblau oder schwarz . . . 371

355. Roth oder rosenroth . . . 356

Röthlichbraun, nelkenbraun oder gelb . . . 361

356. Roth . . . 357

Rosenroth, kirsch-, pfirsichblüthroth . . . 359

357. Bedeutendes specifisches Gewicht 6:

Rothbleierz.

Kallochrom; chromsaures Blei, Bleichromat, Krokoit.




fig. 193—195.

($a:b:\infty c$) $93^\circ 40'$; ($2a:b:\infty c$); ($3a:5b:\infty c$); ($5a:3b:\infty c$); ($a:b:c$) 119° ; ($a:b:2c$); ($\infty a:b:c$) $96^\circ 1'$; ($\infty a:b:2c$); ($a:b:c$) $107^\circ 40'$; ($3a:2b:\frac{1}{2}c$); ($a:b:3c$); ($\infty a:b:\infty c$); ($a:\infty b:\infty c$); ($\infty a:\infty b:c$); ($a:\infty b:2c$); ($a:\infty b:c$); ($a:\infty b:c$); . deutlich spaltbar $\parallel$ ($a:b:\infty c$); auch verworren stängelig; morgenroth oder hyacinthroth; St. pommeranzengelb; durchscheinend; diamantglänzend; H. 2,5; G. 6; schmelzbar.

Auf Erzgängen bei Beresowsk und in Brasilien.

Gewicht zwischen 2,6 und 4,23 . . . 358

358. Zerreiblich; beim Schmelzen Arsengeruch; verflüchtigt sich:

Rauschroth.

Realgar, rothe Arsenikblende.

As.

fig. 196.

(a:b:∞ c) 74° 30'; (a:2b:∞ c); (3a:4b:∞ c); (3a:2b:∞ c); (2a:5b:∞ c); (a:∞ b:∞ c); (∞ a:b:∞ c); (a:∞ b:c) 73° 18'; (ā:∞ b:⅔ c); (ā:b:⅔ c); (a:⅔ b:c); (a:⅓ b:c); (a:⅙ b:c); (ā:⅔ b:⅔ c); (ā:⅔ b:⅔ c); (ā:⅔ b:⅔ c); (⅓ a:⅓ b:⅓ c); (⅓ a:⅓ b:⅓ c); (⅓ a:⅓ b:⅓ c); ziemlich deutlich spaltbar $\ddagger$ (ā:∞ b:⅔ c) und (∞ a:b:∞ c); auch derb, als Ueberzug und Anflug; morgenroth, ins Scharlachrothe und Gelbe; oft braun angelaufen; St. gelbroth; Fettglanz; halbdurchsichtig bis durchscheinend; H. 1,5—2; G. 3,6; flüchtig.

Auf Gängen im Dioritporphyr: Felsöbanya, Kapnik; im Thonschiefer bei Andreasberg; auf Lagern des Dolomits am St. Gotthard; im Thon in Ungarn und in vulkanischen Kratern.

Giebt auf Kohle Antimondämpfe und ein Silberkorn:

Feuerblende.

fig. 192.

(a:b:∞ c); (∞ a:b:∞ c), sehr vorherrschend; (a:∞ b:∞ c); (a:b:c); (ā:b:c); (a:∞ b:c) 118°; (ā:∞ b:c) 112°; spaltbar nach beiden schiefen Endflächen; die Krystalle erscheinen als dünne, büschelförmig an einander gewachsene Blättchen; auch derb, stängelig; hyacinthroth; perlmutterartiger Demantglanz; durchscheinend; H. 2. G. 4,20—4,23; enthält Schwefelsilber und Schwefelantimon.

Auf Gängen bei Freiberg und Andreasberg.

Zwischen den Fingern nicht zerreiblich; Perlmut-

terglanz; ohne Geruch schmelzbar **Heulandit** 332

359. Zerreiblich zwischen den Fingern, pfirsichroth oder carmoisinroth:

Kobaltblüthe.

Rother Erdkobalt; arsensaures Kobaltoxyd.




fig. 197. 198.

(∞ a:b:∞ c); (a:∞ b:c); (∞ a:∞ b:c) 104° 51'; (2a:3b:∞ c) 94° 12'; (a:3b:∞ c); (∞ a:b:c) 118° 23'; vollkommen


spaltbar $\#$ ($\infty a:b:\infty c$); auch nadel-, büschel-, nierenförmig, faserig, erdig, als Anflug; trocken zerrieben lavendelblau; durchscheinend bis undurchsichtig; Glasglanz; auf ($\infty a:b:\infty c$) Perlmutterglanz; schmelzbar.

Auf Kobaltgängen: Schneeberg, Joachimsthal, Saalfeld, Riechelsdorf, Wittichen, Allemont.

Kirschroth, krystallisirt in feinen Nadeln:

Rothantimonerz.

Rothspiessglanzerz, Antimonblende, Pyrantimonit, Mineralkermes.



($a:\infty b:\infty c$); ($a:\infty b:c$) 146° ; ($\infty a:\infty b:c$); ($a:\infty b:xc$) 164° ; Krystalle nach der Axe b langgezogen, nadelförmig oder haarförmig, büschelförmig oder zu zunderartigen Lappen (Zundererz) verwachsen; spaltbar $\#$ ($a:\infty b:\infty c$); Demantglanz; St. unverändert; schwach durchscheinend; H. 1—1,5; G. 4,55; schmelzbar.


Auf Gängen: Bräunsdorf, Przibram, Felsöbanya, Andreasberg, Clausthal, Wolfsberg.

Krystalle hart 360

360. Ritzt Glas, ist lebhaft rosenroth und hat zwei deutliche Blätterdurchgänge . . . **Thulit** 379

Wird durch Stahl geritzt; so hart wie Flussspath; hellroth; feldspathähnliche Krystalle:

Amphodelit.



Zwei Blätterdurchgänge schneiden sich unter $94^\circ 19'$; H. 4, 5; G. 2, 76.

Kalkbruch zu Lojo in Finnland und in Obercanada.

361. Wachs-, honig-, grünlich- oder weingelb . . . 362

Röthlichbraun, oder bräunlichgelb, oder nelkenbraun 363

Schwefelgelb.

Atelestit.

Durchsichtig bis durchscheinend; fett- bis demantglänzend; H. 6; schwer; reagirt auf Wismuth.

Sitzt in kleinen Krystallen auf Kieselwismuth bei Schneeberg.

362. Wachsgelb, undurchsichtig; zwei deutliche Blätterdurchgänge; mit Kalkstein oder Graphit:

Chondroit.

B r u z i t.




fig. 199.

(a:∞b:c) 147° 48'; (∞a:b:c) (a:b:c) 67° 48'; auch in Körnern und derb; Glasglanz; St. weiss; H. 6, 5; G. 3, 2.

In Kalkstein bei Abo und Pargas; mit Graphit in Nordamerika. Wahrscheinlich ist der Humit vom Vesuv hierher zu rechnen.

Honiggelb, Strich weiss; durchsichtig:

Danburit.

Schiefe rhombische Prismen; Glasglanz; wasserhaltig; vor dem Löthrohre phosphorescirend und zu einem weissen, blasigen Glase schmelzend; H. 7, 5; G. 2, 83; enthält hauptsächlich Kieselsäure und Kalkerde; bei Danbury in Connecticut.

Weingelb bis orangegelb; muscheliger Bruch; auf Quarz im Thonschiefer:

Wagnerit.

Phosphorsaurer Talk.




fig. 200.

(a:b:∞c) 57° 35'; (a:2b:c); (a:3b:c); (a:∞b:c) 71° 53'; (a:∞b:c) 63° 25'; und zwei sehr entwickelte Diagonalzonen; Glasglanz; H. 5—5, 5; G. 3, 1; St. weiss; schwer schmelzbar.

Mit Quarz auf Gängen im Thonschiefer; im Höllgraben bei Werfen im Salzburgischen; sehr selten.

363. Rothbraun 364

Braungelb und nelkenbraun 368


364. Braunroth wie Zirkon 366

Dunkelbraunroth wie Granat; undurchsichtig 365

365. Glänzende Krystalle mit zwei deutlichen Spaltungsrichtungen; schwer schmelzbar; dabei die Farbe einbüssend und grau werdend; auf Gneus angewachsen . . . **Edwardsit** 367

Heller gefärbt, leicht zu einem schwarzen, metallisch-glänzenden Email schmelzbar, mit Dufrenit (Grüneisenstein) zusammen vorkommend:

Huraulit.



(a:b:∞ c) 62° 30'; (∞ a:∞ b:c) 88°; Säule längsgestreift; auch knollig, kugelig; körnig; stängelig; Glasglanz; durchsichtig; H. 3, 5; G. 227.

Auf Gängen im Granit bei Hureaux.

366. Hart, ritzt Glas 367

Von der Härte des Apatits:

Oersledtit.

Vielleicht zwei- und einaxig und dann (a:a:c) 123° 16'; (a:a:∞ c); (a:∞ a:∞ c) nebst zweien schiefen Quadratoctaëden und einem Dioctaëder; H. 5, 5; G. 3, 6; wasserhaltig; unschmelzbar; enthält viel Titansäure, Kieselsäure und Zirkonerde.

Auf Augitgestein bei Arendal.

Lässt sich durchs Messer ritzen; reagirt auf Mangan:

Fowlerit.

(a:b:∞ c) 86° 30'; (∞ a:∞ b:c) 108°; nach der Säule deutlich theilbar; röthlich braun; G. 3, 4; enthält Manganoxydul, Eisenoxyd, Kieselsäure und Wasser.

In grossen Krystallen zu Franklin.

3

67. Kurze Krystalle:

Monazit.

E d w a r d s i t ?

fig. 201.

(a:b:∞ c) 94° 35'; (∞ a:b:c) (∞ a:∞ b:c); (a:∞ b:c); (a:b:c); (a:½ b:c); spaltbar $\ddagger$ (∞ a:∞ b:c); Fettglanz

St. röthlichgelb; H. 5—6; G. 5; unschmelzbar. Ist wahrscheinlich ein Phosphat von Ceroxyd, Lanthanoxyd und Thorerde.

Findet sich mit gelbem Feldspath im Ilmengebirge; der Edwardsit im Gneise bei Norwich in Connecticut.

Krystalle sehr lang gezogen:

Sillimanit.

X e n o l i t h.

Äl Si.

(a:b:∞ c) $106^{\circ} 30'$; (a:∞ b:∞ c); (∞ a:∞ b:c) 113° ; theilbar $\ddagger$ (a:∞ b:∞ c); Bruch uneben und splitterig; Fettglanz; im Bruche Glasglanz; wasserhell, gelblich und dunkelgrau, ins Nelkenbraune; kantendurchscheinend bis durchsichtig; unschmelzbar.

Auf einem Quarzgange zu Saybrook in Connecticut.

Krystalle sehr stumpf (136°), in ein Prisma endigend; im amphibolischen Gestein, oft mit

Epidot **Sphen** 331

368. Gestalt eines etwas stumpfen Rhomboëders . 369

Die Säulenflächen unter sich und gegen die Endfläche bilden sehr verschiedene Winkel 370

369. Säule $116^{\circ} 10'$; Säule und Endfläche $99^{\circ} 40'$

Turnerit.

fig. 202.

Theilbar nach der Basis und Querfläche; gelb, ins Braune; St. weiss oder graulich; fast Demantglanz; durchsichtig bis durchscheinend; ritzt Flussspath; enthält: Ca, Al, Mg, Fe, Si.


Findet sich mit Anatas am Mont Sorel in der Dauphinée.

Säule $98^{\circ} 22'$; zur Endfläche $95^{\circ} 5'$ **Haydenit** 166

370. Säule $109^{\circ} 30'$; zur Endfläche $101^{\circ} 30'$; wasserhaltig; wird in der Flamme weiss und schmilzt an den Kanten zu einem durchsichtigen Glase;

Fahlunit.

T r i k l a s i t.



Auch nierenförmig und derb; oliven- und ölgrün, ins Gelbe, Braune und Schwarze sich ziehend; St. weißlich; Glas-, bis Fettglanz; kantendurchscheinend bis undurchsichtig; H. 2, 5—3; G. 2, 6; wasserhaltig; in Säuren unauflöslich.

Im Talk- und Chloritschiefer zu Fahlun und bei Abo.

Säule $93^\circ 10'$, zur Endfläche $140^\circ 40'$; wird in der Flamme durchsichtig ohne zu schmelzen; Schwefelsäure entwickelt Flusssäure:

Eremit.

An der Säule herrscht eine Querfläche vor; nelken- bis gelblichbraun; St. blasser; halbdurchsichtig; Krystalle glänzend; ist vielleicht ein Fluotitanat. — In Connecticut in Geschieben.

- | | |
|--|-----|
| 371. Schwarz, mit schwarzem, dunkelgrauem oder grünlichem Strichpulver | 382 |
| Blau oder grün | 372 |
| 372. Dunkelblau | 373 |
| Blass indigblau, ins Seladongrüne; äusserlich oft berg- bis lauchgrün: | |

Synplesit.

Krystallisirt wie Kobaltblüthe; auch $(\infty a : b : \infty c)$; vollkommen theilbar; auf der Theilungsfläche Perlmutterglanz; durchscheinend bis halbdurchsichtig; St. sehr blass; H. 2, 5; G. 2, 95; unschmelzbar; enthält Arsenik und Eisen.

Auf Eisenlagerstätten zu Lobenstein.

- | | |
|--|--------------------------------|
| Bouteillen- oder smaragd- oder blaugrün | 376 |
| 373. Hart, ritzt Glas | Lazulith 385 |
| Ritzt Glas nicht | 374 |
| 374. Gewicht über 5,0 | Lasurigbleivitriol 285. |
| Gewicht zwischen 2,5 und 3,4 | 375 |
| 375. Lang gezogene Krystalle, nach der Längsfläche leicht spaltbar, zu einem schwarzen Email | |

Strahlerz.


fig. 208.

($a:b:\infty c$) 56° ; ($\infty a:\infty b:c$) $100^\circ 42'$; ($a:\infty b:c$); auch halb kugelig; nierenförmig; theilbar $\#$ ($\infty a:\infty b:c$); durchscheinend; H. 2,5—3; G. 4,2. Ist ein arsensaures Kupfer und Eisenoxyd und findet sich in Cornwall.

Schwärzlich-, oliven-, zeisiggrün; schmilzt in der Flamme unter Schäumen zu einer dunkelgrünen, metallglänzenden Kugel:

Vauquelinit.

B l e i c h l o r i t.



($\infty a:\infty b:c$) $67^\circ 15'$; ($a:b:c$); ($a:\infty b:c$) $36^\circ 15'$; meist Zwillinge, mit ($a:\infty b:\infty c$) verwachsen; auch derb, traubig, nierenförmig; Demant- bis Fettglanz oder matt; St. zeisiggrün, ins Braune; schwach durchscheinend bis undurchsichtig; H. 2,5—3; G. 5,5—5,78.

Auf Gängen mit Rothbleierz bei Beresow.

378. Matte, faserige, in Säuren mit Aufbrausen lösliche Krystalle:


Malachit.

fig. 209.

($a:b:\infty c$) $103^\circ 42'$; ($a:\infty b:\infty c$); ($a:\infty b:c$) $61^\circ 49'$; ($\infty a:\infty b:c$); Zwillinge haben ($a:\infty b:\infty c$) gemein; spaltbar $\#$ ($\infty a:\infty b:c$) und ($\infty a:b:\infty c$); meist nadelförmig, büschelförmig, halb kugelig, nierenförmig, traubig; derb, eingesprengt, angeflogen; smaragd- und grasgrün, ins Schwärzlich- und Spangrüne; durchscheinend bis undurchsichtig; Demant- bis Glasglanz; matt; schmelzbar zum Metallkorn.

Mit Kupferlasur zusammen vorkommend.

Krystalle stark glänzend, sehr dunkelgrün, in Säuren ohne Aufbrausen löslich; leicht schmelzbar:

Phosphatkupfererz.




fig. 210.

(2a:b:∞c) 38° 56'; (a:∞b:∞c); (a:b:c) 117° 49'; (∞a:∞b:c); (a:∞b:½c); (a:∞b:½c) 76° 34'; (∞a:b:c); (a:b:½c); auch rauh nierenförmig; derb, krummschaalig; kaum spaltbar; Demant- bis Glasglanz; St. etwas heller; kaum durchscheinend; H. 4,5—5; G. 4,2.

Auf Gängen bei Rheinbreitenbach und Libethen.

379. Die langgezogenen Krystalle am Ende mit sehr unregelmässigen Flächen; gewendet zwei- und eingliedrige Formen; Säule-Verticalzone; schwillt beim Schmelzen an:

Epidot.

Pistazit, Zoisit, Manganepidot, Piemontesischer Braunstein; Arendalit, Withamit, Thulit, Comingtonit.

fig. 211 — 213.

(a:b:∞c); (½a:∞b:c); (⅓a:∞b:c); (⅓a:½b:c); (½a:½b:c); (⅓a:½b:c); (⅓a:∞b:c); (a:∞b:∞c); (⅓a:∞b:c); (a:½b:c); (⅓a:½b:c); (⅓a:½b:c); (⅓a:⅓b:c); (∞a:b:∞c); spaltbar $\parallel$ (a:∞b:3c); Zwillinge haben (a:∞b:5c) gemein; auch derb, strahlig, stängelig, faserig, körnig, dicht; grün und grau; ins Schwarze und Weisse verlaufend; St. graulichweiss; halbdurchsichtig bis kantendurchscheinend; Glasglanz; H. 6—7;

G. 3, 2—3, 4. Man unterscheidet: 1) Kalkepidot: $\text{Ca}^{\text{II}} \text{Si} + 5 (\text{Al Fe}) \text{Si}$; strahlig, stängelig; graulichweiss, aschgrau, gelblichgrau, ochergelb (Zoisit); karminroth (Withamit); rosenroth (Thulit); 2) Eisenepidot (Pistazit): $\text{Ca}^{\text{II}} \text{Si} + (\text{Al Fe}) \text{Si}$; krystallisirt, körnig, derb, pistazien-, schwärzlich-, oliven-, öl- und zeisiggrün; 3) Manganepidot $\text{Ca}^{\text{II}} \text{Si} + 3 (\text{Al Mn Fe}) \text{Si}$; krystallisirt, stängelig; dunkelkirschroth.

Auf Gängen und Lagern und eingesprengt im ältern Gebirge; sehr verbreitet.

- Krystalle mit einem Längsprisma am Ende . 380
 380. Säule fast rechtwinklig, mit doppelter oder vierfacher Zuspitzung **Diopsid** 387
 Säule sehr stumpfwinklig, in ein Prisma oder dreifache Zuspitzung endigend 381
 381. Säule von 124° — 125° ; zwei deutliche Blätterdurchgänge nach der Säule:

Hornblende.

Karinthin, Kalamit, Asbest z. Th., Strahlstein, z. Th., Tremolith, strahliger Antophyllit, Amphibol, Grammatit, Arfvedsonit, Aktinot, Pargasit, Uralit.

fig. 214. — 218.

($a:b:\infty c$) $124^{\circ} 30'$; ($\infty a:b:\infty c$); ($a:\infty b:\infty c$); ($a:\frac{1}{2}b:c$) $148^{\circ} 30'$; ($a:\infty b:c$); ($a:\frac{1}{4}b:c$); ($a:\frac{1}{6}b:c$); ($\frac{1}{3}a:\frac{1}{2}b:c$); ($\frac{1}{3}a:\frac{1}{6}b:c$); ($a:\infty b:c$), ($2a:b:\infty c$); ($a:\infty b:3c$); ($\frac{1}{3}a:\frac{1}{4}b:c$); ($\frac{1}{5}a:\frac{1}{2}b:c$); Zwillinge haben ($a:\infty b:\infty c$) gemein; auch büschelförmig, derb, strahlig, stängelig, körnig, schieferig; Glasglanz; H. 5—6; G. 2, 9—4, 3; halbdurchsichtig bis undurchsichtig; weiss, grau, braun, grün, schwarz; man unterscheidet: 1) Tremolith (Grammatit), $\text{Ca Si} + \text{Mg}^3 \text{Si}^2$; weisslich bis grau; stängelförmig oder nadel-förmig; Perlmutter- oder Seidenglanz. 2) Strahlstein (Aktinot), grün, leberbraun, graugrün; Glas- bis Seidenglanz: $\text{Ca Si} + (\text{Mg}^3 \text{Fe}^3) \text{Si}^2$ lange Säulen ohne Endflächen, büschelförmig bis strahlig. 3) Gemeine Hornblende, krystallisirt, bisweilen in Form von Augit (Uralit); derb, stängelig, strahlig, körnig; schwärzlich. 4) Basaltische Hornblende, thonerdereicher; Krystalle, derb, eingesprengt, pech- oder samtschwarz; in basaltischen Gebilden. 5) Antophyllit: $\text{Fe Si} + \text{Mg}^3 \text{Si}$; unschmelzbar, derb, strahlig; nelkenbraun ins Leberbraune; kantendurchscheinend; schwach perlmutterglänzend. Hierher gehört auch wohl der im Zirkonsyenit bei Brevig vorkommende Aegyrin.

Im Dolomit, körnigen Kalkstein, im Talk-, Chlorit- und Glimmerschiefer, auf Lagern von Magneteisenstein, im Basalt und Lava sehr verbreitet. Gemenge von Augit und Hornblende bilden den Smaragdit.

Säule von 140° ; keine deutlichen Blätterdurchgänge:

Figurit.

Apfelgrün; Glasglanz; Feldspathhärte; ein Kalk- und Thonerdesilikat; findet sich in den Apenninen:

382. Schwarz, fast Harzglanz; brauner Strich; ritzt leicht Glas; Gewicht 4 oder mehr . . . 383
 Schwarz ins Thonschieferblaue . . . 384
 383. Schmilzt mit Aufblähen; wasserhaltig:


Gadolinit.


fig. 219. 220.

(a:b:∞ c) 109° 28'; (2 a:b:∞ c); (∞ a:b:∞ c); (a:b:c); (a:b:½ c); (a:∞ b:½ c); untheilbar; auch derb, Bruch muschelig; dunkel grünlichschwarz; Glas - bis Fettglanz; St. grünlichgrau; etwas kantendurchscheinend; H. 6,5—7; G. 4,2.

Im Gneis bei Ytterby, Finbo, Broddbo und in Grönland.

Schwer schmelzbar, ohne Aufblähen; fast wasserfrei . . . **Allanit** 400

384. Langgezogene, fast rechtwinklige Säulen mit der wenig geneigten Endfläche; Strich grau; schmilzt zu einem weissen Email:

Couzeranit.

(a:b:∞ c) 96°; (∞ a:b:∞ c); (∞ a:∞ b:c) 92°; Bruch muschelig bis uneben; schwarz oder schwarzindigblau; Glasglanz, in den Fettglanz geneigt; undurchsichtig; ritzt Glas, aber nicht Quarz.

Im körnigen Kalke der Pyrenäen bei Couzerans.

Schmilzt zu einem schwarzen Email; Krystalle in ein Prisma oder mehrere Flächen auslaufend . . . 385

385. Scheitel wenigstens mit drei Flächen . . . 386

Scheitel mit vorherrschendem Längsprisma . . . 387

386. Niedrige Scheitelflächen, gewöhnlich 3; die Basalfläche rhombisch . . . **Hornblende** 381

Gewöhnlich mit 4 Flächen zugespitzt; bei nur 3 Flächen, die Basis rechtwinklig:

Achmit.

A k m i t,

Na $\ddot{\text{Si}}$ + $\ddot{\text{F}}$ $\ddot{\text{Si}}$.

fig 221.

(a:b:∞ c) 86° 56'; (∞ a:b:∞ c); (a:∞ b:∞ c); (a:b:c) 119° 30'; (a:b:4 c); (3 a:5 b:4 c); Zwillinge wie beim Augit; theilbar $\ddagger$ (a:b:∞ c); grünlichgrau bis bräunlichschwarz; St. grau; kaum durchscheinend; Glasglanz; H. 6—6,5; G. 3,2—3,3.

Im Syenit von Norwegen bei Egers und Kless.

387. Mit einem schiefen vordern Prisma:

Augit.

Kokkolith, Diopsid, Asbest z. Th., Strahlstein z. Th.; Omphacit, Schillerspath z. Th., Rhodonit.

fig. 222. — 225.

(a:b:∞ c) 87° 6'; (a ∞ b:∞ c); (∞ a:b:∞ c); (a:½ b:c) 120° 39'; (⅓ a:¼ b:c); (a:¼ b:c); (a:∞ b:c); (a:∞ b:½ c); (⅓ a:b:∞ c); (a:½ b:c); (a:2 b:∞ c); (⅓ a:½ b:c); (⅓ a:¼ b:c); (⅓ a:⅓ b:c); (⅓ a:⅓ b:c); (a:⅓ b:c); (½ a:b:c); Zwillinge haben (a:∞ b:∞ c) gemein; auch derb, breitstrahlig, körnig; weiss, grau, grün, braun, schwarz; durchsichtig bis undurchsichtig; Glasglanz, bisweilen metallischer Perlmutterglanz; H. 4—6; G. 3,2—3,4; schmelzbar. Man unterscheidet: 1) Diopsid, (Alalit, Mussit, Baikalit): ($\text{Ca}^3 \text{Mg}^3$) $\ddot{\text{Si}}^2$; farblos, grünlichweiss oder grasgrün; durchsichtig bis durchscheinend; Mussaalpe, Schwarzenstein. 2) Malakolith, (Salit, Pyrgom, Fassait): ($\text{Ca}^3 \text{Mg}^3 \text{Fe}^3$) $\ddot{\text{Si}}^2$; auch stängelig, körnig (Kokkolith); graulich-, grünlichweiss, gras-, lauch-, oliven-, schwärzlichgrün; durchscheinend bis kantendurchscheinend; Kupferberg, Schwarzenberg, Mussaalpe, Arendal, Sahla. 3) Gemeiner Augit, (Hedenbergit, Jeffersonit, Lherzonit): ($\text{Ca}^3 \text{Mg}^3 \text{Fe}^3$) ($\ddot{\text{Si}}^2 \ddot{\text{Al}}^2$); schwärzlichgrün, raben-, pechschwarz; undurchsichtig; im plutonischen Gestein: Mittelgebirge, Rhön, Auvergne, Rom, Vesuv, Fassathal. Vom Hedenbergit nicht verschieden ist wohl der schwarze, bräunlich schillernde Hudsonit von Cornwall in New-York. 4) Dial-

lag, (Lotalalith): ($\text{Ca}^3 \text{Mg}^3 \text{Fe}^3$) Si^2 ; meist derb, oft mit Hornblende verwachsen; grünlichbraun, olivengrün, grünlichgrau; auf den Spaltungsflächen metallartiger Perlmutterglanz; sonst schimmernd; im Gabbro: Zobten, Frankenstein, Radauthal, Salzburg.

5) Bronzit, (blättriger Anthophyllit, Phästin): ($\text{Mg}^3 \text{Fe}^3$) Si^2 ; bisweilen vanadinhaltig, (Genua); derb, körnig; haarbraun, durchscheinend; auf der Spaltungsfläche $\#$ ($a:\infty b:\infty c$); Perlmutter- bis Seidenglanz; im Serpentin des Fichtelgebirges und Steyermarks. 6) Hypersthen, (Paulit, Gedrit): ($\text{Fe}^3 \text{Mn}^3$) Si^2 ; derb, pechschwarz, undurchsichtig; auf der Spaltungsfläche mit kupferfarbigem metallischem Perlmutterglanz; in Geschieben auf Labrador. 7) Kieselmannan, (Manganspath, Bustamit, Rhodonit, Heteroklin): gewöhnlich derb, stark verwachsen; hoch- und dunkelrosenroth, durchscheinend und kantendurchscheinend; Katharinenburg, Langbanshyttan, Elbingerode.

Das Prisma ist parallel der langen Diagonale 388

388. Säule von $123^\circ 30'$; mit zwei deutlichen Blätterdurchgängen, parallel der Säule:

Arfvedsonit 381

Säule von $140^\circ 48'$; kein Blätterdurchgang:

Bucklandit.

Skotin.

($a:b:\infty c$); ($a:\infty b:\infty c$); ($a:\infty b:c$) $114^\circ 55'$; ($a:\infty b:c$); fast schwärzlichbraun, undurchsichtig; sehr kleine Krystalle.

Auf der Neskielgrube bei Arendal.

Säule von $112^\circ 30'$; mit zwei deutlichen Blätterdurchgängen $\#$ ($\infty a:\infty b:c$) und ($\infty a:$

$b:\infty c$) **Babingtonit 400**

Mineralien des ein- und eingliedrigen Systems.

392. In Wasser löslich, sehr adstringirender Geschmack:


Kupfervitriol.**Blauer Vitriol.**

fig. 226.

(a:b:c); (a:b':c); (b:a:c); (a:b':c); (b:∞ a:∞ c); (a:∞ b:∞ c); (a:b':∞ c); (b': $\frac{1}{3}$ a:c); (a: $\frac{1}{3}$ b':c); (a:c:∞ b); (b':c:∞ a); (b':3a:c); (a:b': $\frac{1}{2}$ c); auch tropfsteinartig, nierenförmig, derb; Bruch muschelrig; himmelblau; St. weiss; halbdurchsichtig bis durchscheinend; Glasglanz; H. 2, 5; G. 2, 2.

Bildet sich in Gruben: Neusohl, Salzburg, Goslar, Fahlun.

- In Wasser unlöslich 393
 393. Wasserhell, ungefärbt, milchweis, bisweilen
 etwas graulich oder gelblich 394
 Stark gefärbt 397
 394. Ritzt Glas 395
 Ritzt Glas nicht; wird in der Flamme
 schwärzlich:


Pyralolith.

fig. 236.

(a:b:∞ c); (a:b':∞ c) 94° 36'; (a:∞ b:∞ c); (∞ a:∞ b:c) 130° 33'; 144° 3' auch derb; nach drei Richtungen spaltbar; weiss, hellgrün, gelblichgrau; Fettglanz; kantendurchscheinend; H. 3, 5—4; G. 2, 55.

Auf einem Lager im körnigen Kalkstein bei Pargas.

395. Lange, zusammengedrückte, blaue oder wasserhelle, nach der breiten Seitenfläche leicht spaltbare Krystalle; unschmelzbar:

Cyanit.

Rhätizit, Disthen, Fibrolith, Faserkiesel, Bucholzit




fig. 237.

(a:b:∞ c); (a:b':∞ c) 106° 15'; (a:∞ b:∞ c); (∞ a:b:∞ c); (∞ a:∞ b:c); Zwillinge haben (a:b:∞ c) gemein; auch derb; auch

gelblich, röthlich, grauschwarz; durchscheinend bis durchsichtig; Glasglanz; auf $(a:b:\infty c)$ Perlmutterglanz; H. 5—7; auf $(a:b:\infty c)$ am weichsten; G. 3, 6.

Im Glimmer-Talk- und Thonschiefer in den Alpen, Sachsen, Böhmen.

Zu einem weissen Email schmelzbar; wenigstens an den Kanten 396

396. In Säure unlöslich 396_a

In Säure löslich 396_b

396_a. Die Basis gegen die erste Säule unter $86^{\circ} 15'$ und $115^{\circ} 30'$ geneigt:

Oligoklas.

Natronspodumen.




fig. 235.

$(a:b:\infty c)$; $(a:b':\infty c)$; $(\infty a:b:\infty c)$; $(xa:b':\infty c)$; $(xa:b:\infty c)$; $(a:\infty b:c)$; $(a:\frac{1}{4}b:c)$; $(a:\infty b:c)$; $(a:\infty b:xc)$; $(a:b:c)$; $(a:b:xc)$; Zwillinge haben $(\infty a:b:\infty c)$ oder $(a:\infty b:c)$ gemein; nach der Basis sehr leicht spaltbar; Glasglanz bis Fettglanz; auf dem ersten Blätterdurchgang Perlmutterglanz; H. 6; G. 2, 6; schmilzt leichter als Feldspath zu einem farblosen Glase.

In Krystallen oder derb; im Granit bei Stockholm und in Frankreich.

Der Havnefjordit von Island ist ein Kalkoligoklas mit 8,82 p. C. Kalkerde und nur 2,56 p. C. Natron.

Die Basis zur ersten Säule unter $93^{\circ} 36'$ und $86^{\circ} 23'$ geneigt:

Albit.

Tetartin und Periklin, Kieselspath, Cleavelandit.




fig. 227 — 231. 171.


$(a:b:\infty c)$; $(a:b':\infty c)$ $122^{\circ} 15'$; $(3a:b:\infty c)$ $(\infty a:b:\infty c)$; $(a:\infty b:c)$; $(a:\infty b:c)$; $(\frac{1}{3}a:\infty b:c)$; $(3a:\infty b:5c)$; $(a:\frac{1}{4}b':c)$; $(a:\frac{1}{2}b':c)$; $(a:b':c)$; Zwillinge haben die Längsfläche oder die schiefe Endfläche gemein; nach beiden Flächen sehr deutlich spalt-

bar; auch derb; farblos, weiss, fleischroth; Glasglanz; auf der Basis Perlmutterglanz; durchsichtig bis kantendurchscheinend; H. 6; G. 2, 6.

Auf Gängen und Drusen, und als Gemengtheil im älteren Gebirge: Hirschberg, Penig, Zillerthal, Gastein. St. Gotthard, Sibirien, Fahlun. Der Andesin aus Südamerika unterscheidet sich durch geringere Theilbarkeit; G. 3, 73.

396_b. Nach zwei Richtungen ungleich spaltbar unter 94° ; auf der ersten Spaltfläche zart gestreift; auf der andern irisirend, durchscheinend:

Labrador.



($a:b:\infty c$); ($a:b':\infty c$); stumpfer als 120° ; ($\infty a:b:\infty c$); ($a:\infty b:c$) $94^\circ 30'$; $85^\circ 30'$; nach der Endfläche und nach der Längsfläche deutlich spaltbar; meist derb; asch-, rauch- gelblich-, röthlichgrau, schmutzigweiss; Fettglanz, auf der Endfläche Glasglanz; H. 6; G. 2, 7.

Auf Labrador, in Finnland und Norwegen. Hierher wird auch der alkalifreie Mornit aus Irland gehören; der Silicit aus Antrim in Irland, der wasserfreie Skolezit aus Finnland.

Vollkommen unter $94^\circ 12'$ spaltbar; wasserhell, weiss:

Anorthit.

Christianit, Biotin.




fig. 232 — 234.

($a:b:\infty c$); ($a:b':\infty c$) $120^\circ 30'$; ($\infty a:b:\infty c$); ($a:\infty b:c$); zu ($a:b:\infty c$) unter $110^\circ 57'$ geneigt; Zwillinge wie bei Albit; Bruch deutlich muschelrig; H. 6, G. 2, 7.

In Dolomitblöcken am Vesuv und auf Java.

397. Krystalle schön blau, sehr langgezogen und zusammengedrückt

Cyanit 395

Roth, violett oder schwarz

398

Gelblichbraun, unschmelzbar:

Diaspor.

Äl H.

(a:b:∞ c); (a:b':∞ c) 82°; (∞ a:b:∞ c); (∞ a:b:c) tafelartig, auch derb, schaalig, stängelig; leicht spaltbar $\#$ (∞ a:b:∞ c); Glasglanz; im Bruch Fettglanz; auf den Spaltungsflächen Perlmutterglanz; St. weiss, durchsichtig bis durchscheinend.

Auf Gängen im Chloritschiefer am Ural.

398. Beilförmig, schön violett, mit sehr glänzenden Flächen:

Axinit.

Beilstein, Thumerstein.




fig. 238 239.

(a:b:∞ c); (a:b':∞ c); (a:∞ b:∞ c); (b':c:∞ a); (a:c:∞ b); (a:c:∞ b); (c:∞ b:∞ a); (a:b:c); ($\frac{1}{2}$ a:c:∞ b); ($\frac{1}{2}$ a:b:c); ($\frac{1}{3}$ a:c:∞ b); ($\frac{2}{3}$ a:2b:c); ($\frac{2}{3}$ a:2b:c); ($\frac{1}{4}$ a:3b:c); undeutlich spaltbar; auch derb, schaalig; nelkenbraun, bis pflaumenblau, St. weiss; durchsichtig bis kantendurchscheinend; Glasglanz; H. 6—7; G. 3,2; leicht schmelzbar.

Auf Gängen: Treseburg, Thum (Sachsen), Bourg d'Oisans, Cornwall.

Krystalle roth oder röthlich 399

Krystalle schwarz 400

399. Krystalle rosenroth, mit schwach gewölbten Flächen und drei deutlichen Blätterdurchgängen; unschmelzbar; findet sich mit kohlensaurem Kalk zusammen:

Greenovit.


Zwei Spaltungsrichtungen schneiden sich unter 126° 56'; auch derb; rosenroth bis fleischroth; St. röthlichweiss; Glasglanz; H. 5—6; G. 3,5; enthält Titansäure, Mangan und Kieselerde, und wird wohl ein Mangantitanit sein.

Findet sich zu St. Marcel in Piemont.

Röthlich, mit dreifachem Blätterdurchgang;
ritzt Glas; schmilzt zu weissem Email;
kommt mit Glimmer vor:

Latrobit.

D i p l o i t.



Die Blätterdurchgänge bilden Winkel von $98^\circ 30'$; 91 ; $93^\circ 30'$;
Krystalle undeutlich; auch derb und eingesprengt; rosenroth, pfirsich-
blüthroth, röthlichweiss; durchscheinend; Glasglanz; H. 5—6; G. 2, 8.

Mit Feldspath, Glimmer und Kalkspath auf der Insel Amitok an
der Küste von Labrador.

400. Kleine langgezogene, glänzende Krystalle, mit
zwei Blätterdurchgängen, leicht zu (schwar-
zem Email schmelzbar:

Babingtonit.

K o r a c i t.

fig. 240.

(a:b:∞ c); (a:b':∞ c); (a:∞ b:c); (a:∞ b:c); (a:∞ b:∞ c); (∞ a:b:∞ c); schwarz, bisweilen etwas grünlich; Glas-
glanz; H. 5, 5—6; G. 3, 4.

Findet sich auf Albit bei Arendal.

Halbmetallischer Glanz; matt; Bruch uneben; kaum
etwas schmelzbar:

Mengit.

I l m e n i t.


(a:b:∞ c); (a:b':∞ c) $136^\circ 20'$; (∞ a:b:c); (a:b:c); (a:b':c); eisenschwarz; St. kastanienbraun; undurchsichtig; H. 5, 5—6;
G. 5, 48; enthält Titansäure, Eisenoxyd und Zirkonerde.

Auf Granitgängen bei Miask.

Halbmetallischer Glanz, bis in Glasglanz;
schwarz ins Braune und Grüne geneigt;
schmelzbar unter Aufblähen:

Allanit.

C e r i n.




(a:b:∞ c); (a:b':∞ c) 115°; (a∞:b:∞ c); (a:∞ b:c); (a:xb:c); (a:yb:c); (a:xb':c); (∞ a:b:c); meist derb; körnig; Bruch unvollkommen muschelrig; St. grünlich bis bräunlichgrau; kaum kantendurchscheinend; H. 6; G. 3,48—3,66.

Eingewachsen in Granit, Gneus und Syenit zu Iglorsoit auf Grönland und bei Riddarhyttan. Der Cerit von Riddarhyttan, dessen Gewicht 4,1 beträgt, ist auch als Schwarzcerinerz beschrieben.

Die Mineralien sind krystallinische, blättrige Massen.

- | | |
|---|------------------|
| 403. Deutlich blättrig, mit erkennbaren Blätterdurchgängen | 405 |
| Schuppig, krystallinisch körnig oder körnig | 404 |
| 404. Schuppig; die Blättchen sind klein und lassen keine Blätterdurchgänge mehr deutlich erkennen | 558 |
| Krystallinisch körnig oder körnig | 591 |
| 405. Vollkommener oder unvollkommener Metallglanz | 406 |
| Steiniges Ansehen | 446 |
| 406. Deutlicher Metallglanz | 407 |
| Unvollkommener Metallglanz | 436 |
| 407. Zinn-, blei- oder eisengrau, oder silberweiss | 408 |
| Broncefarbig bis weisslich speisgelb | 407 ^a |
| 407 ^a . Broncegelb magnetisch, nach einer Richtung theilbar | Magnetkies 188 |
| Weisslichspeisgelb bis messinggelb; spaltbar nach einem Würfel: | |

Cuban.



Derbe Massen mit gross- bis grobkörniger Zusammensetzung; Bruch flachmuschelrig bis uneben; läuft leicht messinggelb an; leicht schmelzbar.

Findet sich mit Kupfer und Schwefelkies zusammen im südlichen Theile von Cuba.

408. Stark blättrig, wenigstens in einer Richtung, so dass man einzelne Blätter oder Platten trennen kann 409
 Undeutlich blättrig 429
409. Milde, färbt an den Fingern ab, oder giebt doch einen gefärbten Strich auf Papier . . 410
 Lässt keine Spur, wenn man lose damit über Papier streicht 412
410. Der Strich auf Papier ist schwarz oder eisen-
 grau; Gewicht gering; unschmelzbar; ent-
 zündet sich in starkem Feuer . . **Graphit** 191
 Der Strich auf Papier ist bläulich; bedeuten-
 des Gewicht 411
411. Am gewöhnlichen Kerzenlicht schmelzbar
Grauantimonerz 239
 Unschmelzbar **Wasserblei** 191
412. Blei-, oder zinngrau, oder silberweiss . . . 413
 Eisengrau, oder dunkel stahlgrau 421
413. Sehr hellgrau, fast silberfarbig 414
 Blaugrau, bleifarbig 415
414. Silberweis, dehnbar; auf Kohle ein Silber-
 korn gebend **Gediegenes Silber** 14
 Zinnweiss, mit mehreren Blätterdurchgängen
Gediegenes Antimon 154
415. Mehrere deutliche Blätterdurchgänge . . . 416
 Ein einziger deutlicher Blätterdurchgang . . 419
416. drei, auf einen Würfel führende Blätterdurch-
 gänge **Bleiglanz** 21
 Mehr als drei Blätterdurchgänge; leicht
 schmelzbar und Antimondämpfe gebend
Gediegenes Antimon 154
417. Schmilzt auf Kohle, entwickelt schweflige
 Säure und reducirt sich leicht . **Bleiglanz** 21
 Entwickelt beim Schmelzen Selengeruch . . 418

418. Giebt in der Röhre Selen . . . **Selenblei** 34
 Giebt in der Röhre Selen und Quecksilber:

Selenquecksilberblei.

(Pb Hg) Se.

Körnig, Bruch uneben bis eben; bleigrau, ins Eisengraue und Eisenschwarze; St. schwarz, wenig glänzend; weich; G. 7, 3.
 Lerbach bei Clausthal, Tilkerode, Zorge, Mexico.

419. Sehr langgezogene, blättrige Massen, platten-
 artig verwachsen; Gewicht etwa 4, 6
Grauantimonerz 239
 Kurzblättrig, fast schuppig; Gewicht 7—10 . 420
420. Am gewöhnlichen Kerzenlichte schmelzbar,
 ohne Geruch . . . **Gediegenes Wismuth** 12
 Schmilzt unter Tellurgeruch und Bildung von
 Bleioxyd . . . **Weisstellur** 235
421. Ein oder mehrere sehr deutliche Spaltungs-
 richtungen . . . 422
 Spaltungsrichtungen undeutlich und nur durch
 die Richtung des Bruches angedeutet . . . 429
422. Mehrere deutliche Blätterdurchgänge . . . 423
 Ein einziger deutlicher Blätterdurchgang . . . 426
423. Mit rothem oder röthlichem Widerschein . . . 424
 Dunkelgrau ohne Widerschein . . . 425
424. Sehr deutlich rother Widerschein; milde; co-
 chenilleroth Strich . . . **Rothkupfererz** 15
 Widerschein schwach röthlich; hart, spröde
Glanzkobalt 25
425. Leicht schmelzbar und sich fast ganz verflüch-
 tigend, dabei nach Rettich riechend
Gediegen Tellur 192
 Schmilzt leicht; entwickelt dabei Geruch der
 schwefeligen Säure und giebt auf Kohle ein
 Silberkorn . . . **Schilfglaserz** 245
426. Dunkeleisengrau, fast schwarz; leicht und
 deutlich spaltbar . . . 426^a

Hellstahlgrau	427
426 ^a . Fest, schwer	Wolfram 323
Leicht, elastisch wie Schlaggold:	

Tenorit.


Dünne, sechs- oder dreiseitige, oft gefranzte oder gezahnte Blättchen sind zusammengehäuft; an den Kanten oft bräunlich durchscheinend; stahlgrau ins Schwarze; schmilzt zu einem rothen Korn und scheint Kupferoxyd zu sein.

Auf schlackiger Lava am Vesuv.

427. Schmelzbar mit Tellurgeruch	428
Schmilzt mit Schwefelgeruch und Antimon- rauch zu einer metallischen, magnetischen Schlacke:	

Eisenantimonerz.

Haidingerit, Berthierit, Kiesglanz.




Derb; auch stängelig; bis eisenschwarz und dunkelstahlgrau, dem Anlaufen unterworfen; in Säure leicht löslich; H. 2—3; G. 4—4, 3.

Auf Gängen bei Bräunsdorf und in Frankreich.

428. Giebt auf Kohle ein gelbes, goldreiches Korn	
	Schrifterz 239
Sehr leicht schmelzbar und sich fast ganz verflüchtigend	Tellurwismuth 191
Leicht schmelzbar; aus der Auflösung in Sal- petersäure fällt Salzsäure Chlorsilber:	

Tellurwismuthsilber.



Anscheinend hemiëdrisch drei- und einaxig; nach der geraden Endfläche vollkommen spaltbar; derbe schaalige oder körnige Massen; lichte stahlgrau ins Röthliche geneigt; in dünnen Blättchen elastisch biegsam; H. 2,5; G. 8,4; wird in offener Röhre braun vor dem Schmelzen.

Bei Börzöbei Gran in Ungarn.

429. Gewicht bedeutend, wenigstens 6 432
 Gewicht 3,6—4 430
430. Milde, zwischen den Fingern zerreiblich; Strich
 schwarz oder dunkelgrau . . . **Pyrolusit** 246
 Zwischen den Fingern nicht zerreiblich . . . 431
431. Hart, wird schwer vom Stahl geritzt; braun-
 rother Strich **Eisenglanz** 154
 Strich schwarz **Crichtonit** 154
432. Giebt auf Kohle Rettiggeruch und einen gelb-
 lichen Regulus **Weisstellur** 235
 Giebt auf Kohle Knoblauchgeruch und ein
 Silberkorn **Mildglanzerz** 195
 Giebt Geruch nach schwefliger Säure und mit
 Borax ein blaues Email . . . **Kobaltkies** 29
433. In Wasser löslich oder doch sich darin ver-
 ändernd 434
 Unlöslich und unveränderlich im Wasser . . 464
434. Kleine perlmutterglänzende, zerreibliche
 Schuppen:

Borsäure.

Sassolin, Boraxsäure.

$\text{B} + 3 \text{H}$.

Blättchen; tropfsteinartig; als Ueberzug; schuppig; farblos oder
 schmutzig weiss; durchsichtig bis durchscheinend; schwach säuer-
 lichbitter schmeckend; schmelzbar; H. 1; G. 1,5.

Am Rande von Boraxseen und Boraxquellen: Sasso bei Siena,
 Vulkano, Toskana.

- In bedeutenderen klein- oder grossblättrigen
 Massen 435
435. Drei leichte, rechtwinklige Blätterdurchgänge
 **Steinsalz** 69
 Die schwierige Spaltung führt auf ein schiefes
 rhomboëdrisches Prisma . . . **Glauberit** 317
436. Gewicht bedeutend 437
 Gewicht unter 3 441

437. Sehr blättriger Bruch in mehreren Richtungen; Spaltungsfläche stark schillernd . . . 438
 Blättriger Bruch deutlich, aber weniger glänzend 440
438. Strich grau; unschmelzbar **Blende** 13
 Strich schön roth 439
439. Gewicht etwa 8; auf Kohle zu verflüchtigen
Zinnober 153^a
 Gewicht etwa 5,6; schmilzt zu einer schwarzen Masse, und giebt in der Reductionsflamme ein Kupferkorn . . . **Rothkupfererz** 13
440. Zwei rechtwinklige Blätterdurchgänge; Strich roth; unschmelzbar und in Säuren unlöslich
Rutil 142
 Spaltungsfläche gebogen, undeutlich; Strich orangegelb; schmelzbar und in Säuren löslich:

Rothzinkerz.

Z i n k o x y d.


Zn.

Nach einem rhombischen Prisma von etwa 120° theilbar; auch in derben Massen mit fest verwachsenem, körnigen Gefüge; eingesprengt; als Ueberzug; Bruch muschelartig; morgenroth, ins Hyacinth- und Blutrothe, kantendurchscheinend; H. 4—4,5; G. 5, 4.
 Auf Lagern in New-Jersey und Sussex in Nordamerika.

441. Starker, bronceartiger Wiederschein 442
 Ohne Wiederschein 443
442. Dunkelgrün; leicht spaltbar; meist in Serpentin **Diallag, Bronzit** 387
 Schwarz oder Braunschwarz, zwei deutliche Blätterdurchgänge, mit Albit zusammen
Hypersthen 387
 Oliven- und schwärzlichgrün; auf der vollkommenen Theilungsfläche ins Tombackbraune geneigt; Strich graulich weiss;

Schillerspath.

Schillerstein.




Derb, krystallinisch theilbar und körnig; oft mit Serpentin verwachsen; zwei ungleiche Spaltungsebenen von 135° — 140° ; Bruch uneben, splitterig; metallähnlicher Perlmutterglanz; kantendurchscheinend; H. 3, 5—4; G. 2, 7.

An der Baste am Harze.

443. Ausgezeichnet blättrig, auf den stark schillern-
den und elastischen Blättchen lebhafter
Glanz 444
Leicht blättrig; Fettglanz; auf der Bruchfläche,
die wenig oder gar nicht schillert, wenig
lebhaft; weich anzufühlen 445
444. Wasserfrei **Glimmer** 186
Mit wenigstens 12 p. C. Wasser . . . **Pennin** 153^b
445. Bruch eben und glänzend; in der Flamme
unveränderlich **Talk** 186
Bruchfläche gestreift, fast faserig; in der
Flamme unschmelzbar, aber fast zum 20
fachen Umfang anschwellend:

Pyrophyllit.




Stängelig blättrig; excentrisch strahlig, zu Kugeln vereinigt; Spaltbar sehr deutlich $\ddagger$ der breiten Seitenfläche der undeutlichen Krystalle; hellspangrün bis grünlich weiss; Perlmutterglanz; durchscheinend; H. 1; G. 2, 78.

Beresowsk am Ural und bei Spaa auf Gängen.

446. Stark blättrig, wenigstens in einer Richtung,
in der man einzelne Blätter leicht ablösen
kann 447
Undeutlich blättrig; Bruch blättrig und mu-
schelig 537

447. Wasserhell, weiss, milchweiss, graulich-,
gelblich - oder grünlichweiss 448
Lebhaft gefärbt 490
448. Deutlicher Perlmutterglanz 433
Glanz weniger lebhaft, Steinglanz 449
449. Ritzt leicht Glas 450
Wird von einer Stahlspitze geritzt 464
450. Mehrere Blätterdurchgänge 451
Ein einziger Blätterdurchgang 460
451. Vier Blätterdurchgänge 452
Zwei oder drei Blätterdurchgänge 453
452. Vier gleiche Durchgänge auf ein Octaëder
führend; Demantglanz, Härte 10 **Diamant** 60
Vier senkrechte Blätterdurchgänge; zwei da-
von rechtwinklig **Diopsid** 387
453. Drei gleiche Durchgänge, auf ein Rhomboëder
leitend **Korund** 160
Drei ungleiche oder nur zwei Durchgänge 454
454. Zwei Spaltungsebenen 455
Drei Spaltungsebenen 456
455. Zwei rechtwinklige oder fast rechtwinklige;
schmilzt zu graugrünem Email . **Diopsid** 387
Zwei Blätterdurchgänge unter 86° 455^a
455^a. Unschmelzbar **Davidsonit** 205
Unter Schäumen zu weissem Email schmelzbar:


Stroganowit.



Lichtgrüne, blättrige Massen mit zwei fast rechtwinkligen Blät-
terrichtungen; Glas - bis Fettglanz; im Bruch uneben und schim-
mernd; stark durchscheinend bis halbdurchsichtig; H. 5; G. 2, 79.
In Blöcken und Geschieben in der Stüdenka in Davurien.

Zu schwarzer Schlacke schmelzbar:

Tephroit.



Bruch uneben, ins Muschelige; aschgrau, leberbraun und
schwarz anlaufend; St. hell aschgrau; H. 5, 5; G. 4.

Findet sich mit Franklinit bei Sparta in Nordamerika.

456. Zwei deutliche rechtwinklige Durchgänge; der
 dritte undeutlich 457
 Kein Durchgang rechtwinklig 459
 457. Leicht zu graugrünem Email schmelzbar **Diopsid** 387
 Schwer zu weissem Email schmelzbar . . . 458
 Unschmelzbar, in Säure unlöslich:

Nekronit.


Zwei rechtwinklige und ein schiefwinkliger Blätterdurchgang;
 weiss, bläulichweiss; schwacher Perlmutterglanz; kantendurch-
 scheinend; unangenehm riechend; H. 6.

Ein Feldspathartiges Gestein von Baltimore.

458. Sehr blättriger Bruch; auf den Spaltungsflä-
 chen sehr lebhafter, auf dem Bruche etwas
 fettiger Glanz; oft milchweiss, selten (Adu-
 lar) wasserhell **Feldspath** 330
 Blättriger Bruch; Glasglanz; Oberfläche ris-
 sig; selten milchweiss, meist wasserhell
 **Ryakolith** 342
 Bruch blättrig; goldgelber Wiederschein
 **Murchisonit** 330
 459. In Säuren löslich; im vulkanischen- oder Hy-
 persthen-Gestein vorkommend . . . **Labrador** 396
 In Säuren unlöslich; in amphibolischen oder
 granitischen Gesteinen **Albit** 396
 460. Spaltung deutlich aber schwierig; wasserhell;
 sehr hart, ritzt Quarz und Feldspath; nur
 an den Kanten schmelzbar 463
 Spaltung leicht, die Blättchen mit einem Mes-
 ser wegzunehmen; selten wasserhell; wird
 vom Quarz geritzt, unschmelzbar und dabei
 bisweilen decrepitirend 461
 461. Blätter etwas gebogen; Perlmutterglanz . . . 462
 Blätter eben, sehr glänzend, wasserhell, bis-
 weilen bläulich **Cyanit** 395

462. Leicht decrepitirend; etwas wasserhaltig:

Wörthit.



Derb, körnig und verworren, kurzstängelig, stark verwachsen; schwach durchscheinend; weiss.

In Geschieben bei Petersburg.

- Heftig decrepitirend in kleinen, weissen, perlmutterglänzenden, sassalinartigen Bruchstücken **Diaspor** 398
463. Gewicht 3, 4—3, 5 **Topas** 254
- Gewicht 2, 7 **Smaragd** 205
464. Wasserhell, durchsichtig, weiss, milchweiss
oder doch hell gefärbt 465
- Deutlicher Perlmutterglanz 479
465. Gewicht über 3, 5 466
- Gewicht 2, 5—2, 8 470
466. Gewicht 7; etwas diamantartiger Perlmutterglanz:

Chlorblei.

Mendipit, Chlorspath, Berzelit.



Derb, spaltbar $\ddagger$ (a:b:∞ c) 102° 27'; dünnstängelig, auseinanderlaufend; gelblichweiss, strohgelb, blassroth; durchscheinend. H. 2, 5—3.

An den Mendiphügeln in Sommersetshire.

- Gewicht 3, 5—4, 5; blättrig 467
467. Drei deutliche Spaltungsrichtungen 468
- Zwei schwer zu erhaltende Spaltungen; in
Säure mit Aufbrausen löslich **Barytocalcit** 346
468. Drei gleiche und gegen einander gleich geneigte
Spaltungsrichtungen; in Säuren löslich,
schmutzig gelb bis bräunlich **Spatheisenstein** 174
- Drei deutliche Spaltungen, die eine rechtwink-
lig gegen die andere 469

469. Spaltbar $\#$ ($a:b:\infty c$) $101^{\circ} 42'$; Gewicht 4,4;
die Flamme orangegelb färbend **Schwerspath** 267
Spaltbar $\#$ ($a:b:\infty c$) 104° . Gewicht 3,9;
die Flamme purpurroth färbend . **Cölestin** 267
470. Eine einzige deutliche Spaltungsrichtung . . . 471
Mehrere deutliche Spaltungsrichtungen . . . 474
471. Ausgezeichnet blättrig; mit dem Messer kann
man grosse Platten ablösen, welche zwei
undeutliche, gegen die Platte rechtwinklige
Spaltungsrichtungen besitzen; weich, vom
Fingernagel geritzt **Gyps** 332
Nicht in grosse Platten spaltbar 472
472. Vom Fingernagel geritzt; unregelmässig über
einander liegende Platten; in Säure unlöslich:

Gilbertit.

Gelblich weiss, durchscheinend; Perlmutterglanz; H. 2, 5—3;
G, 2, 65. Enthält hauptsächlich Kieselsäure und Thonerde; Gehört
zum Chlorit.


Auf der Zinngrube von Stonagwyn in Cornwall.

- Härte des Kalkspaths; deutlich blättrig; ebene
und spiegelnde Spaltungsflächen 473
473. Wasserhell, milchweiss, oft sehr dünnblättrig,
in Säure zu einer Gallerte löslich; un-
schmelzbar; wasserhaltig . . . **Kieselzink** 272
Blättrige Masse, nicht in dünne Blättchen spalt-
bar; weiss oder gelblich weiss, selten grau-
lich; in Säure unlöslich; schwer zu weisser
Perle schmelzbar; wasserfrei . **Tafelspath** 340.
474. Vier gleiche, deutliche Spaltungsrichtungen,
auf ein Octaëder führend; zu einer undurch-
sichtigen Perle schmelzbar; reagirt auf Fluss-
säure **Flussspath** 65
Drei gleiche, deutliche Spaltungsrichtungen 475
475. Alle drei Richtungen rechtwinklich 476
Zu einem Rhomboëder spaltend 477

476. Bläulich oder schwach violett; Spaltungsflächen stark schillernd, meist wasserhell; schwer schmelzbar **Anhydrit 274**

Milchweiss, etwas perlmutterglänzend, durchscheinend, sehr leicht schmelzbar; reagirt auf Flusssäure:

Arnoloth.



Derb, gross- und eckigkörnig; Glasglanz; weiss, bisweilen ins Gelblichbraune und Rothe; halbdurchsichtig bis durchscheinend H. 2,5—3; G. 2,96; in Schwefelsäure fast ganz auflöslich.

Zu Ivikaet in Westgrönland auf Lagern.

477. In Salpetersäure in der Kälte nur langsam und mit schwachem Aufbrausen löslich . . . **478**

Mit starkem Aufbrausen löslich . . . **Kalkspath 163**

478. Spaltet zu Rhomboëder von $106^{\circ} 15'$; die Auflösung enthält Kalk **Dolomit 164**

Spaltet zu Rhomboëder von $107^{\circ} 5'$; die Lösung enthält keinen Kalk . . . **Talkspath 164**

479. Milde, zerreiblich zwischen den Fingern; oder doch durch den Nagel geritzt **480**

Härter **482**

480. Gewicht etwa 5,5; leicht schmelzbar und Antimonrauch gebend: . . . **Weissantimonerz 261**

Gewicht höchstens 2,5; unschmelzbar, wasserhaltig **481**

481. Besteht aus grossen, etwas gebogenen Blättern, feinschuppig, zerreiblich; weiss, bläulich-, gelblichweiss:

Pholerit.


T u e s i t.

Ist talkartig, enthält 39,9 p. C. Kieselsäure; 44,5 p. C. Thonerde und 15,6 p. C. Wasser; findet sich im Steinkohlengebirge bei Fins und Mons.

Kleine, glänzende Blättchen; wird von Säure angegriffen; die Lösung enthält Bittererde

- Talkhydrat** 212
482. Gewicht etwa 7 **Chlorblei** 466
Gewicht 2,5—3,5 483
483. Spaltungsfläche gebogen; hart, ritzt Glas **Diaspor** 397
Wird von einer Stahlspitze geritzt 484
484. Eine einzige deutliche Spaltungsrichtung 485
Mehrere leichte Spaltungen 489
485. Die Blättchen lassen sich mit einer Messerspitze trennen; in Säuren löslich 486
Blätterdurchgänge sehr deutlich, aber mit einem Messer nicht leicht zu erhalten; in Säuren unlöslich **Tafelspath** 480^a
486. Spaltet sehr leicht in grosse, glänzende, ganz ebene Blätter 487
Spaltet leicht in schmale, fast gestreifte, etwas faserige Blättchen 488
487. Auf Kohle in der Hitze sich aufblättern und dann ein weisses Email gebend **Apophyllit** 123
Blättert sich nicht auf und giebt ein basisches Email **Heulandit** 132
488. Vor dem Löthrohre schmelzbar **Stilbit** 272
Unschmelzbar 488^a
- 488^a. Härte des Apatits **Kieselzinkerz** 272
Härte des Steinsalzes:

Hydrotalkit.



Derb, in blättrigen Massen, die verschieden gewunden und gebogen sind; spaltbar nach einer Richtung; biegsam, weiss oder gelblich weiss; durchscheinend bis durchsichtig; Perlmutterglanz; fettig anzufühlen; H 2. Wird beim Glühen röthlich gelb und löst sich in Säuren mit schwachem Brausen auf.

Ueberzieht Serpentin bei Snarum.


489. Drei deutliche Blätterdurchgänge, unter etwa

- 93° gegen einander geneigt, in Salpetersäure unlöslich **Dreelit** 162
- Drei gleiche, aber gebogene Spaltungsflächen unter 105°—106°, unter Aufbrausen in Salpetersäure löslich **Perlgrauer Kalkspath** 163
490. Gelbgefärbt 491
- Dunkelgrau, blau, grün, schwarz 497
- Roth, rosenroth, violett, braun, rostbraun 524
491. Gewicht über 6 **Gelbbleierz** 116
- Gewicht 2, 5—3 492
492. Sehr milde, leicht vom Nagel geritzt; oft zerreiblich 493
- Wird vom Nagel nicht geritzt 494
493. Grosse, etwas faserige, biegsame, weiche Blätter; verflüchtigt sich auf Kohle mit Arsengeruch **Rauschgelb** 300
- Kleine Blättchen; zwischen den Fingern zerreiblich; zu einer schwarzen Kugel schmelzbar **Uranit** 139
494. Sechs deutliche Spaltungsrichtungen mit stark, halb metallisch glänzenden Flächen **Blende** 13
- Zwei, drei oder vier Spaltungsflächen 495
- Eine einzige Theilungsrichtung; wachsgelb:

Xanthophyllit.

Undeutliche sechsseitige Tafeln zu einer kugeligen Masse verwachsen; durchsichtig; Perlmutterglanz; unschmelzbar. Ist ein Kalk-, Talk- und Thonerdesilikat und bei Slatoust im Ural im Talkschiefer gefunden.

495. Zwei Spaltungsrichtungen; braust mit Säure **Junkerit** 174
- Vier Spaltungsrichtungen, welche auf ein Octaëder führen; in Salpetersäure unlöslich **Flussspath** 65
- Drei Spaltungsebenen; eine sehr deutlich, zwei andre schiefwinklich dagegen:

Boltonit.

Grobkörnige Massen; gelblichgrau und wachsgelb; durchscheinend; H 5; G 2,8—2,9; unschmelzbar; brennt sich weiss.

Im weissen Kalkstein bei Bolton in Nordamerika.

496. In Salpetersäure mit Aufbrausen löslich; reagiert auf Eisen; Gewicht 3,5—3,8

Spatheisenstein 174

In Säuren mit Aufbrausen löslich; reagiert auf

Talkerde; Gewicht 2,7—2,8 . . . **Talkspath** 164

497. Dunkelgrau; oft etwas schmutzig gefärbt . . . 498

Blau, grün bis schwarz . . . 500

498. Ritzt Quarz leicht; spaltet nach Rhomboëderflächen . . . **Korund** 160

Eine einzige deutliche Spaltungsrichtung . . . 499

499. Hellgrau, leicht spaltbar; mit Aufblähen zu grauem Email schmelzbar . . . **Zoisit** 379

Gelbgrau, leicht spaltbar; giebt im Kolben erst Wasser, dann gelbe Tropfen von Eisenchlorit; auf Kohle zur grauen, glänzenden Kugel schmelzbar . . . **Pyrosmalith** 215


500. Blau . . . 501

Deutlich grün bis schwarz . . . 504

501. Drei Blätterdurchgänge . . . 502

Eine einzige Spaltungsrichtung . . . 503


Zwei Spaltungsrichtungen unter schiefen Winkeln:

Saphirin.

Krystallinische Massen mit blättriger Textur; Bruch unvollkommen muschelartig; saphirblau, graulichblau, grünlichgrau, bouteillengrün, schwärzlichgrün; St. weiss; für sich und mit Borax unschmelzbar.

Im Glimmerschiefer von Fiskens in Grönland.

502. Die Durchgänge bilden Winkel von 101° und 140°.


Heterozit.

Dunkel violblau, ins Braune und Grüne, Bläulichgrau, ins Graulichweisse geneigt; kantendurchscheinend bis undurchsichtig; H. 4. 5—5, 5; G. 3, 27; in Säuren fast ganz auflöslich; schmelzbar. Mit Alluaudit bei Hureaux.

Sie bilden Winkel von 90°:

Triplit.


E i s e n p e c h e r z.



Derb, grosskörnig; Bruch unvollkommen muschelrig; schwärzlichbraun, St. gelblichgrau; Fett- bis Demantglanz; kantendurchscheinend bis undurchsichtig; H. 5—5, 5; G. 3, 6—3, 8.

Auf Klüften im Granit bei Limoges.

Sie bilden Winkel von 132° und 90°:


Triphyllin.

Derb, grosskörnig; Bruch kleinmuskelig; grünlichgrau mit blauen Flecken; St. graulichweiss; durchscheinend; Fettglanz und auf der ersten Spaltungsfläche Perlmutterglanz; H. 5; G. 3, 6; schmilzt leicht zu einer glänzenden, dunkelstahlgrauen, magnetischen Kugel.

Im Granit bei Bodemais. Sehr ähnlich ist der Tetraphyllin (Perowskin) aus Finnland; ist gelblich, wird aber in der Luft schwarz.

503.	Ritzt Glas; ist unschmelzbar	Cyanit	395
	Ritzt Glas nicht; leicht schmelzbar	Vivianit	375
504.	Mehr weniger dunkelgrün		505
	Schwarz		521
505.	Smaragdgrün		506
	Hell- oder bouteillengrün		508
506.	Weich, zwischen den Fingern zerreiblich		507
	Hart, ritzt leicht Kalkspath	Strahlstein	381

507. Wird in der Flamme braun, giebt dabei weissen Rauch und Rettiggeruch . . . **Herrerit** 846
 Wird in der Flamme braun, schmilzt zu einer schwarzen Kugel und giebt Arsengeruch
Kupferglimmer 169
 Gelbgrün mit sehr glänzenden Flächen **Blende** 13
 508. Hellgrün, zum Theil wasserhell 509
 Bouteillengrün 516
 509. Vier Blätterdurchgänge 515
 Ein, zwei oder drei Spaltungsrichtungen . . . 510
 510. Ritzt Glas 511
 Ritzt Glas nicht 510^a
 510^a. Reagirt nicht auf Fluor **Killinit** 306
 Reagirt mit Phosphorsalz in der Glasröhre auf Fluor; ist schwer zersprengbar:


Leucophan.

Krystallinische Massen; (a:b:∞ c) 53° 24'; in drei Richtungen spaltbar; unrein lichtgrün bis hell weingelb; in dünnen Splintern fast farblos und durchscheinend; St. weiss; schmilzt zu einer klaren, etwas violetten Perle; H. 3,5; G. 3.

Im Syenit bei Stakön in Norwegen.

511. Ein oder zwei Spaltungsrichtungen 512
 Drei Spaltungsrichtungen, mit Winkeln von 92° 50' und 106° 30' **Diopsid** 387
 512. Eine einzige Spaltungsrichtung; giebt auf Kohle Chlorgeruch und im Kolben saures Wasser
Pyrosmalith 215
 Zwei Spaltungsrichtungen 513
 513. Schmelzbar 514
 Unschmelzbar, aber in der Flamme weiss werdend **Davidsonit** 205
 514. Zwei Durchgänge unter 106° 10'; zu weissem Email schmelzbar:


Amblygonit.



Derb; körnig; weiss, ins Graue und Grüne; licht- berg- und seladongrün; St. weiss; halbdurchsichtig bis durchscheinend; H. 6; G. 3; leicht schmelzbar; in Schwefelsäure löslich.


Im Granit bei Chursdorf.

- Blätterdurchgang von $92^\circ 50'$; zu schwarzem Email schmelzend **Diopsid** 387
- Blätterdurchgang von $124^\circ 30'$; zu schwarzem Email schmelzend **Amphibol** 381
515. Vier Spaltungsrichtungen durch die Axe; zwei rechtwinklig; zwei unter $92^\circ 50'$. **Diopsid** 387
- Vier auf ein Octaëder leitende Blätterdurchgänge **Flussspath** 65
516. So leicht spaltbar, dass man mit einem Messer die Blättchen abnehmen kann 517
- Die Theilungsflächen lassen sich beim Zerschlagen leicht erhalten, man kann indessen die Blättchen mit einem Messer nicht abnehmen 518
517. Blättchen stark schillernd, biegsam und elastisch; zu schwarzem Email schmelzbar
- Einaxiger Glimmer** 186
- Blättchen biegsam, weich anzufühlen; unschmelzbar 445
518. Eine einzige deutliche Spaltungsrichtung . . 519
- Mehrere leicht zu erhaltende Blätterdurchgänge 520
519. Rein dunkelgrün, mit Aufwallen zu schwarzem Email schmelzbar **Epidot** 379
- Olivengrün oder schwarzgrün, oft etwas gelblich; zu grauer Schlacke schmelzbar **Diallag** 387
- Dunkelgrün, in Chloritschiefer eingewachsen, nach einer Richtung spaltbar, stark glänzende Krystalle:

Sismondin.


Bruch uneben und matt; G. 3, 56; St. licht grünlichgrau.
Bei St. Marcel in Piemont.

520. Zwei sehr deutliche Blätterdurchgänge unter
124° 30' **Amphibol** 381
Zwei oder mehrere Durchgänge, weniger
leicht zu erhalten **Augit** 387
Zwei schiefwinklige Richtungen; für sich und
mit Borax unschmelzbar **Saphirin** 501
521. Wird leicht von einer Stahlspitze geritzt . . . 522
Ritzt Glas kaum 523
Ritzt Glas leicht 521^a
521^a. Zwei Spaltungsrichtungen schiefwinklig:

Wichtyn.

Bruch muschelrig; H. 6, 5; G. 3; zu schwarzem Email schmelz-
bär; wird von Säuren nicht angegriffen.
Findet sich bei Wichty in Finnland.

Nur eine Spaltungsrichtung $\nparallel$ der Graden-
fläche:

Ottrelit.

Wahrscheinlich hexagonale Säulen; eingewachsene, an den
Kanten abgerundete kleine Säulen; meist plattenförmig, eingewach-
sen; basisch vollkommen spaltbar; H. 6, 5; G. 4, 4; kantendurch-
scheinend; fettartiger Glasglanz; schwarz, graulich-, grünlich-
schwarz; St. grünlichweiss.


Im Thon- und Talkschiefer bei Ottrez in Belgien.

522. Löst sich in Salpetersäure, selbst in der Kälte
mit starkem Aufbrausen . . . **Kalkspath** 163
Braust nur wenig mit Säure . . **Talkspath** 164

523. Zwei deutliche Blätterdurchgänge unter $124^{\circ} 30'$

	Hornblende	381
Durchgänge fast rechtwinklig	Augit	387
524. Roth, braun, rostfarbig		529
Violett oder rosenroth		525
525. Rosenroth		525 ^a
Violett		526
525 ^a . Braust mit Säuren	Manganspath	171
Braust mit Säuren nicht:		

Polnargit.



Derb; nach einer Richtung spaltbar; H. 4; G. 2, 7; hell rosenroth bis carminroth.

Im Granit bei Tunaberg.

526. Ritzt Glas		528
Ritzt Glas nicht		527
527. Vier ein Octaëder bildende Durchgänge	Flussspath	65
Drei Durchgänge, die auf ein schiefes Prisma von etwa 101° führen; undurchsichtig; glänzend	Heterozit	582
528. Zwei Spaltungsrichtungen; mit Aufblähen schmelzbar zu einem dunkeln Glase	Axinit	398
Drei Spaltungsrichtungen; sintert in der Flamme nur an den Rändern	Latrobit	399
529. Braun		530
Roth		531
530. Viele sehr glänzende Spaltungsebenen; fast metallischer Glanz	Blende	13
Spaltet in Rhomboëder, glanzlos, wie verwittert; braust mit Säuren	Spatheisenstein	174
531. Rostfarbig		532
Roth		533
532. Eine einzige Spaltungsebene, in Säuren unlöslich	Diaspor	397

Spaltet in Rhomboëder; löst sich unter brausen

Eisenkalk 163

533. Zinnoberroth oder Cochenilleroth; jedenfalls
im Striche deutlich 534

Roth, ins Bräunliche 536

534. Sehr lebhafter, halbm metallischer Glanz . . . 535

Glanz gar nicht metallisch; leicht spaltbar

Chromhaltiges Gelbbleierz

535. Gewicht etwa 8; spaltet rhomboëdrisch; ver-
flüchtigt sich auf Kohle . . . **Zinnober** 153

Gewicht etwa 5, 6; spaltet in Würfel; giebt in
der Reductionsflamme ein Kupferkorn

Rothkupfererz 15

536. Zwei rechtwinklige Spaltungsebenen; un-
schmelzbar; reagirt mit Borax auf Titan-
säure **Rutil** 142

Eine einzige, gebogene, unreine Spaltungs-
ebene; unschmelzbar; giebt mit Borax ein
durchsichtiges Glas . . . **Rothzinkerz** 440

Grossblättrig; in dünnen Blättchen roth durch-
scheinend; giebt mit den Flüssen ein weis-
ses, durchscheinendes Email:

Senbertit.

Derb, zweifache ungleiche Theilbarkeit; lässt sich von Stahl
ritzen; G. 3, 16; unschmelzbar; in Säuren auflöslich; ist anschei-
nend eine Verbindung von Silikaten und Aluminaten.


Findet sich mit Kalkspath, Hornblende und Spinell bei Amity
in New-York.

537. Wasserhell, weiss, milchweiss oder schwach
graulich, oder grünlich gefärbt 538

Lebhaft gefärbt 546

538. Sehr milde, nimmt Eindrücke vom Nagel an:


Hydroborazit.



Derb, strahlig, blättrig; blättrigem Gyps ähnlich; weiss, stel-
lenweise röthlich gefärbt; durchscheinend, H. 1—2; G. 1, 9; giebt

Zwei deutliche Blätterdurchgänge von $141^{\circ}30'$;
schwer zu weissem Email schmelzbar; färbt
die Flamme purpurroth:

Petalit.




Derb, grobkörnig bis feinkörnig; weiss, etwas ins Röthliche
oder Grünliche; St. weiss; durchscheinend; H. 6, 5; G. 2, 44.

In losen Blöcken auf Utön und in Canada.

546. Roth, braunroth, nelkenbraun	547
Blau, violett, grün	549
Gelb	546 ^a
546 ^a . Ritzt Quarz	Topas 546
Ritzt Quarz nicht:	

Monradit.



Derb, zwei Spaltungsebenen von 130° ; die eine deutlich er
Bruch feinkörnig; blassgelb ins Röthliche ziehend, unschmelzbar;
H. 6—6, 5; G. 3, 20.

Findet sich im Stifte Bergen in Schweden.

547. Roth; deutlicher Fettglanz; zwei undeutliche Spaltungsebenen	Skapolit 124
Dunkelroth, rosenroth; spaltbar nach einer Richtung:	

Rosellan.

R o s i t.

Auch weiss und violett; derb, in kleine 1—4 Linien grosse
Körner in Kalk und Granit eingewachsen; H. 2, 5—3; G. 2, 72; halb-
durchsichtig; schwierig zu weisser Schlacke schmelzbar, ist ein
Thonerdesilikat.

In Südermanland.

Braunroth; undeutlich blättrig; fast halbme- tallischer Glanz; in Salzsäure mit Aufbrau- sen löslich	Troostit 172
--	---------------------

Nelkenbraun 548
Schwärzlich - gelblichbraun; Glasglanz:

Ficinit.

Derbe, zu einer rhombischen Säule spaltbare Massen; H. 4; G. 2, 4; enthält Eisenoxydul 59, Manganoxydul 7, Schwefelsäure 4, Phosphorsäure 13, Wasser 16.

Von Bodemais im Fichtelgebirge.

548. Mehrere Spaltungsrichtungen; eine sehr deutlich; Perlmutterglanz; auf der Spaltungsfläche bisweilen halbm metallisch; unschmelzbar **Antophyllit** 381

Eine einzige Spaltungsebene; faserig - blättriger Bruch; gelblich grün; zu schwarzem Email schmelzbar **Gedrit** 387

549. Blau oder deutlich grün - bis schwarz 551

Violett 550

550. Dunkelviolet, ins Braune, mit Aufblähen schmelzbar; ritzt leicht Glas **Axinit** 398

Hell violett, röthlich; undurchsichtig; ohne Aufblähen zum dunkelgrünen Glase schmelzbar; wird von einer Stahlspitze geritzt


Eudialith 178

551. Blau 552

Grün bis schwarz 555

552. Lavendelblau; zwei Blätterdurchgänge von 143° 30':

Glaukolith.



Derb und in Geschieben; Glasglanz; auf den Theilungsflächen perlmutterartig; blassviolblau, lavendelblau, ins Grünliche; durchscheinend bis kantendurchscheinend H. 5—6; G. 2, 7—2, 9; verliert in der Flamme die Farbe und schmilzt nur an den Kanten.


Im Granit am Baikalsee.

Lasur - oder indigblau 553

553. Hellblau; durchsichtig; ritzt Quarz . **Smaragd** 205

- Ritzt Glas kaum 554
554. Wird von einer Stahlspitze geritzt; löst sich
in Säuren ohne Aufbrausen . **Kupferlasur** 375
- Ritzt Glas ein wenig; schwer schmelzbar
Cancrinit 210
555. Smaragdgrün **Smaragd** 205
- Pistaziengrün **Epidot** 379
- Hellgrün 556
- Grünlichschwarz bis schwärzlichgrün; Strich
hell graugrün:

Stilpnomelan.




Derb; körnig; stängelig; breitstängelig; gerade oder strahlig
faserig; undurchsichtig; Glas-, Fett-, Perlmutterglanz; Bruch auch
uneben bis splitterig; H. 3—4; G. 3—3,4; schwer zu schwarzer,
glänzender Kugel schmelzbar.

Im Thonschiefer bei Obergrund in Oestreichisch Schlesien.

556. Deutlicher Fettglanz; ritzt Glas nicht; zu schwar-
zem Email oder Glas schmelzbar **Skapolit** 124
- Perlmutterglanz; ritzt Glas; schmilzt kaum an
den Kanten:

Weissit.

Schaliger Triklasit.



Nierenförmige Gestalten; undeutlich theilbar; aschgrau, ins
Braune oder an der Oberfläche ins schmutzig Ochergelbe geneigt;
St. weiss; G. 2,8.

Im Glimmerschiefer bei Fahlun.

Die Mineralien sind feinblättrige Massen.

557. Deutlich bläulichgrau; sanft anzufühlen, milde;
färbt an den Fingern ab, oder giebt doch
einen gefärbten Strich auf Papier **Wasserblei** 191

Nicht sanft anzufühlen; hart	565
558. Metallischer oder halbm metallischer Glanz . . .	559
Nicht metallischer Glanz, Stein- oder Glasglanz	573
559. Deutlicher Metallglanz	560
Halbm metallischer Glanz	570
560. Dunkel eisengrau bis schwarz	561
Blei- bläulich- oder gelblichgrau	557
Silberweiss oder Zinnweiss	560 ^a
560 ^a . Zinnweiss; auf Kohle unter Arsen- Dämpfen schmelzbar:	

Arsenikspiessglanz.

Nierenförmige Massen von dünn- und vollkommen krummschaliger Zusammensetzung; Bruch körnig; der Strich erhöht den Glanz; H. 3; G. 6, 2.

Auf Gängen bei Przibram.


Silberweiss, etwas ins Gelbe geneigt; geschmeidig:

Gediegen Wismuthsilber.

Kleine Blättchen haben sich in einer grauen, thonigen, mit derben Parthien von arseniksaurem Kupfer gemengten Gangert bei San Antonio in Chili gefunden.

561. Wenig hart; wird von einer Stahlspitze leicht geritzt; Strich glänzend	562
Ziemlich hart; nur schwer von einer Stahl- spitze geritzt; Strich roth . . . Eisenglanz	154
562. Lässt sich wie Blei mit dem Messer schnei- den, Strich glänzend . . . Kupferglanz	243 _a
Abfärbende, feine, magnetische Schuppen und Flittern:	

Irit.



Füllt Höhlungen in Platin aus; schwarz; G. 6, 5; in Säuren unlöslich; riecht mit Salpeter geschmolzen nach Osmium; Gehalt Silber 6, Wismuth 11, Kupfer 0, 7, Arsenik 0, 2.

- Zerbröckelt unter dem Messer 563
 563. Giebt auf Kohle Arsengeruch 564
 Kein Arsengeruch **Glanzkobalt** 25
 564. Starker Arsengeruch; in Salpetersäure ganz
 löslich:

Gediegener Arsenik.

Scherbenkobalt, Giftkobalt, Fliegenstein.

As.

Angeblich Rhomboëder von $114^{\circ}26'$; meist derb, traubig und nierenförmig; krummschalig; stängelig; feinkörnig; zinnweiss bis hell bleigrau; schwarz anlaufend; H. 3—4; G. 5,7; auf Kohle ganz zu verflüchtigen.

Auf Gängen: Freiberg, Schneeberg, Joachimsthäl, Andreasberg.

Arsengeruch schwach; nur zum Theil in Salpetersäure löslich:

Arsenik - Antimon.

Arsenikalisches Gediegen-Antimon.

(Sb. As³)

Derbe Massen mit feinkörniger Zusammensetzung und krummschaliger Absonderung; Bruch uneben; grau; St. glänzend; das Pulver graulich schwarz; H. 3,5; G. 6,2.

Auf Gängen bei Allemont.

565. Rother Strich **Eisenglanz** 154
 Grauer Strich, häufig metallisch glänzend 566
 566. Zinngrau, bisweilen etwas gelblich oder
 röthlich 567
 Blaugrau, bleigrau 568
 567. Zinngrau, etwas gelblich oder röthlich; in gewöhnlicher Kerzenflamme schmelzbar, ohne zu brennen; vor dem Löthrohre sich zum Theil verflüchtigend und gelben Beschlag gebend; in Salpetersäure löslich unter Entwicklung von salpetriger Säure **Wissmuth** 12

- Zinngrau, ins Silberweisse; unter Entwicklung von Antimonrauch schmelzbar; wird in Salpetersäure aufgelöst, aber sofort wieder gelb niedergeschlagen **Antimon** 154
568. Gewicht wenigstens 7,5; nicht am gewöhnlichen Kerzenlichte schmelzbar 569
- Gewicht höchstens 4,6; am gewöhnlichen Kerzenlichte schmelzbar; langgezogene Blättchen; fast stängelförmig **Rothantimonerz** 359
569. Schmelzbar, giebt einen Bleiregulus und schwefelsauren Geruch **Bleiglanz** 21
- Desgleichen mit Selengeruch . . . **Selenblei** 34
570. Schwarz; weich anzufühlen; milde; die Finger beschmutzend; auf Papier einen schwarzen Strich hinterlassend 570^a
- An den Fingern nicht abfärbend 571
- 570^a. In Säuren fast ganz unauflöslich . **Graphit** 191
- In Säure fast ganz auflöslich:

Wad.

Schaumartiger Wad-Graphit, Brauneisenrahm, Manganschaum, Rahm- oder Schaumerz.

Mn² H.


Strahlig, schuppig, faserig, erdig, staudenförmig, nierenförmig, traubig, tropfsteinartig, derb; nelken-, haar-, leber-, schwärzlichbraun; durchscheinend bis undurchsichtig; metallähnlicher Perlmutterglanz bis matt; an der Zunge hängend; fettig anzufühlen; H. 0,5; G. 3,7; bisweilen so locker, dass er auf dem Wasser schwimmt.

Oft baryt- und eisenhaltig: Siegen, Iberg bei Grund, Voigtland, Romaneche, Derbyshire.

571. Ausgezeichnet kleinblättrig mit gelblichem, grünlichem oder bräunlichem Widerschein; Flächen sehr glänzend **Blende** 13
- Mehr weniger blättrig in einer Richtung und ohne Widerschein 572

572. Violett, grünlichgrau; sehr blättrig; scharf
beim Anfühlen, und zu schwarzem Email
schmelzbar **Lepidolith** 322
Grün, grünlich, bisweilen weiss, perlmutter-
glänzend; fettglänzende Schuppen; weich
anzufühlen, unschmelzbar **Talk** 186
Weiss, perlmutterglänzend; mit strahligen,
durchsichtigen Lamellen 573
Zu weissem Email schmelzbar:

Damourit.



Weich, aber nicht, wie Talk, fettig anzufühlen; ritzt Talk und wird von Flussspath geritzt; löst sich in concentrirter Schwefelsäure, nicht in Königswasser.

Bildet die Zwischenräume des grosskrystallisirten Cyanits und des Stauroliths von Pontivy im Departement Morbihan:


573. Ritzt Glas 574
Ritzt Glas nicht; wird von einer Stahlspitze
leicht geritzt 579
574. Weiss, graulich-, grünlich- oder rosenröth-
lichgrau, immer hell gefärbt

Feldspathartige Mineralien 575

- Violett, braunviolett, grün oder schwarz gefärbt 577
575. In Säuren löslich; im vulkanischen Gestein
Labrador 396
Von Säuren nicht angegriffen 576
576. Reagirt durch Platinchlorit auf Kali **Feldspath** 330
Reagirt nicht auf Kali **Albit** 396^a
577. Violett oder braunviolett, mit Aufblähen
schmelzbar **Axinit** 398
Grün bis schwarz 578
578. Blätterdurchgänge nach zwei Richtungen un-
ter etwa 24°; Flächen sehr glänzend; sehr
dunkel gefärbt; zu schwarzem Email schmelz-
bar **Hornblende** 381

Undeutlich blättrig, bouteillengrün . . .	Augit	387
579. In Wasser ganz löslich . . .	Steinsalz	69
In Wasser unlöslich . . .		580
Im heissen Wasser theilweise löslich:		

Fibroferrit.



Gebogene blättrige Massen, mit einer der Blätterrichtung entgegengesetzten faserigen Textur; einzelne Fasern etwas biegsam und durchscheinend; Seidenglanz bis matt; blass grünlichgrau, aussen gelblich; Geschmack etwas sauer und adstringierend.

Findet sich in Chili.

580. Sehr weich; wird vom Nagel geritzt; weisslich . . .	Gyps	332
Sehr weich, smaragdgrün bis schwarzgrün:		


Fuchsit.

Zartschuppig, krummschiefzig; seidenglänzende, glimmerartig schillernde Massen mit apfelgrünem Striche; H. 1, 5; G. 2, 8. Es ist ein chromoxydhaltiger Glimmer.

Am Schwarzenstein im Zillerthal.

Sehr weich; schwillt in der Flamme an, und krümmt sich wurmförmig, ohne zu schmelzen:

Vermiculith.



Glimmerartige Blättchen; Fettglanz; H. 1; G. 2, 5.

Bei Vermont in Nordamerika.

Wird vom Nagel nicht geritzt . . .	581
581. Rosenroth, grün, braun, gelbbraun, selten schwarz . . .	587
Weiss, milchweiss, hellgrau oder hellrostfarbig . . .	582
582. Gewicht über 4, 2 . . .	583
Gewicht 2, 7—2, 9 . . .	584

583. Gewicht 4, 4; die Löthrohrflamme gelbroth
färbend **Schwerspath** 267
Gewicht 3, 85—3, 9; die Löthrohrflamme pur-
purroth färbend **Cölestin** 267
584. Ritzt Kalkspath; in Säuren unlöslich **Anhydrit** 274
So hart wie Kalkspath, mit Brausen in Sä-
ren löslich 585
Wird von Kalkspath geritzt; Perlmutter- bis
Fettglanz 584^a
584^a. Braust mit Säuren:

Didrimit.

A m p h i l o g i t.

Derb; krystallinisch zartschuppig; im Grossen schiefbrig; schwacher Perlmutterglanz; grünlich weiss; kantendurchscheinend; pulverfettig anzufühlen; leicht zerreiblich; H. 1, 5—2; G. 2, 75; enthält Kieselerde 40, Thonerde 18, Kali 11, Natron 1, Eisenoxyd 5, kohlensaurer Kalk 23, Wasser 0, 6.

Ist bisher dem Talkschiefer des Zillerthales beigerechnet.

Braust nicht mit Säuren:

Paragonit.


Derb; zartschuppig ins Dichte; im Grossen schiefbrig; gelblich- und graulichweiss; kantendurchscheinend; milde, fühlt sich etwas fettig an; H. 2—2, 5; G. 2, 78; enthält Kieselerde 50, Thonerde 40, Natron 8, Eisenoxyd 2, Wasser 2.

Bildet die Grundmasse, in welcher am St. Gotthard der Cyanit und Staurolith vorkommen.

585. Selbst in der Kälte lebhaft damit aufbrausend
Kalkspath 163
Selbst in der Wärme wenig aufbrausend . . . 586
586. Die Lösung enthält Kalk **Dolomit** 164
Die Lösung enthält keinen Kalk . **Talkspath** 164
587. Das Mineral ist rosenroth gefärbt **Manganspath** 171
Gelblichgrün, braun, gelbbraun oder schwarz 588
588. Gelblichgrün, gelblichbraun oder braun . . 589
Schwarz **Bituminöser Kalkstein** 163

Rabenschwarz, bisweilen ins Lauchgrüne;
Strich berggrün:

Lepidomelan.




Derbe, körnig-schiefrige, aus kleinen schuppigen, bisweilen aus sechsseitigen Tafeln bestehende Massen, demantartiger Glasglanz; H. 3; G. 3; zu schwarzem Email schmelzbar.

Wahrscheinlich von Persberg in Wärmeland.

589. Braun	Spatheisenstein	174
Gelblichbraun		590
Grün		589 ^a

589^a. Hell gelblichgrün; Wachsglanz; in Säuren unlöslich:


Huronit.



Geschiebe; unvollkommen blättrig; kantendurchscheinend; H. 3; G. 2, 8; unschmelzbar; brennt sich graulich weiss.
Am Huronsee.

Dunkelgrün; schimmernd:

Pikrophyll.



Derbe Massen mit blättriger Zusammensetzung; H. 2, 5; G. 2, 7; brennt sich weiss.

Dem Salit ähnlich und auch bei Sala gefunden.


590. Gewicht 3, 6—3, 8: in Säuren mit schwachem Aufbrausen löslich . . .	Spatheisenstein	174
Gewicht 2, 8—3; selbst in der Kälte mit Säuren lebhaft brausend . . .	Eisenkalk	163

Krystallinisch körnige oder körnige Mineralien.

591. Metallischer oder halbm metallischer Glanz . . .	592
Glas- oder Steinglanz	615

592. Metallglanz	579
Halber Metallglanz	593
593. Dunkelgrau; an den Fingern abfärbend Graphit	191
Grünlich, bräunlich oder violett	594
594. Violett Lepidolith	322
Grünlich oder bräunlich	595
595. Grünlich oder gelbgrün	596
Bräunlich; Strich grau; unschmelzbar, aber in der Flamme nach schwefliger Säure rie- chend Blende	13
596. Grünlich; silberfarben widerscheinend; zu schwarzem Email schmelzbar ohne dabei zu riechen Lepidolith	322
Gelbgrün; auf Kohle unschmelzbar, aber nach schwefliger Säure riechend Blende	13
597. Eisen- oder stahlgrau	598
Hell- oder blaugrau, zinnweiss	608
Lichte broncegelb:	

Eisennickelkies.



Krystallinische Massen; theilbar nach den Flächen eines regel-
mässigen Octaëders; Bruch feinkörnig ins Muschelige; H. 4; G. 4, 6;
St. dunkelgelb.

Bei Lillehammer in Norwegen.

598. Hart, ritzt Glas	600
Ritzt Glas nicht	603
600. Zieht den Magnet an . . . Magneteisenstein	23 ^a
Zieht den Magnet gar nicht oder kaum an . . .	601
601. Rothcs Pulver beim Zerschlagen Eisenglanz	154
Strich grau	602
602. Etwas den Magnet anziehend; giebt mit Borax ein smaragdgrünes Glas . Chromeisenstein	27
Auf den Magnet nicht wirkend; färbt Borax violett Braunit	109
603. Gewicht über 6; auf Kohle Arsengeruch . . .	604
Gewicht unter 5; kein Arsengeruch auf Kohle	605

604. Auf Kohle zu verflüchtigen mit dickem Rauche;
in Salpetersäure ganz auflöslich
Gediegenes Arsen 564
Schwer zu verflüchtigen; oft ein Silberkorn
gebend; wird von Salpetersäure angegriffen,
giebt aber einen starken gelben Nieder-
schlag **Arsenspiessglanz** 564
605. Brauner oder braunrother Strich 606
Schwarzer Strich 607
606. Brauner Strich; im Kolben 9—10 p. C. Was-
ser gebend **Braunmanganerz** 246
Strich braunroth; fast wasserfrei, höchstens
1 p. C. Wasser enthaltend **Scharfmanganerz** 109
607. Stahlgrau, ritzt kaum Kalkspath, Gewicht 4, 8;
aus der Lösung wird von schwefliger Säure
nichts gefällt **Graumanganerz** 247
Dunkelblaugrau; ritzt Flussspath; Gewicht 4, 1;
schweflige Säure giebt einen Niederschlag
Schwarzmanaganerz 109
608. Hellgrau 609
Blaugrau oder zinnweiss 611
609. Gewicht etwa 8; auf Kohle Arsengeruch
Gediegen Arsen 564
Gewicht unter 5; giebt auf Kohle keinen Ar-
sengeruch 610
610. Strich braun; im Kolben etwa 10 p. C. Was-
ser
Braunmanganerz 246
Strich schwarz; nur etwa 1 p. C. Wasser
enthaltend **Graumanganerz** 247
611. Blaugrau 612
Zinnweiss oder gelblich weiss 614
612. Sehr milde; am gewöhnlichen Kerzenlichte
schmelzbar; giebt auf Kohle Antimonrauch
und verflüchtigt sich ganz **Rothantimonerz** 359
Unschmelzbar am gewöhnlichen Kerzenlichte;
schmilzt aber in der Löthrohrflamme und
giebt ein Bleikorn 613

- | | | |
|---|-------------------------|-----|
| 613. Entwickelt beim Schmelzen Schwefelgeruch | Bleiglanz | 21 |
| Auch Selengeruch | Selenblei | 34 |
| 614. Glänzend zinnweiss; giebt auf Kohle Antimon- | | |
| dämpfe; löst sich in Salpetersäure, bildet | | |
| aber sofort einen gelblichen Niederschlag | Gediegen Antimon | 154 |
| Gelblichweiss, bisweilen ins Röthliche; oft | | |
| matt; giebt auf Kohle keinen Geruch, und | | |
| ist in concentrirter Salpetersäure ohne Rück- | | |
| stand löslich | Gediegen Wismuth | 12 |
| 615. Weiss, milch-, grau- oder röthlichweiss; vom | | |
| Weissen nur wenig abweichend | | 616 |
| Lebhaft gefärbt | | 624 |
| 616. Gewicht etwa 4 | | 617 |
| Gewicht 2, 2—3, 3 | | 619 |
| 617. In Salpetersäure löslich | Willemitt | 167 |
| In Säuren unlöslich | | 618 |
| 618. Färbt die Löthrohrflamme orangegelb | | |
| | Schwerspath | 267 |
| Färbt sie purpurroth | Cölestin | 267 |
| 619. Sehr milde, wird vom Nagel geritzt | Gyps | 332 |
| Nimmt vom Nagel keine Eindrücke an | | 620 |
| 620. In Säuren unlöslich, wasserfrei | Anhydrit | 274 |
| In Säuren unlöslich, enthält 11 p. C. Wasser: | | |

Anauxit.


Derbe, in einer Richtung theilbare Massen; kleinkörnig; grünlichweiss; durchscheinend bis kantendurchscheinend; grünlichweiss; perlmutterglänzend; kaum fettig anzufühlen; brennt sich weiss; H. 2—3; G. 2, 26. Gehört zur Glimmerfamilie.

In einem thonigen Gestein bei Bilin.

- | | |
|---|-----|
| In Salpetersäure löslich | 621 |
| 621. Ohne Aufbrausen löslich | 622 |
| Mit Aufbrausen | 623 |
| 622. Schmilzt leicht zu weissem Email, giebt im | |

Kolben 13—14 p. C. Wasser; weiss und fleischroth gestreift:

Lehuntit.



G. 1,95; verhält sich chemisch wie ein Zeolith, und gehört vielleicht zum Natrolith.

Findet sich zu Glenarm in Schottland.

Nur schwer schmelzbar und wasserfrei **Apatit** 209
623. Mit lebhaftem Aufbrausen löslich

Kohlensäurer Kalk 183

Braust langsam auf und hat etwas Perlmut-
terglanz

Dolomit 164

624. Violett, roth, braun oder schwarz 625

Grün, gelbgrün oder blau 634

625. Violett **Lepidolith** 322

Roth, rosenroth, braun oder schwarz 626

626. Rosenroth **Manganspath** 171

Roth, braun oder schwarz 627

627. Roth 638

Braun oder schwarz 628

628. Braun 629

Schwarz 632

629. Mit Aufbrausen in Salpetersäure löslich 630

Ohne Aufbrausen oder mit Entwicklung von

salpetriger Säure löslich 633

630. Braust stark auf **Eisenkalk** 163

Braust langsam auf 631

631. Perlmutterglanz, die Lösung enthält viel Kalk

Gewicht 2,8—3 **Dolomit** 163

Die Lösung enthält keinen oder nur sehr we-

nig Kalk; Gewicht 3,5—3,6 **Spatheisenstein** 174

632. Lebhaftes Aufbrausen **Bituminöser Kalkstein** 163

Langsames Aufbrausen **Bituminöser Dolomit** 163

633. Riecht in der Flamme nach schwefliger Säure

Blende 13

- Vor dem Löthrohre unveränderlich **Willemit** 167
634. Schön blau **Kupferlasur** 375
- Grün, gelblichgrün oder gelb 635
635. Grün 636
- Gelblichgrün oder gelb 637
636. Dunkelgrün 636^a
- Hellgrün; Masse mehr flittrig-schuppig als körnig **Lepidolith** 322
- 636^a. Strich grünlichgrau bis berggrün . **Chlorit** 186^a
- Strich zeisiggrün; fettglänzend:

Thuringit.

Derb; körnig; nach einer Längsrichtung deutlich theilbar; olivengrün; undurchsichtig; H. 2.—2,5; G. 3, 15; fühlt sich fettig an. Auf einem Eisenerzlager bei Schmiedefeld unweit Saalfeld.

637. Unschmelzbar, auf Kohle nach Schwefel riechend **Blende** 13
- Schwer schmelzbar; riecht auf Kohle nicht

Apatit 209

638. Gewicht 3, 6; brennt in der Flamme mit Knoblauchgeruch **Bauschroth** 357
- Gewicht 4; giebt auf Kohle ein Silberkorn:

Xanthokon.

Nierenförmig; krystallinisch körnig, Bruch uneben und muschelig; dunkel cochenilleroth bis nelkenbraun; St. pomeranzengelb; halbdurchsichtig bis kantendurchscheinend; H. 2—3; scheint Silber (59 p. C.), Schwefel und Arsenik zu enthalten. Auf Rothgültigerz bei Freiberg.


Gewicht etwa 8; riecht auf Kohle etwas nach Schwefel, verflüchtigt sich ganz und giebt im Kolben Quecksilber **Zinnober** 153^a

Concretionen.

639. Zu Stalaktiten, Stalagmiten, Warzen- und Nieren concretionirte Körper mit faseriger, schuppiger, dichter oder erdiger Structur 640

- Gerade - oder ausstrahlend faserige Massen
mit netzförmigen, gekreuzten oder gestrick-
ten Fasern; oder von stängelförmiger Structur **715**
- 640.** In Wasser löslich **641**
In Wasser unlöslich **644**
- 641.** Gefärbte Salze **642**
Weisse oder graulichweisse Salze **643**
- 642.** Schön blau **Kupfervitriol 392**
Hellgrün **Eisenvitriol 319**
- Fleisch - und rosenroth:

Kobaltvitriol.



Krystalle angeblich denen des Eisenvitriols ähnlich; gewöhnlich tropfsteinartig, zackig, mit undeutlich stängeliger Textur; Perlmut-
terglanz; halbdurchsichtig bis durchscheinend; Geschmack zusam-
menziehend.

In alten Grubenbauen zu Biber im Hanauischen.

- 643.** Sehr adstringirend **Alaun 63**
Bitterer Geschmack **Bittersalz 228**
- 644.** Metallischer oder halbmattlicher Glanz **645**
Ohne metallischen Glanz **653**
- 645.** Gold-, messing- oder grünlichgelb **646**
Bein-, Stahl- oder eisengrau oder schwarz **647**
- 646.** Gold- oder messinggelb; schlägt Feuer; giebt
auf Kohle eine magnetische Schlacke

Schwefelkies 17

Etwas grünlichgelb; schlägt kein Feuer; wird
durch das Rösten nicht magnetisch

Kupferkies 107

- 647.** Gewicht mindestens 6,5 **648**
Gewicht nur selten 4—5,3 **649**
- 648.** Braunschwarz mit halbmattlichem Glanz;
auf dem Bruche Harzglanz; Oberfläche war-
zig; unschmelzbar:

Uranpecherz.

Pecherz, Pechuran, Pechblende, Schwarzuranz,
pechartiges Uranerz.

Ü.

Nierenförmig; derb; eingesprengt; undurchsichtig; Fettglanz bis schimmernd; H. 5—6; G. 6, 5.

Mit Zinnstein auf Gängen: Johanngeorgenstadt, Joachimsthal, Cornwall. Das Pittinerz von Johanngeorgenstadt ist etwas leichter (5) und milder; das Schweruranerz von Przibram schwerer (8).

Auf der angelaufenen Oberfläche schwarz; auf dem frischen Bruche glänzend und grau; schaalig; auf Kohle starker Knoblauchgeruch

GediegenArsenik 564

649. Mehr weniger dunkelschwarz, stalaktiten- oder nierenförmige Körper mit meist nur halbmetallischer, angelaufener oder glänzender Oberfläche **650**

Fast metallischer Glanz; faserige, bisweilen stängelförmige Concretionen **651**

Frisch bleigrau; Strich dunkel kirschroth bis röthlichbraun; halbmetallischer Glanz:

Hypargyrit.

Hypargyronblende.

In eingewachsenen, gerundeten, zuweilen wie gegossen erscheinenden Massen, deren Umrisse in zarte Spitzen oder in spiesige Krystalle sich enden; Bruch uneben, ins Ebene und Flachmuschelige; Farbe oft angelaufen; H. 3—3,5; G. 4,78—4,89; fast spröde; enthält 35 p. C. Silber, viel Arsen und Schwefel, etwas Eisen und wenig Antimon.

Ist zu Andreasberg vorgekommen.

Frisch und schwärzlich bleigrau; Metallglanz; entzündet sich in der Kerzenflamme:

Arsenikglanz.

Nach einer Richtung theilbar; auch kugelige und ähnliche Gestalten mit stängeliger Zusammensetzung; Bruch uneben; H. 2;

G. 5, 3; in Salpetersäure löslich, aus der Lösung krystallisirt arsenige Säure; enthält Arsenik und Wismuth.


Marienberg in Sachsen, Markirchen im Elsass.

650. Halbmetallische glänzende Oberfläche; auf dem Bruch gelbbraun; Strich gelb

Brauner Glaskopf:

Brauneisenstein.

Eisenoxydhydrat, Brauneisenerz, brauner und schwarzer Glaskopf, Brauneisenocher, Lepidokrokit.



Ochergelb bis pechschwarz, Strich ochergelb bis haarbraun; G. 2, 6—3, 8; H. 5 bis zerreiblich; unschmelzbar; Fettglanz, Glasglanz, Demantglanz; Wasserhaltig.

Auf Gängen, Stöcken und Lagern; durch Thongehalt verschieden ist der braune Thoneisenstein mit flachmuscheligen oder erdigem Bruch, oft schaalig (Adlerstein, Klapperstein, Bohnerz); die im Strich wachsglänzende, an der Zunge anhängende Umbra; durch grössern Kieselgehalt und ochergelbe Farbe der faserige, muschelige oder ochrige Gelbeisenstein, (Gelberde); der gelbe Thoneisenstein, (Bohnerz, Linsenerz) ist ein Gemenge von Gelbeisenocher und Thon und oft auch Sand. Eben so gehört hierher der grüne, ins Gelbliche und Schwärzliche sich ziehende, bald faserige (Chalkosiderit, Grengesit, Alluaudit), bald dichte, bald erdige (Grüneisenerde, Dufrenit, Hypochlorit) Grüneisenstein; so wie auch endlich der etwas Phosphorsäure, Humussäure, Quellsäure und Thon enthaltende Raseneisenstein, (Wiesen-, Sumpf-, Morasterz, Limonit, Quellerz).

Aussen und innen halbmetallischer Glanz;

Strich schwarz **Pyrolusit 246**

651. Braunes und röthliches Pulver beim Zerschlagen **652**

Pulver schwarz **Pyrolusit 246**

652. Röthlicher Strich; giebt auf Kohle eine magnetische Masse **Sphärosiderit 174**

Bräunlicher Strich; giebt im Kolben Wasser und auf Kohle keine magnetische Masse

Manganit 246

653. Ritzt Glas **654**

Ritzt Glas nicht **658**


654. Verschieden gefärbt; nierenförmig oder schaalig; Bruch eben oder muscheligen, aber nicht faserig **655**

Hellgrün, mit faserigem Bruch; aus mehr weniger deutlichen einzelnen Warzen bestehend

Prehnit 271

Eine krystallinische, leicht ablösbare Rinde auf Sandstein und Thoneisenstein:

Fischerit.



Anscheinend in sechsseitigen Säulen krystallisirt; durchsichtig, licht Grasgrün bis Oliven- und Spangrün; Glasglanz; H. 5; G. 2, 46; Unschmelzbar; wird in der Flamme undurchsichtig; unrein weiss, und stellenweise schwärzlich; nur in concentrirter Schwefelsäure löslich. Bei Nischnei Tagilsk.


655. Schmutzig rosenrothe Schaaen lösen sich auf graulichweissen Parthien ab **Mangankiesel 387**

Nierenförmig mit deutlichem, muscheligen Bruch **656**

656. Wasserhell, selten milchweiss, mit deutlich, traubenförmiger Oberfläche; auf vulkanischem Gestein **Hyalith:**

Opal.

Untheilbarer Quarz.



Dicht; nierenförmig; traubig oder tropfsteinartig; unschmelzbar; H. 5—7; G. 2—2, 2; Bruch muscheligen; in Kalilauge meist löslich.

Man unterscheidet den traubigen, glasglänzenden Hyalith; den hyacinthrothen, durchsichtigen, glasglänzenden Feueropal, (Zeasit); den milchweissen, schillernden, halbdurchsichtigen Edelopal; den nierenförmigen, tropfsteinartigen oder derben, fettglänzenden, durchscheinenden gemeinen Opal, (Milchopal, Chrysopal, Wachsoopal, Pechopal, Hydrophan, Prasopal, Alumocalcit); den kantendurchscheinenden, wenig glänzenden Halbopal, (Holzopal, Leberopal); den fettglänzenden, knolligen oder derben, durch Eisen ochergelb, haarbraun oder blutroth gefärbten Jasp-

opal; den undurchsichtigen, matten, oft nierenförmigen, weissen Cacholong, (Weltauge, Hydrophan); und den tropfsteinartigen zerfressenen Kieselsinter, auch wohl derb oder erdig, (Kieselguhr, Bergmehl); braun Menilit; endlich netzförmig faserig, als Michaelit.

Häufig in Porphyrtigen und vulkanischen Gesteinen.

Der Chalcedon scheint ein Gemeng von Quarz und Opal zu sein.

- Wasserhell, dicht; muscheliger, selten faseriger oder gar austrahlender Bruch 657
657. Runde, verwachsene Körner, weintraubenförmig; ausstrahlend faserig . **Traubenquarz** 656
- Gesonderte Nieren von verschiedener Grösse, meist karniolroth oder aschgrau gefärbt; muscheliger Bruch; stark durchscheinend; aber immer wolkig **Achat** 220
658. Wasserhell; milchweiss oder schwach grau, grün oder schmutzig gelb gefärbt 659
- Lebhaft gefärbt 680
659. Oberfläche warzenförmig oder gekörnt; Körner isolirt oder verschmolzen; Bruch dicht oder faserig; auf Ganggestein 660
- Grössere Warzen, mit strahligem Bruche; schalig; Stalaktiten oder Nieren mit concentrischen Lagen 663
660. Bruch dicht oder erdig 661
- Bruch schaalig mit Gummiglanz oder faserig und seidenglänzend 662
661. Etwas grünlich, unter Aufblähen schmelzbar; auf Amphibolgestein . . **Botryolith** 329
- Erdigweiss, mit wellenförmiger Structur; unschmelzbar; über 30 p. C. Wasser haltend:

Gibbsit.

Äl H³.

Stalaktitische, röhrenförmige Massen mit strahligfaseriger Textur; auch dicht; weiss, graulich-, grünlich-, gelblichweiss;


schimmernd oder wenig glänzend; schwach durchscheinend; H. 3, 5; G. 2, 4; unschmelzbar; brennt sich weiss.

Auf Brauneisenstein bei Richmond in Massachusetts.

662. Bruch schaalig, grünlichgelb oder hellgrün; gummiartig warzig und eben so glänzend:

Bleigummi.

Gummispath, Gummibleispath.



Traubig, nierenförmig, tropfsteinartig; Oberfläche glatt; Glasglanz in den Fettglanz geneigt; oft farbig gestreift; durchscheinend; H. 4—4, 5; G. 6, 3—6, 4; nur theilweise schmelzbar, heftig decrepitirend und aufschwellend; in Salpetersäure löslich.


Zu Huelgoat und Beaujeu in Frankreich auf Bleigängen.

Bruch faserig und seidenglänzend **664**

663. Kleine, runde, verschmolzene Körner bilden eine weisse, erdige, oolithartige Masse; im Bruch ausstrahlend faserig, wie die Loupe zeigt; färbt an den Fingern ab:

Aluminit.


W e b s t e r i t.



Undurchsichtig; Oberfläche rauh und matt; sehr weich; G. 1, 6; stark wasserhaltig, giebt beim Glühen schweflige Säure; in Salzsäure leicht löslich.

Halle, Newhaven, Epernay.

Der auch bei Halle gefundene Paraluminit ist gelblich-weiss, und hat die Formel:




Einzelne; seidenglänzende Warzen oder Quäste mit deutlich strahliger Textur; weich, bisweilen zwischen den Fingern zerreiblich; giebt auf Kohle Arsengeruch **Pharmacolith 351**

Tropfsteinartig, büschelförmig und zartfaserig;

Härte 3,5—4:

Antrimolith.



Weiss, undurchsichtig; zu Email schmelzbar; in Salzsäure zu einer Gallerte löslich.

In Mandelsteinen zu Bengane in Irland.

664. Grössere Warzen mit strahliger Textur; concentrisch strahlige, nierenförmige Massen . 665
Stalaktiten oder Stalagmiten

Kohlensaurer Kalk 163

Ganz kleine feinstrahlige Kugeln; mit gediegen Tellur auf Quarz:

Tellurocher.

Tellurige Säure.

Gelblichweiss ins Grauliche. Ist in Siebenbürgen vorgekommen.


665. Warzig, nierenförmig, mit strahliger Textur . 672
Gesondert schalig; Bruch faserig, dicht oder erdig 666

666. Gedreht, längsgefaltet, dicht, gräulichweiss

Gekrösstein 274

- Wellenförmig, aber nicht gefaltet 667
667. Weiss, schalig, sich in concentrische, glänzende Schalen spaltend; Bruch eben, erdig; giebt im Kolben Wasser:

Zinkblüthe.



Blassgelb; St. stark glänzend.


Zu Raibel und Bleiberg in Kärnthen und zu Czarlay in Oberschlesien.

- Schalig, die Schalen aber schwer oder gar nicht zu trennen; Bruch faserig 668

668. Wird vom Nagel leicht geritzt **Gyps** 332
 Wird vom Nagel nicht geritzt 669
669. Die sehr deutlichen Fasern endigen in kry-
 stallisirte Spitzen, welche eine raube Ober-
 fläche bilden **Arragonit** 275
 Fasern undeutlich; die warzige Oberfläche
 glatt 670
670. Durchsichtig, Fasern gewöhnlich fein; braust
 mit Säuren auf 671
 Ohne Brausen in Säuren löslich **Kieselzinkerz** 272
671. Die Lösung enthält Kalk; wird in der Flamme
 kaustisch **Kohlensaurer Kalk** 163
 Die Lösung ist kalkfrei; giebt in der Reduc-
 tionsflamme Zinkrauch **Zinkspath** 162
672. Nieren oder Kugeln mit concentrischem Bruch 673
 Warzige oder nierenförmige Massen mit strah-
 lig faserigem Bruch 675
673. Gewicht etwa 3, 8; feste, etwas grünliche
 Kugeln; braust in Säuren nicht . **Cölestin** 267
 Gewicht höchstens 2, 8; deutlich concentrische
 Lagen mit faseriger Textur 674
674. Hohle, aussen gewöhnlich von einer eisenhal-
 tigen, an den Fingern abfärbenden Rinde
 bedeckte Kugeln; löst sich in Säuren ohne
 Aufbrausen . . . **Wavellit von Brasilien** 282
 Längliche, nicht hohle Nieren mit oft spathi-
 gem Kern; braust mit Säuren
Kohlensaurer Kalk 163
675. Gewicht etwa 4, 2; faseriger, strahliger und
 muscheliger Bruch **Witherit** 264
 Gewicht höchstens 2, 8 676
676. Wird vom Nagel geritzt **Gyps** 332
 Nimmt vom Nagel keine Eindrücke an . . . 677
677. Kleine, etwa 3 Linien grosse, volle, aussen
 schmutziggraue Nieren mit strahlig faseri-
 gem Bruch; die Fasern zum Theil wasser-

- hell, glänzend, meergrün, auf Thonschiefer angewachsen **Wavellit** 282
- Grössere Kugeln, bis 4 Zoll im Durchmesser, mit strahlig faserigem Bruch; die Fasern zum Theil durchsichtig und milchweiss, bisweilen stengelartig 678
678. Fasern mit starkem Perlmutterglanz; der Länge nach spaltbar; löst sich ohne Aufbrausen, und ohne eine Gallerte zu bilden, in Säuren; die Lösung enthält Kalk . . . **Stilbit** 272
- Die Fasern haben Glasglanz und lassen sich nicht spalten; löst sich in Salpetersäure zu einer Gallerte oder braust darin auf . . . 679
679. Löst sich zu einer Gallerte auf; die Lösung reagirt nicht auf Kalk **Natrolith** 282
- Löst sich mit Brausen in Säuren, **Arragonit** 275
680. Rosenroth, violett, blau oder grün 681
- Gelb, grau, gelbgrau, braungrau, braun, gelblichbraun, röthlich oder schwarz 692
681. Rosenroth — 682
- Violett, blau oder grün 683
682. Zart rosenroth, weisslich rosenroth bis grau-lichweiss; bildet kleine seidenglänzende Warzen; reagirt auf Arsenik . **Roselit:**

Pikropharmakolith.




Kugelig und traubig, meist einen Kern von Schwertspath umschliessend; von strahliger, blättriger Zusammensetzung; Bruch erdig; Perlmutterglanz; undurchsichtig.

Zu Riechelsdorf; es gehört hierher wahrscheinlich auch der entweder in zwei- und eingliedrigen, oder ein- und einaxigen Krystallen vorgekommene, glasglänzende, durchscheinende, auf Kohle schwarz werdende Roselit von Schneeberg.

Carmin-, cochenille- bis pfirschblüthroth, selten grünlich; bildet Warzen oder Quäste

- mit seidenglänzendem, nicht ausstrahlend
faserigem Bruche **Kobaltblüthe** 359
683. Violett, bisweilen bläulich, bandartig bunt
gefärbte Concretionen mit blättrig faserigem
Bruche **Flussspath** 65
- Blau 684
- Grün 685
684. Hellblau, faserig, zum Theil durchsichtig
Cölestin 267
- Indigblau, bildet verwachsene Warzen oder
einzelne Nieren, braust mit Säuren
Kupferlasur 375
- Dunkelblau, in Säuren ohne Brausen auflös-
lich; reagirt auf Arsen **Aphanes** 837
685. Hellgrün, fast wassergrün; bildet kleine gum-
miartige Warzen; hat auch gummiartigen
Glanz und Bruch **Bleigummi** 662
- Grün 686
686. Gelblich- oder blaugrün; einzelne Warzen
mit dichtem Bruche 687
- Spangrün mit breitstängeliger Zusammensetzung:

Aurichalzit.



Derb; in ein- oder aufgewachsenen Körnern, oder als dru-
siger Ueberzug; durchscheinend; Perlmutterglanz; sintert in der
Flamme zusammen, schmilzt aber nicht.

Auf Kupfergruben am Altai

Pistazien-, spargel-, olivengrün mit musche-
ligem Bruch:

Pissophan.

Derb; stalaktitisch, nierenförmig, rindenartig, mit glatter Ober-
fläche; H. 2—2,5; G. 1,9; durchsichtig bis durchscheinend; Glas-
bis Fettglanz; St. weiss; zerfällt im Wasser zu scharfkantigen
Stücken; brennt sich schwarz; enthält Schwefelsäure 13, Thonerde
35, Eisenoxyd 10 und Wasser 42.

Im Alaunschiefer bei Garnsdorf unweit Saalfeld.


Oliven-, bouteillen-, smaragdgrün, mit faseriger Textur 688

687. Gelblichgrün; halbdurchsichtige Warzen mit ebenem Bruche; Gewicht etwa 6; leicht schmelzbar **Buntbleierz** 198

Bläulichgrün; schalig; die einzelnen Schalen verschieden stark gefärbt; Gewicht höchstens 2, 4; wird in der Flamme schwarz ohne zu schmelzen:

Kieselkupfererz.

Kupfergrün, Kupfersinter, Kieselmalachit, Kieselkupfer, Berggrün, Kupfersilikat, Kupferhydrophan, Kupferblau.



Traubig, nierenförmig, kugelig, tropfsteinartig; derb, als Ueberzug, bis erdig; spangrün, ins Himmelblaue, pistaziengrün; kantendurchscheinend; St. grünlichweiss; H. 2—3; G. 2—2, 2.

Auf Gängen und in vulkanischen Gesteinen: Dillenburg, Kamsdorf, Harz, Ungarn, Sibirien, Aetna.


688. Bouteillen- oder smaragdgrün **689**

Olivengrün **688^a**

688^a. Giebt auf Kohle Arsengeruch . . . **Olivenerz** 257

Giebt auf Kohle keinen Arsengeruch:

Kirwanit.



Kugelförmige Massen mit strahlig stängeliger Textur; auch büschelig-faserig; dunkelolivengrün; undurchsichtig; färbt sich in der Flamme schwarz und schmilzt theilweise.

Im basaltischen Gestein von Irland.

689. Dunkel bouteillengrün, ins Graue, Schwarze und Gelbe; bildet Warzen mit ausstrahlend faserigem Bruch; schmilzt mit Arsengeruch,

und giebt nach dem Rösten eine magnetische Masse:

Alluaudit.

Dufrenit

Traubige, nierenförmige Gestalten; im Bruch dünnstängelig; H. 3; G. 3, 2. Ist phosphorsaures Eisenoxyd mit etwas Mangan und 9 p. C. Wasser.

Im Granit bei Hureaux; auch gehören wahrscheinlich der Sayner Grüneisenstein und der Mullicit hierher.

Smaragdgrün

690

690. Deutlich concentrisch gebildete Warzen, mit verschieden gefärbten Lagen; braust mit Säuren

Malachit 378

Innen einfarbig; ohne Brausen löslich . . . 691

691. Dunkelgrün; Warzen mit sammtschwarzem Ueberzuge; wird in der Flamme schwärzlich, und schmilzt zu braunschwarzer Kugel, die ein Kupferkorn enthält

Phosphatkupfererz 378

Hellgrün bis schwärzlichgrün ohne Ueberzug; färbt die Flamme grün und giebt ein Kupferkorn

Salzkupfererz 290

692. Gelb, gelblich oder röthlichgelb . . . 693

Grau, gelblich- oder bräunlichgrau, braun, gelblich- oder rothbraun, fleischroth, schwarz 696

693. Orangegelbe Warzen, auf der Oberfläche rauh und krystallinisch; Gewicht wenigstens 6; schmilzt mit Arsengeruch . . . Buntbleierz 198

Schwefelgelbe, kugel- und traubenförmige Parthien mit faseriger Zusammensetzung; giebt auf Kohle starken Selengeruch und Bleikörner:

Selenigsaures Bleioxyd.


Nach einer Richtung deutlich spaltbar; Bruch uneben; H. 3—4; Fett- bis Glasglanz; St. weiss.

Auf einem Gange in Glasbachgrunde bei Gabel in Thüringen.

- Gewicht nicht über 3,5; giebt auf Kohle weder Arsen- noch Selengeruch 694
694. Isabellgelb; Warzen ausstrahlend faserig, mit verschieden gefärbtem Innern . . . **Natrolith** 282
- Schwefel- oder röthlichgelb; Warzen nicht faserig 695
695. Schwefel- oder weisslichgelb; milde; brennt mit Schwefelgeruch **Schwefel** 255
- Röthlichgelb bis schmutzigrosenroth; klein nierenförmig von krummschaliger Zusammensetzung; Bruch dicht; unschmelzbar, reagirt auf Zink:

Voltzin.

V o l z i t.



Schwach kantendurchscheinend; Glasglanz in den Fettglanz geneigt; H. 4; G. 3,6; im Kolben sehr stark decrepitirend. Im Quarz bei Pontgibaud.

696. Grau, gelblich- oder bräunlichgrau, gelblich-braun, bräunlichgelb oder braun 701
- Braunroth oder schwarz 697
697. Fleischroth; mandelförmig und kugelig, mit faseriger Textur:

Cluthalith.



H. 3,5; G. 2,16; verhält sich dem Amalzim ähnlich: In Blasenräumen des Mandelsteines bei Dumbarton in Schottland.

Braunroth; knollig, nierenförmig, tropfsteinartig, schalig, mit faseriger, oft strahliger Textur; Seidenglanz; ziegelrother Strich

Rother Glaskopf 154

Blauschwarz oder schwarz oder Braunschwarz 698

698. Tropfsteinartig oder knollig; braunschwarz,
an der Oberfläche glänzend schwarz; im
Bruch faserig; Strich ochergelb

Brauner Glaskopf 650

Blauschwarz oder schwarz **699**

699. Tropfsteinartig oder knollig; bläulichschwarz;
mit concentrischen Lagen; Strich schwarz

Pyrolusit 246

schwarz **700**

700. Schwarz, färbt an den Fingern ab; giebt in
der Reductionsflamme ein Kupferkorn:

Kupferschwärze.

Nierenförmige, traubige Massen; derb, eingesprengt, angeflo-
gen bis staubartig; Bruch erdig; auch bläulich oder bräunlich-
schwarz; oft mit sammtartigem Scheine; wird an der Luft röth-
lichbraun; St. etwas glänzend; enthält Kupfer, Eisen - und Man-
ganoxyd und Wasser.

Baden, Harz, Sachsen, Schlesien, Tyrol.

Traubig, nierenförmig, tropfsteinartig, kuge-
lig, bisweilen krummschalig; Strich glän-
zend; färbt Borax dunkelblau:

Kobaltmanganerz.

Schwarzer Erdkobalt, Kobaltschwärze, Schwarz-
kobalterz, Hornkobalt, Russkobalt, Kobaltmalm.

Derb, als Ueberzug, eingesprengt, angeflo-
gen; wenig fettglän-
zend bis matt; etwas abfärbend; undurchsichtig; zerreiblich;
H. 1—1,5; G. 2,2; ist wasserhaltig.

Auf Lagern und Gängen: Saalfeld, Kamsdorf, Riechelsdorf,
Siegen.

701. Braun, gelblichbraun oder bräunlichgelb . . . **702**

Grau, gelblichgrau oder bräunlich **709**

702. Warzig mit faseriger, meist strahliger Textur **703**

Warzig, mit dichtem oder erdigem Bruche . . . **706**

703. Gewicht etwa 7; ritzt Glas . . . **Zinnstein 142**

Gewicht höchstens 4 **704**


704. Strich gelb **704a**

Strich grau **705**

Strich bräunlich:

Holzkufererz.

faseriger Olivenit.




Auf Quarz aufgewachsene, kugelige, im Innern excentrisch faserige, seidenglänzende, lichtbräunliche, aussen zu grauem Pulver verwiterte Kugeln; G. 3, 9.

Findet sich in Cornwall.

704. Reagirt auf Eisen **Glaskopf 154**

Reagirt auf Eisen und Arsenik:

Arsenic-Siderit.



Kugelige Massen mit breitstängeliger Textur; Stängel leicht trennbar; Seidenglanz; bräunlichgelb, an der Luft dunkelnd; fast zwischen den Fingern zerreiblich; G. 3,52; leicht schmelzbar:

Auf Schwarzmanganerz bei Romaneche.

705. Auf dem Bruch stark glänzend; giebt auf Kohle gewöhnlich schweflige Säure und eine unschmelzbare Schlacke **Blende 13**


Giebt in der Flamme eine magnetische Schlacke und löst sich in Säuren mit Brausen auf

Spatheisenstein 174

706. Hellbraun; erdig; färbt an den Fingern ab:

Grorolith.

Mangansuperoxydhydrat.



Von Groroi in Frankreich und Cautern in Graubünden. In Salzsäure entwickelt er schon in der Kälte Chlor, und wird von Kleesäure und schwefliger Säure zersetzt.


Im Bruche dicht, sehr glänzend **707**

707. Gewicht mindestens 6 **708**

- Gewicht etwa 3, 3; giebt in der Flamme eine magnetische Schlacke . . . **Cronstedtit** 217
708. Dunkelbraun; giebt auf Kohle eine beim Erkalten krystallisirende Perle . . . **Buntbleierz** 198
- Gelblichbraun; schmilzt mit Aufblähen zu einer schwarzen Schlacke; giebt mit Borax bei starkem Zusatz ein dunkelblaues, bei wenig Zusatz ein smaragdgrünes Email
- Vanadinbleierz** 199
709. Hellgrau; mit mehreren ungleich gefärbten Zonen; Gewicht über 6 710
- Schmutzig-, bräunlich- oder gelblichgrau; Gewicht 3, 5—4, 4 711
710. In Säuren unlöslich **Bleivitriol** 263
- In Säure mit Aufbrausen löslich **Weissbleierz** 263
711. Giebt im Kolben Wasser und wird durch Glühen zum Theil in Wasser löslich . . . **Alunit** 167
- Ist wasserfrei 712
712. Unschmelzbar in der Löthrohrflamme . . . 713
- Schmilzt zu einer schwarzen magnetischen Schlacke **Spatheisenstein** 174
713. Färbt die Löthrohrflamme schön orangegelb
- Schwerspath** 267
- Unschmelzbar und die Flamme nicht färbend
- Blende** 13

Die Mineralien erscheinen als faserige Massen.

715. Sie sind ganz oder theilweise in Wasser löslich 716
- Sie sind darin unlöslich 735
716. Sie lassen einen starken Rückstand **Polyhalit** 226
- Sie sind ohne Rückstand löslich 717
717. Die Lösung ist gefärbt 718
- Die Lösung ist hell und ungefärbt 721
718. Rosenroth:


Kobaltvitriol.

Soll ähnlich wie Eisenvitriol krystallisiren; meist tropfsteinförmig, mit etwas stängeliger Textur; Glas - bis Perlmutterglanz; fleisch- und rosenroth, St. röthlichweiss; halbdurchsichtig bis durchscheinend; Geschmack zusammenziehend.

In alten Grubenbauen zu Biber im Hanauischen.

Schön blau **Kupfervitriol 392**

Bräunlich:

Braunsalz.

Nadelförmige, anscheinend ein- und einaxige Krystalle; nelkenbraun; St. weiss; Glasglanz bis Fettglanz; halbdurchsichtig bis durchscheinend; H. 1,5—2; Geschmack zusammenziehend und metallisch; zerfliesst an der Luft.

Auf Schwefel- und Strahlkies bei Schwarzenberg in Sachsen.

719. Grün **720**

Roth; schmeckt wie Tinte . . . **Botryogen 319**

720. Schmeckt wie Tinte, mit Cyaneisenkalium einen bläulichgrünen oder grünlichweissen Niederschlag gebend . . . **Eisenvitriol 319**

Die Lösung giebt damit einen braunrothen Niederschlag . . . **Uranvitriol 319a**

721. Die Lösung braust beim Zusatz von Säuren **Natron 320a**

Sie braust dadurch nicht auf . . . **722**

722. Chlorbaryum giebt darin einen Niederschlag **723**

Thut es nicht . . . **732**

723. Schmeckt sehr bitter . . . **Bittersalz 228**

Schmeckt salzig, adstringirend oder styptisch **724**

724. Salzig . . . **726**

Adstringirend oder styptisch (süsslich zusammenziehend) . . . **725**

725. Schmeckt styptisch . . . **727**

Zusammenziehend 728

726. Sehr salzig, reagirt nicht auf Talkerde

Glaubersalz 319a

Salzig und bitter zugleich; enthält schwefel-
saure Talkerde und Natron:

Reussin.

Spiessige, stern- und büschelförmig gruppirte Krystalle; flockig; als Anflug; weiss.

Aus Mooren und Sümpfen auswitternd bei Eger in Böhmen.

727. Die Lösung giebt mit Aetzammoniak einen
weissen, gallertartigen Niederschlag, der
sich in einem Ueberschusse des Alkalis
wieder auflöst **Zinkvitriol 227**

Aetzammoniak giebt einen blaugrauen, an der
Luft sich röthenden Niederschlag **Federalaun 63**

728. Die Lösung giebt beim Eindampfen leicht Kry-
stall des regulären Systems . . . **Alaun 63**
Giebt keine Krystalle:

Schwefelsaure Thonerde.

Keramohalit, Davyt, Haarsalz, Federalaun z. T.



Kleine, derbe Massen, nach einer Richtung theilbar; weiss;
durchscheinend; perlmutterglänzend; unschmelzbar.

Farsdorf bei Bonn, Böhmen, Columbien, Milo.

729. Die Lösung riecht bei Zusatz von Aetzkali nach
Ammoniak **Ammoniakalaun 63**

Riecht nicht darnach 730

730. Sie reagirt auf Talkerde . . . **Magnesiaalaun 63**

Sie enthält keine Talkerde 731

731. Sie enthält Kali **Alaun 63**

Sie enthält Natron **Natronalaun 63**


732. Das Salz zerflüchtigt sich auf Kohle **Salmiak 90**

Das Salz schmilzt oder decrepitirt auf Kohle 733

733. Es decrepitirt auf Kohle . . . **Steinsalz** 69
 Es schmilzt auf Kohle . . . 734
 734. Kohlensaures Ammoniak fällt die Auflösung
 weiss:

Kalksalpeter.

Nitrocalcit, Mauersalpeter.



Zarte, haar- und nadelförmige Krystalle, anscheinend sechseckige Säulen; krustiger Ueberzug; flockige Efflorescenz und erdiger Beschlag; weiss oder wasserhell; durchscheinend; weich; Geschmack scharf und bitter; an der Luft zerfliessend; in Wasser leicht löslich.

An Mauern in Kellern; auf dem Erdboden in Afrika, Spanien.

- Giebt keinen Niederschlag . . . **Kalisalpeter** 227
 735. Stängelige oder freifaserige Mineralien mit Metallglanz . . . 736
 Ohne Metallglanz . . . 752
 736. Silber- oder zinnweiss oder kupferroth . . . 737
 Grünlich, stahl-, eisen-, schwarzgrau oder schwarz . . . 739
 737. Silberweiss, oft schwärzlich angelauten oder glänzend zinnweiss . . . 738
 Kupferroth; mehr stängeartig als faserig; oft ästig und an den Enden krystallisiert
Gediegen Kupfer 15
 738. Silberweiss; gebogene, oft netzartige, gestrickte Fäden; lässt sich hämmern **Gediegen Silber** 14
 Zinnweiss; glänzend; lässt sich nicht hämmern; sehr leicht schmelzbar **Wismuthglanz** 238
 739. Sehr feine isolirte, leicht zerreibliche, beim Anblasen sich wohl selbst bewegende Fäden . . . 740
 Stängel- oder nadelförmig, oder feine, aneinander gewachsene, festere Massen bildende Fäden . . . 741
 740. Grünlichgrau; schmilzt auf Kohle zu einer magnetischen Masse:

Haarkies.

Schwefelnickel.

Ni.

Sehr feine haarförmige Krystalle, angeblich Rhomboëder mit der zweiten Säule; messinggelb, ins Speisgelbe und Stahlgraue geneigt; oft grau, blau oder bunt angelaufen; St. glänzend; H. 3, 5; G. 5, 278; in Königswasser auflöslich.

Auf Gängen: Johann-Georgenstadt, Joachimsthal, Przibram, Andreasberg.

Stahlgrau, blaugrau; sehr leicht schmelzbar:

Federerz.

Haarförmiges Antimon.

2 Pb + Sb.

Haarförmige, filzartig verwebte Krystalle, welche auch wohl zunderartige Lappen bilden; färbt die Löthrohrflamme schwach grünlich; wird von Kalilauge nicht gelb gefärbt und unterscheidet sich dadurch von dem ganz ähnlich vorkommenden Grauantimonerz.

Wolfsberg, Neudorf, Andreasberg, Clausthal.

- | | |
|--|-----|
| 741. Mehr weniger feine Nadeln in faserigen, parallelen oder ausstrahlenden Massen | 742 |
| Stängelige Massen | 750 |
| 742. Freie Nadeln | 743 |
| Nadeln zu faserigen, strahligen oder ausstrahlend strahligen Massen verwachsen | 747 |
| 743. Undeutliche Spaltungsflächen | 744 |
| Ohne Spuren von Spaltungsflächen | 745 |
| 744. Am Kerzenlichte schmelzbar; auf Kohle zu verflüchtigen und Antimonrauch | |


Grauantimonerz 239

Vor dem Löthrohre leicht schmelzbar; verflüchtigt sich mit Antimonrauch und giebt nach dem Rösten eine dem Magnete folgende Masse

Eisenantimonerz 427

745. Gelblichgrau; leicht schmelzbar zum Wismuth ähnlichen Korn:

Nadelerz.




Lange, dünne, schilfartige, längsgestreifte, oft geknickte oder gebogene Prismen; auch derb; eingesprengt; bleigrau, schwärzlich, ins Stahlgraue geneigt; St. dunkler, wenig glänzend; H. 2—2,5; G. 6,75.

In Quarz eingewachsen auf den Goldgängen von Beresow.


Sehr ähnlich ist das Wismuthbleierz; es schmilzt indessen zu einem Silberkorn zusammen; findet sich bei Schapbach in Baden.

Auch das Wismuthkupfererz, aus Baden unterscheidet sich äusserlich kaum; es schmilzt mit Soda zu einem Kupferkorne; seine Formel scheint zu sein:



- Unschmelzbar 746
- 746 Strich schwarz; gewöhnlich ganz wasserfrei
- Pyrolusit** 246
- Strich braun; giebt im Kolben etwa 10 p. C.
- Wasser **Manganit** 246
747. Bläulichgrau; oder dunkel bleigrau; schmelzbar 748
- Schwärzlichgrau, unschmelzbar 746
748. Gewicht 4,5—4,6; giebt in offener Röhre geröstet starken weissen Rauch, und verflüchtigt sich ganz; wird von Salpetersäure aufgelöst, schlägt sich aber sofort wieder gelb nieder **Grauantimonerz** 239
- Gewicht 5,3—5,9; lässt beim Rösten einen Rückstand; aus der Lösung in Salpetersäure schlägt Schwefelsäure Bleiweiss nieder 749
- Gewicht 6,3; verflüchtigt sich nicht ganz; reagirt auf Eisen und Kupfer:

Kobellit.




Derb; stängelig; im Bruche strahlig; dunkel bleigrau; lässt sich mit dem Messer ritzen; giebt auf Kohle mit Soda ein halbgeschmeidiges Metallkorn. Häufig bei Hvena in Schweden.

749. Gewicht 5,3; enthält bis 32 p. C. Blei
Bleiantimonerz 244
 Gewicht 3,56; enthält etwa 41 p. C. Blei
Queerantimonerz 245
 Gewicht 5,6—5,9; schwacher Metallglanz; enthält etwa 56 p. C. Blei:

Boulangerit.

Schwefelantimonblei.



Derb; feinkörnig oder stängelig; verworren durch einander oder büschelförmig aus einander laufend; schwärzlich bleigrau; St. sich verdunkelnd; schwacher Metallglanz; in den Seidenglanz geneigt; H. 3.


Oberlahr, Nasafjeld, Nertschinsk, Molières.

Identisch ist vielleicht der krummstängelige, bleigraue bis stahlgraue Plumbostib von Nertschinsk, mit 58,8 p. C. Blei; H. 3,5; G. 6,18.

750. Einzelne oder büschelförmig verwachsene, zwischen Kalkspath angewachsene, rechtwinklige, prismatische Stängel; aussen schwarz, innen hellgrau; giebt auf Kohle weisse Arsenikdämpfe **Gediegen Arsenik** 564
 Bläulichgrau, stahlgrau; längsgestreifte Prismen 751
 751. Der Länge nach spaltbare Stängel; sehr leicht schmelzbar **Grauantimonerz** 239
 Die Prismen unspaltbar, unschmelzbar . . . 746
 752. Stängelig, tafelartig, faserig, gerade oder ausstrahlend, milchweiss oder etwas grünlich oder graulich 753
 Lebhaft gefärbt 797
 753. Die Fasern sind unter einander verwachsen und bilden eine feste faserige Masse . . . 770
 Die Stängel oder Nadeln sind frei 754
 754. Gewicht meist über 4, bisweilen nur 3,4 . . . 755
 Gewicht gewöhnlich unter 3 759
 755. Gewicht über 6; sehr leicht schmelzbar; giebt auf Kohle Blei 756

- Gewicht 3,4—4,5; gar nicht, oder schwer zu gelbem Glase oder weissem Email schmelzbar 758
756. Unregelmässig stängelig; gelblichweiss oder orangegelb; erscheint wie unvollständige Krystalle: die Auflösung in Salpetersäure enthält Chlor **Hornbleierz** 135
- Cannelirte Stängel; Uebergang zum Nadelförmigen; Demantglanz 757
757. Sehr lebhafter Demantglanz; schön weiss, wenigstens auf dem Bruche; löst sich mit Brausen und ohne Rückstand in Salpetersäure **Weissbleierz** 263
- Auf dem Bruche Demantglanz; Oberfläche etwas matter; graulich- oder grünlichweiss; bei der Auflösung in Salpetersäure bleibt ein Rückstand **Kohlenvitriolblei** 326
758. Perlmutterweiss; in Säuren unlöslich; Gewicht 4,4—4,5 **Schwerspath** 267
- Grünlichweisse, unvollkommene, nadelförmige Krystalle; in Säuren mit Aufbrausen löslich; Gewicht 3,6—3,7 . . . **Strontian** 265
- Gelb; breit säulenförmige oder tafelartige Krystalle oder eckige eingewachsene Körner:

Wöhlerit.



In einer Richtung undeutlich spaltbar; Bruch muschelrig; durchsichtig bis kantendurchscheinend; lichte gelb; wein-, honig-, kolophoniumgelb, ins Braune und Graue; St. gelblichweiss; in erwärmter Salzsäure löslich.

In Zirkonsyenit bei Brewig.

759. Korallenförmig, stängelig und fasserig zugleich **Arragonit** 275
- Stängelig oder nadelförmig 760
760. Nadelförmig 761
- Deutlich stängelig 765

761. In Säuren löslich 762
 In Säuren unlöslich **Gyps** 332
 762. Mit Aufbrausen 763
 Ohne Aufbrausen 764
 763. Brennt sich zu Aetzkalk ohne zu zerknistern;
 das Mikroskop zeigt rhomboëdrische Blät-
 terdurchgänge . . . **Kohlensaurer Kalk** 163
 Zerknistert auf Kohle; keine Blätterdurch-
 gänge zu sehen . . . **Arragonit** 275
 764. Leicht schmelzbar **Mesotyp** 282
 Schwer schmelzbar zu blasigem Glase:

Berzelin.


Sehr kleine, weisse, matte, auf dem Bruche glasglänzende, schwach durchscheinende, in Salzsäure zu einer Gallerte auflösliche Krystalle.

Im augitischen Gestein bei Gallero unweit Rom.

- Unschmelzbar **Kieselzinkerz** 272
 765. Die Stängel sind spaltbar 766
 Nicht spaltbar 768
 766. Mehr gegen die Axe geneigte Spaltungsebenen
Kohlensaurer Kalk 163
 Eine einzige, der Axe parallele Spaltungsebene 767
 767. Lebhafter Glasglanz; ritzt Glas; unschmelzbar
Cyanit 395
 Perlmutterglanz; milchweiss; ritzt Glas nicht;
 leicht zu schmelzen **Stilbit** 272
 768. Ritzt leicht Kalkspath; in Säuren unlöslich
Tremolith 381
 Etwas härter wie Kalkspath; in Säuren löslich 769
 769. Durchsichtig oder stark durchscheinend; pa-
 rallel oder ausstrahlend faserig; mit Brau-
 sen in Säuren löslich . . . **Arragonit** 275
 Strahliger Bruch, nach Aussen durchscheinend;
 gegen die Mitte hin milchweiss; ohne Auf-
 brausen löslich **Mesotyp** 353
 770. Bruch geradfaserig 771

- Bruch ausstrahlend faserig 786
 771. Ritzt Glas 772
 Ritzt Glas nicht 774
 772. Vor dem Löthrohre mit Aufwallen zu einem
 durchsichtigen Glase schmelzbar:

Aedelforsit.



Nach einem rhombischen Prisma theilbar; weisslichgrau und weiss; kantendurchscheinend; bildet mit Säuren eine Gallerte; H. 6; G. 2, 6.

Bei Aedelfors in Småland.

- Unschmelzbar 773
 773. Weiss, etwas ins Grauliche . . . **Fibrolith** 395
 Weiss, gelblich; platte, krystallinische Fasern
Bucholzit 395
 774. Gewicht wenigstens 6 775
 Gewicht gering, höchstens 4, 4 776
 775. Mit Brausen und ohne Rückstand in Salpeter-
 säure löslich **Weissbleierz** 263
 Bis auf einen Rückstand von schwefelsaurem
 Blei auflöslich **Kohlenvitriolblei** 326
 776. In Säuren löslich 777
 Unlöslich darin 783
 777. Mit Aufbrausen löslich 763
 Ohne Aufbrausen 778
 778. Leicht schmelzbar 779
 Unschmelzbar oder nur zu fritten 781
 779. Mit Aufblähen schmelzbar 780
 Ohne Aufblähen aber mit Krümmen schmelz-
 bar **Skolezit** 353
 780. Verliert im Kolben 9—10 p. C. Wasser **Mesotyp** 282
 Verliert im Kolben bis 25 p. C. Wasser
Hydroborazit 538
 781. Behält in der Flamme die faserige Textur;
 wird glänzend und verliert etwa 25 p. C,

Wasser im Kolben; mit Serpentin vor-
kommend **Nemalit 212**

Decrepitirt oder zerfällt zu einer erdigen Masse **782**


782. Decrepitirt; Aetzammoniak bewirkt in der Auf-
lösung in Salpetersäure einen weissen Nie-
derschlag, welcher sich aber in einem Ueber-
schusse des Alkali wieder auflöst

Kieselzinkerz 272

Zerfällt in der Flamme zu Staub; Aetzammo-
niak löst den weissen Niederschlag nicht
wieder auf:

Okenit.

D y s k l a s i t.



Weiss, gelblich - und bläulichweiss; durchsichtig bis kanten-
durchscheinend; derbe, schmalstängelige Massen; H. 5; G. 2, 28.
Auf Disko, Island und Faröe, in Mandelsteinen.

Verknistert in der Flamme; wird hart und
spaltet sich:

Marmolith.

Derb und theilbar $\ddagger$ (a:∞ b:∞ c); und (a:∞ b:c); stänge-
lige Textur; etwas dick und gebogen; zuweilen gebogen schalig;
Bruch uneben; blassgrün, gelb, ins Graue geneigt; schwach durch-
scheinend bis kantendurchscheinend; Perlmutterglanz, in den Fett-
glanz geneigt; H. 2, 5—3; G. 2, 47.

Ist ähnlich wie Serpentin zusammengesetzt und findet sich
darin bei Baltimore.

783. Lebhafter Perlmutterglanz; Gewicht 3, 6—4, 4; —
schmilzt zu einem weissen, zerfallenden
Email **784**

Seidenglanz; Gewicht selten bis 3; schmilzt
leicht zu einem durchsichtigen Glase . . . **785**

784. Lebhafter Perlmutterglanz; die Fasern liegen
unregelmässig; färbt die Flamme orangegelb

Schwerspath 267

Fast Glasglanz; dichter faseriger Bruch; färbt die Flamme purpurroth . . . **Cölestin 267**
785. Die Fasern lassen sich von einander ablösen und sind biegsam:

Asbest.


Weiss, grau, grün, gelb, braun; durchscheinend bis kantendurchscheinend; perlmutter- und seidenglänzend oder schimmernd; H. 1—4; G. 2, 5—2, 9; bald leicht, bald schwer schmelzbar; gehört der Zusammensetzung nach zur Hornblende, zum Augit und zum Schillerspath.

Man unterscheidet den weichen, biegsamen *Amianth* (Bergflachs); den wenig biegsamen, fester verwachsenen *Asbest*; den holzbraunen, fest verwachsenen, krummfaserigen *Holz-asbest*, und den aus sehr feinen, verfilzten Fasern gebildeten, auf Wasser schwimmenden *Bergkork* (Bergleder).

Findet sich im Gneus und Glimmerschiefer der Alpen.

Derb; die Fasern sind zu breiten Strahlen vereinigt, welche wellenförmige Krümmungen wahrnehmen lassen:

Annatin.



Hell grünlichgrau; schwach perlmutterglänzend; kantendurchscheinend; H. 2—3; G. 2, 9.

Es ist ein asbestartiger Tremolith, und findet sich bei Kuhnsdorf im Voigtlande.

Fäden schwer trennbar, unbiegsam und nicht elastisch; findet sich im Dolomit **Tremolith 381**
786. Fasern wenigstens 2 Linien, bisweilen 2 Zoll lang und krystallinisch . . . **789**
 Faserige Quäste oder kleine verwachsene Warzen; wie Körner mit faserigem Bruch **787**
787. Kleine verwachsene Warzen (nierenförmig); weich, färbt an den Fingern ab **Aluminit 663**
 Kleine seidenglänzende Quäste oder kleine Nieren mit strahlig faserigem Bruche . . **788**

788. Sitzt auf vulkanischem Gestein:

Cotunnit.

Pb Cl.

Nadelförmige Krystalle und kleine halbgeschmolzene Massen; weiss; starker Demantglanz; leicht schmelzbar und die Flamme blau färbend; verflüchtigt sich als weisser Rauch.

Auf Lava am Vesuv.

Sitzt auf Ganggestein und giebt auf Kohle Ar-sengeruch

Pharmakolith 351

789. Ritzt leicht Glas 789^a

Ritzt Glas nicht oder nur schwer und zerbröckelt bei diesem Versuche

790

789^a. Bruch muschelrig **Quarz 220**

Bruch uneben oder splittrig:

Bamlit.

Al² Si³.

Strahlige, grünlich - oder grauweisse, stark durchscheinende Massen; H. über 6; G. 3; unschmelzbar, es kommen auch kleine, plattgedrückte, an den Enden schief abgeschnittene Prismen vor.

Findet sich bei Bamle in Norwegen.

790. Gewicht etwa 4,2; grosse graublaue Nieren mit muschelrigem und zugleich faserigem Bruche

Witherit 264

Gewicht kaum 3 791

791. Fasern mindestens 4 Linien lang; erscheinen wie langgezogene, vom Centrum ausstrahlende Krystalle

792

Feine, meist undeutliche Fasern mit Seidenglanz

796

792. Fasern mit deutlichen und glänzenden Spaltungsebenen parallel der Längsaxe

792

Keine deutliche Spaltungsrichtungen 793

792^a. Wird vom Nagel geritzt **Gyps 332**

Wird vom Nagel nicht geritzt; starker Thongeruch:

Osmelith.

Derb, mit büschel- und sternförmig aus einander laufender faseriger Textur; graulichweiss ins Gelblich- und Rauchgrau; an der Luft haarbraun anlaufend; schwacher Glas- oder Perlmutterglanz; durchscheinend; etwas fettig anzufühlen.

Im Diorit zu Niederkirchen in Rheinbaiern.

793. Fasern etwas durchsichtig oder doch am äussern Ende stark durchscheinend; Glasglanz

Mesotyp 282, 353

Fasern seidenglänzend oder mit Perlmutterglanz **794**

794. Seidenglanz; ritzt leicht Kalkspath; zu einem durchsichtigen Glase schmelzbar; mit Dolomit verwachsen

Tremolith 381

Perlmutterglanz; Bruch etwas muschelig; ritzt Kalkspath nicht; in Säuren löslich; zu einem weissen Email schmelzbar


795

795. Platte Fasern machen den perlmutterglänzenden Bruch etwas muschelig, schmilzt mit Aufblähen zu einem undurchsichtigen Email

Stilbit 272

Fasern sehr fein; Bruch matt, wenig glänzend; etwas schwierig schmelzbar zu einem farblosen, blasigen Glase:

Brevicit.



Schmutzig grauroth; mit breitem dunkelrothen Streifen eingefasst; bildet eine weisse strahlig-blättrige Masse in Blasenräumen eines trachytischen Gesteins.

Bei Brewig in Norwegen.

Fasern sehr dünn bis verschwindend; geringer Perlmutterglanz; leicht und unter lebhafter Phosphoreszenz schmelzbar:


Metaxit.

Grünlichweiss; St. glänzender; kantendurchscheinend; wenig spröde; H. 2—2,5; G. 2,5; schmilzt zu einem röthlichen, etwas trüben Glase.

Ist asbestartig und findet sich auf körnigem Kalke bei Schwarzenberg in Sachsen.

796 Giebt im Kolben kein Wasser:

Raphilit.




Harte, nadelförmige Krystalle; büschelförmig oder halbkugelig gruppirt, oder zu auseinanderlaufenden dünnstängeligen Parthien verwachsen; weiss, ins Bläulichgrüne geneigt; perlmutterartiger Glasglanz; dünne Krystalle, etwas biegsam; H. 4; G. 2,85.

Bei Perth in Ober Canada.

Giebt im Kolben 8—9 p. C. Wasser:

Pektolith.



Derb, kugelig, mit büschelförmig stängeliger, blättriger Textur; theilbar nach zwei stumpfwinkligen Richtungen; Perlmutterglanz, graulichweiss; fast undurchsichtig; H. 5; G. 2,7; die glänzenden Theile schmelzen zu durchscheinendem Email; in Säuren löslich mit Rückstand von Kieselsäure.

Mit Mesotyp am Monte Baldo und am Monzoniberge.

797. Roth, rosenroth, braunroth oder braun . . . 798

Grau, gelblichgrün, gelb, blau, grün oder schwarz . . . 818

798. Rosenroth ins Violette oder violett . . . 799

Roth, braunroth oder braun . . . 803

799. Ritzt Glas . . . 800

Ritzt Glas nicht . . . 801

800. Paralle oder ausstrahende, isolirte, stängelförmige, oft in undeutliche Rhomboëder endende Krystalle; schmelzbar; oft auf körnigen Kalk angewachsen , , , **Turmalin 177.**

Faserige, verwachsene, violette, etwas perl-
mutterglänzende, nicht schmelzbare Masse

Quarz 220

801. Dichte, faserige, mit Brausen in Säuren auf-
lösliche Masse **Manganspath 171**

Längliche Krystalle oder kleine Nadeln in sei-
denglänzenden Warzen oder Quästen mit
strahlig faseriger Textur; ohne Aufbrausen
löslich; auf Kohle Arsengeruch **802**

802. Hell rosenroth ins Weisse **Pikropharmakolith 682**
Pfirsichblüthroth **Kobaltblüthe 359**

803. Roth oder braunroth **804**
Braun **808**

804. Lebhaft cochenilleroth; sehr fein und seiden-
glänzendfaserig **805**

Braunroth; stängelige, nadelförmige, nieren-
förmige oder tropfsteinartige Massen mit
ausstrahlend faseriger Textur **806**

Fleischroth bis ziegelroth; schwach glasglän-
zend:

Blödit.

Mg; Mn; Na; Fe; S; H.

Derb mit dünnstängeliger Structur; Bruch uneben oder split-
terig; durchscheinend bis undurchsichtig; weich.

Dunkelbraunroth; undeutlich ausgebildete Pris-
men, oder derb mit undeutlich stängeliger
Textur:

Mosandrit.

In einer Richtung deutlich spaltbar; St. graubraun; Glas- bis
Fettglanz; in dünnen Splittern durchscheinend; giebt im Kolben
viel Wasser; schmilzt leicht zu braungrüner Perle und ist kiesel-
und titansaures Cer- und Lanthanoxyd.

Im Syenit bei Lammanskäret in Norwegen.

805. Wird in der Flamme schwarz und giebt ein
Kupferkorn **Rothkupfererz 15**

- In der Flamme unveränderlich . . . **Rutil** 142
- 806** Dunkel braunroth in knollig warzigen Massen
mit strahlig faserigem, seidenglänzenden
Bruch; Strich roth . . . **Rother Glaskopf** 154
- Gerade oder strahlige nadelförmige Büschel;
einzelne sich durchkreuzende Nadeln . . . **807**
- 807.** Braunrothe, zwischen den Fingern zerreib-
liche, braunrothe, nadelförmige Büschel;
am Kerzenlichte schmelzbar **Rothantimonerz** 359
- Einzelne oder unregelmässig gruppirte, bis-
weilen in Bergkrystall eingewachsene, un-
schmelzbare Nadeln . . . **Rutil** 142
- Dunkelhyacinthroth, färbt die äussere Farbe
bläulichgrün:


Beraunit.

Strahlige Parthien, theils unter einander, theils büschelförmig
aus einander laufend; nach zwei rechtwinkligen Richtungen un-
gleich spaltbar; in dünnen Blättchen halbdurchsichtig; Glasglanz
und Perlmutterglanz; St. ochergelb ins Röthlichbraune; H. 2, 5;
G. 2, 8; schmelzbar; ist phosphorsaures Eisenoxydhydrat.

Auf Brauneisenstein bei Hrbeck in Böhmen.

- 808.** Nadelförmige Krystalle, stab- oder warzenför-
mige oder tropfsteinartige Massen mit strah-
lig faseriger Textur . . . **810**
- Haarförmig und seidenglänzend . . . **809**
- Zeigt nur Spuren von Faserstructur:

Kaliphit.



Dunkelbraun; zerreiblich und undurchsichtig; St. röthlichbraun;
G. 2, 8.

Findet sich in Ungarn.

- 809.** In Lava eingewachsen; zu schwarzer magne-
tischer Schlacke schmelzbar:


Breislakit.

Röthlichbraun oder kastanienbraun; schwach metallglänzend; durchscheinend; einzeln oder in lockerem filzartigen Ueberzuge.

Bei Viterbo, am Capo die Bove und am Vesuv.

Bildet eine dünne, braunfalbe Schicht auf älterem ungeschichteten Gestein; zu grauem Email schmelzbar **Amianth 785**

Braune, etwas grünliche, rechtwinklige, haarförmige Prismen sind asbestartig verwachsen; unvollkommen schmelzbar:

Beuxit.

Schwacher Glasglanz; undurchsichtig; H. 4—4,5; G. 3. Ist auf einer Grube bei Redruth gefunden.

Bildet auf Glaskopf kleine, seidenglänzende Quäste und giebt einen gelblichen Strich

Nadeleisenerz 305

810. Nieren oder Stalaktiten mit strahlig faserigem Bruch **811**

Einzelne oder unregelmässig gruppirte Nadeln; nadelförmige oder stängelige Massen mit dichter faseriger Textur **813**

811. Nieren, Warzen oder Stalaktiten mit seidenglänzendem oder mattem Bruch **812**

Nieren mit faserigem und zugleich etwas blättrigem Bruche; Fasern etwas metallisch glänzend; Strich grau **Blende 13**

812. Giebt einen gelben Strich **Brauner Glaskopf 650**
Giebt einen grauen Strich **Blende 13**

813. Wird von einer Stahlspitze leicht geritzt . . . **814**
Ritzt Glas **816**

814. Dichte, faserige Masse **815**
Walzenförmige, seitlich verwachsene oder sich durchkreuzende Krystalle; nadelförmige, aus

unregelmässigen Warzen bestehende Masse;
leicht schmelzbar; Gewicht etwa 7

Buntbleierz 198

815. Grobe Fasern, zum Theil abzulösen; Holztextur; Gewicht sehr gering; brennt im Feuer

Lignit:

Braunkohle.

L i g n i t.

Dicht; erdig; filzartig verschlungen und verwebt; deutliche Holzstruktur; Bruch muschelrig, eben oder erdig; pechschwarz bis gelblichbraun; St. bräunlichschwarz; undurchsichtig; H. 1—2, 5; G. 1, 2—1, 3; verbrennt mit brenzlichem Geruch; in Aetzkalklauge grösstentheils löslich; die Lösung von Salzsäure braun gefällt.

Man unterscheidet die flachmuschelrig, wenig glänzende bis glänzende, an der Luft Queerrisse erhaltende Gemeine Braunkohle, (Gagat, Pechkohle z. Th.); die mit deutlicher Holzstruktur versehene, wenig glänzende holzartige Braunkohle, (bituminöses Holz, Surturbrand); die elastische, biegsame, holzbraune, faserige, bastartige Bastkohle; die im Bruch muschelrig, fettglänzende, nadelförmige, elastisch biegsame Nadelkohle; die derbe und in Platten, ohne Holztextur vorkommende, oft zerborstene Moorkohle, die aus papierdünnen Schichten bestehende Papierkohle, (Blattkohle); die etwas abfärbende, im Bruch erdige, oft zerreibliche erdige Braunkohle, (kölnische Umbra); und die im Strich fettglänzende, beim Erhitzen schweflige Säure entwickelnde, im Bruch erdige Alaunerde.

Ist in den jüngsten Formationen sehr verbreitet.

Gewicht bedeutend; giebt auf Kohle eine magnetische Schlacke; löst sich mit Brausen in

Säuren **Spatheisenstein 174**

816. Langgezogene, undeutliche, langnadelförmige, unschmelzbare Krystalle . . . **Sillimanit 367**


Mehr weniger leicht schmelzbar **817**

817. Einzelne oder zu stängeligen Massen verbundene, walzenförmige Krystalle mit dreiseitigem Durchschnitte; schmilzt zu schwarzem blasigen Email, und wird durch Erwärmen electrisch **Turmalin 177**

- Walzenförmige Krystalle zu stängeligen Massen gruppirt, in denen man oft rechte Winkel bemerkt, mit Aufblähen schmelzbar
- Vesuvian** 147
818. Grau oder gelblichgrau 819
 Gelb, blau, grün oder schwarz 825
819. Warzige oder tropfsteinartige Concretionen mit strahlig faserigem Bruch 820
- Einzelne oder gruppirte, walzenförmige Krystalle; nadel- oder stängelförmige Massen mit dicht faseriger Structur 822
820. Giebt im Kolben Wasser **Alunit** 167
 Wasserfrei 821
821. Schwer schmelzbar zu weissem Email; färbt die Flamme orangegelb; Gewicht 4, 4
- Schwerspath** 267
- Unschmelzbar; färbt die Flamme grün; Gewicht 4, 1 **Blende** 13
822. Ritzt Glas 823
 Ritzt Glas nicht 824
823. Stängelige, nicht der Länge nach spaltbare Massen; schmilzt mit Aufwallen . **Zoisit** 379
- Langgezogene, walzenförmige, in Quarz oder Gneus verwachsene, nicht spaltbare und unschmelzbare Krystalle . . . **Sillimanit** 367
824. Im Bruch gerade, faserige, mit Brausen in Säuren lösliche Platten . . **Spatheisenstein** 174
- Die Masse besteht aus etwas decrepitirenden Fasern; in Säuren schwer und ohne Brausen löslich **Commingtonit** 379
825. Gelb oder röthlichgelb 826
 Blau, grün oder schwarz 833
826. Ritzt Glas; undeutliche, an einander gewachsene, gelbe, etwas röthliche, stängelartige Krystalle **Pyknit** 254


Härte 6,5; ochergelb, ins Bräunliche; seiden-
glänzend:

Anthosiderit.



Derb, divergirend - feinfaserig, in dünnen Splittern durch-
scheinend G. 3; schwierig zu schwarzer, metallischer Schlacke
schmelzbar. In Mina Geraes.


- | | |
|---|------------------------|
| Ritzt Glas nicht | 827 |
| 827. Leicht zu trennende, seidenartige, bisweilen
netzförmig verwebte, wegzublasende Fasern | 828 |
| Stängelige oder feinfaserige, fest verwachsene
Masse | 829 |
| 828. Schmutziggelb, schmelzbar, nach Arsen rie-
chend | Buntbleierz 198 |
| Gold - oder braungelb | Rutil 142 |
| 829. Stängelige Masse; schwer; schmelzbar mit
Arsengeruch | Buntbleierz 198 |
| Feine, verwachsene Fasern | 830 |
| 830. Fasern platt; in faserige biegsame Blätter zu
trennen; lebhaft goldgelb; schmilzt und
riecht nach Arsen | Auripigment 300 |
| Auch in faserige Blätter zu trennen; schmilzt
ohne Arsengeruch | 831 |
| 831. Strahlige, zirkelrunde, auf dem Bruch ver-
schieden gefärbte concentrische Lagen zei-
gende Massen | Natrolith 282 |
| Gerade oder divergirende Fasern | 832 |
| 832. Strohgelb ins Wachsgelbe; Bruch seidenglän-
zend; auf Kohle anschwellend, weiss wer-
dend und nach langsamem Schmelzen ein
braunes, undurchsichtiges Glas gebend;
auf dichtem Quarz, oft mit Flussspath: | |

Karpholith.

Selten nadelförmige Krystalle; meist derb; plattenförmig; angefliegen; dünnstängelig; büschel- und sternförmige Textur; perlmutterartiger Glasglanz; halbdurchsichtig bis durchscheinend; H. 5—5,5; G. 2,9.

Im Granit zu Schlackenwalde in Böhmen.


Zart gelb; krystallinische etwas glänzende Nadeln bilden kleine faserige, sammtartige Drusen mit divergirenden Fasern; in Schwefelsäure löslich und dabei flusssaure Dämpfe entwickelnd; sitzt auf Klüften von Brauthoneisenstein;

Kakoxen.

Ochergelb, ins Braune und Zitronengelbe geneigt; St. gelb; metallischer Perlmutterglanz bis matt; undurchsichtig; sehr weich; G. 2,3—3,3; phosphorescirt auf heisser Eisenplatte mit grünlichem Lichte.

Bei St. Benigna und Mauth in Böhmen.

Derb; feinstängelig, faserig, grünlichgelb:

Neurolith.

Kantendurchscheinend H. 4,5; G. 2,47; wird in der Flamme weiss, schmilzt aber nicht; vielleicht ein Zeolith.

Findet sich in Unter-Canada.

833. Blau	834
Grün oder schwarz	840
834. Stängelige Massen oder sehr langgezogene, walzenförmige Krystalle	835
Dichte, feinfaserige Massen	838
Rechtwinklige, aufgewachsene, blass berlinerblaue Säulen:	

Sapparit.

Zwei- und ein-, oder ein- und einaxig; theilbar nach der Säule; weisses Schillern in einer Richtung; starker Glanz; durchscheinend; mit Spinell verwachsen; auf Pegu oder Ceylon.

835. Ritzt Glas 836

Ritzt Glas nicht und wird von einer Stahlspitze geritzt 837

836. Gerade oder ausstrahlend stängelig; hell- und lebhaft indigoblaue Massen; Stängel platt und seitlich spaltbar, unschmelzbar **Cyanit** 395

Langgezogene walzenförmige, im Querschnitt dreiseitige, mehr bläuliche als blaue Krystalle mit anders gefärbten Zwischenräumen; Dichroismus; zu schwarzem Email schmelzbar **Turmalin** 177

Stängelig-körnig; leicht zu einem klaren, blasisen Glase schmelzbar; veilchenblau bis bläulichweiss.


Violan.

Spaltbar nach der Fläche einer wenig geschobenen Säule; Bruch uneben; Glasglanz; kantendurchscheinend bis undurchsichtig; H. 5—6; G. 3, 23.

Bei St. Marcel in Piemont.

837. Dunkelblau; an einander gewachsene, mit dem Nagel zu ritzende, zu schwarzem Email leicht schmelzbare, im Kolben 25—30 p. C. Wasser gebende Krystalle:


Anglarit.



Ist ein Eisenphosphat.

Von Anglar in Frankreich.


Kleine Nadeln oder schalige, krystallinische, sehr dunkelblaue, auf Kohle ein Kupferkorn gebende Masse:

Aphanes.

St. blaugrün; H. 2,5; G. 4,3; wird im Kolben schwarz und giebt Wasser; schmilzt auf Platten und krystallisirt beim Erkalten; entwickelt auf Kohle arsenikalische Dämpfe; in Säuren und Ammoniak löslich.

Kommt in England auf Gängen vor.

Unkrystallisirt; indigblaue Stängel oder grobe Fäden von der Härte des Flussspaths; zu schwarzem Email schmelzbar; giebt im Kolben 5 p. C. Wasser:

Krokydolith.

Bruch erdig; St. lavendelblau; dünne Fasern; durchscheinend; leicht schmelzbar; schwer zu zerreißen und elastisch biegsam H. 4; G. 3,2.

Im Zirkonsyenit zu Stavärn; im Gyps zu Golling; in Grönland und im Caplande.

838. Dicht faserige Massen endigen in parallele Ebenen und zeigen, dass sie Gängen angehören; hellblaue, verschmolzene, grobe Fasern; Gewicht bedeutend; in Säuren unlöslich **Cölestin** 267

Die Fasern sehr fein; äussere Oberfläche oft warzig, daher concretionirt und intensiver blau; in Säuren löslich 839

839. In Säuren mit Aufbrausen löslich **Zinkspath** 162

Ohne Aufbrausen löslich; unschmelzbar

Kieselzinkerz 272

840. Grün 841

Schwarz oder bräunlichschwarz 862

841. Langgezogene isolirte oder seitlich verwachsene Krystalle; gerade oder ausstrahlend stängelige Massen 842

- Nadelförmige Massen mit dichtem, gerade oder ausstrahlend faserigem Bruche 843
 Derbe, lauchgrüne Masse mit faseriger Zusammensetzung; die Fasern sehr lose an einander hängend; H. 1; G. 2, 3.

Prasilit.

Undurchsichtig; giebt im Kolben 18 p. C. Wasser und wird lichtgelb und härter.

Bei Glasgow in Schottland.

842. Ritzt Glas 843
 Wird von einer Stahlspitze geritzt 846
 843. Mit einer oder mehreren deutl. Spaltungsflächen 844
 Ohne deutliche Spaltungsflächen 845
 844. Zwei deutliche Spaltungsebenen nach der Länge der Stängel; dunkel grasgrün; Blättchen durchsichtig **Aktinolith** 381
 Eine gegen die Längsaxe geneigte Spaltungsebene; grünlichweiss; durchscheinend

Diopsid 387

845. Stängelige, pistaziengrüne Masse mit parallelen, walzenförmigen Stängeln, welche bisweilen mit einer glänzenden Fläche enden; mit Schäumen schmelzbar **Epidot** 379
 Langgezogene, oft dreiseitige, freie oder unregelmässig gruppirte Krystalle; schwer zu schwarzem Email schmelzbar; durch Erwärmen electrisch **Turmalin** 177
 846. Schön smaragdgrün, zwischen den Fingern zerreiblich; giebt auf Kohle Rettiggeruch:

Herrerit.


Kohlensaures Tellur.

Hexagonal; derb, nierenförmig, bisweilen mit faseriger Textur; spaltbar nach den Flächen eines Rhomboëders; Glas- bis Perlmutterglanz; durchscheinend; H. 5, 5—6; G. 4, 3; enthält Tellur 56, Nickeloxyd 12, Kohlensäure 32.

Mit Silbererzen bei Albaradon in Mexico.

- Hell oder gelblichgrün; nicht zwischen den
Fingern zerreiblich 847
Grünlichbraun, dunkel olivengrün; unschmelz-
bar; Fettglanz **Bonsdorfit** 215
Grün; nur an den Kanten schmelzbar zu blau-
grünem Glase:

Praseolith.



4-, 6-, 8-, 12seitige, nach einer Richtung spaltbare Prismen mit abgerundeten, wie geflossenen Kanten; Bruch splitterig ins Flachmuschelige; wenig glänzend.

Im Granit bei Brække unweit Brewig.

847. Gelblich- oder grasgrün; längliche, cylindrische Massen mit muscheligem Bruch; Gewicht 7; giebt auf Kohle eine krystallinische, halbmetallische Kugel **Buntbleierz** 198
Meergrüne, stängelige Massen mit groben, im Bruch dicht faserigen Fäden oder ausstahlend faserig; Gewicht 2, 4—3; decrepitirt auf Kohle; ist unschmelzbar und giebt Aetzkalk **Arragonit** 275
848. Hellgrün; durchscheinend oder durchsichtig 849
Dunkelgrün; undurchsichtig oder schwach durchscheinend 857
849. Nadelförmige, verwachsene Krystalle; oder verbundene, aber nicht concentrisch strahlige Fasern oder seidenartige Fäden . . . 852
Auf dem Bruche concentrisch strahlig . . . 850
850. Ritzt Glas; lebhaft hellgrün; leicht schmelzbar; Warzen oder Nieren mit oft kristallinischer Oberfläche **Prehnit** 271
Ritzt Glas nicht; hell meergrün 851
851. Kleine Nieren mit deutlich strahlig faseriger Textur; Fasern krystallinisch; schmelzbar
Wavellit 282

Grössere Nieren mit strahligem, kleinem, oft muscheligem und zugleich faserigem Bruch; decrepitirt auf Kohle; mit Aufbrausen löslich

Arragonit 275

852. Fasern verwachsen und verschmolzen . . . 854

Nicht verschmolzene nadelförmige Krystalle oder Fäden . . . 853

853. Gewicht 7, leicht zu einer rauhen, schwarzen Kugel schmelzbar . . . **Buntbleierz** 198

Gewicht höchstens 3,7; unschmelzbar oder zu hellgrauem Email schmelzbar . . . 855

854. Nadelförmige Krystalle; Gewicht 3,6—3,7; in Säuren mit Aufbrausen löslich . **Strontian** 265

Seidenartige, lose, durch Anblasen biegsame, zu grauem Email schmelzbare Fäden

Amianth 785

855. Fäden straff, seidenglänzend, zu hellgrauem Email schmelzbar . . . **Asbest** 785

Fasern schwer von einander zu trennen; weich anzufühlen; unschmelzbar . . . 856

856. Unschmelzbar und unveränderlich vor dem Löthrohre . . . **Talk** 186

Unschmelzbar, aber den 20fachen Umfang bekommend . . . **Pyrophyllit** 445

857. Smaragdgrün . . . 858

Olivengrün . . . 860

Berg- oder lauchgrün; Strich grünlichweiss

Peponit.

Derbe, stängelige, prismatisch theilbare, durchscheinende oder kantendurchscheinende, stark thonig riechende Massen; H. 2,5—3; G. 2,96; schmilzt zu weisser Fritte.

Gehört wohl zum Asbest; findet sich bei Schwarzenberg.

858. Faserig und seidenglänzend; mit Aufbrausen in Säure löslich . . . **Malachit** 378

Glänzende, fast fein nadelförmige Fasern; ohne Aufbrausen in Säuren löslich . . . 859

859. Fasern strahlig verwachsen; Oberfläche oft krystallinisch und schwarz sammtartig; leicht zu schwarzem Email schmelzbar, welches oft ein Kupferkorn enthält

Phosphatkupfererz 378

Sehr kleine, oft unregelmässig gruppirte, bisweilen aber doch einen strahlig faserigen Bruch hervorbringende, nadelförmige Krystalle; färbt die Flamme stark blau, und giebt ein Kupferkorn . . . **Salzkupfererz 290**

860. Gelblichgrün; schmilzt mit Arsengeruch zu schwarzem, nicht magnetischem Email


Olivenerz 257

Dunkel bouteillengrün, grünlich schwarz . . . **861**

861. Nieren mit deutlich strahlig faseriger Textur; giebt auf Kohle weissen Arsenrauch und nach dem Rösten eine schwarze magnetische Schlacke . . . **Düfrenit 689**

Bürstenförmige Fasern; theilweise und schwer zu einer magnetischen Schlacke schmelzbar; ohne Arsendämpfe zu geben; in Basaltdrusen:

Kirwanit.




Kugelförmig; dunkel olivengrün; H. 2; G. 2,9.

Findet sich an der Nordküste von Irland.

Plattenförmige Massen mit feinfaseriger Zusammensetzung; stark perlmutterartiger Metallglanz:

Chrysotil.

Baltimorit, schillernder Asbest.




Olivengrün, ins Weisse, graulichgrün; brennt sich weiss und rundet sich nur an den feinsten Fasern.

Im Serpentin bei Reichenstein in Schlesien und bei Baltimore.

862. Ritzt Glas 863
 Ritzt Glas nicht 865
- 863 Strahlige Massen, meist mit zwei Spaltungs-
 richtungen der Länge nach, so dass der
 Bruch blättrig erscheint . . **Hornblende** 381
- Stängelige Masse ohne Spaltung; die Stängel
 in Quarz oder Feldspath eingewachsen . 864
864. Stängelige Masse, oder bald isolirte, bald in
 einer Gebirgsart eingewachsene, einzelne
 Stängel mit dreiseitigem Durchschnitte;
 schwer schmelzbar . . . **Turmalin** 177
- Formlose Stängel mit muscheligem Bruch und
 Glasglanz, in blättrigen Feldspath einge-
 wachsen; blähet sich auf und giebt eine
 schwärzliche Kugel in der Flamme; in Säu-
 ren zu einer Gallert auflöslich; die Lösung
 reagirt auf Cerium.

Orthit.



Lange, zu dünnen Büscheln verwachsene Nadeln; auch in
 rundlichen, körnigen, derben Massen; untheilbar; aschgrau ins
 Braune; St. grau ins Braune; undurchsichtig; H. 9; G. 3, 28.

Fahlun, Ytterby, Hitteröen, Stockholm, Linköpnig.

865. Stängelige Masse mit Holzstructur, und mit
 bituminösem und brenzlichem Geruche ver-
 brennend **Lignit** 815
- Prismatische Stängel, ohne bestimmte Form,
 liegen in einem Gemenge von blättrigem
 Feldspath und Quarz; entzündet sich vor
 dem Löthrohre und brennt ohne Flamme
 und Rauch; der Rückstand lässt sich zu
 schwarzem Email schmelzen; löst sich in
 Säure und lässt ein schwarzes Pulver fal-
 len; die Lösung enthält Cerium **Pyroorthit** 309

Die Mineralien sind dichte Massen.

867. Mineralien mit Metallglanz und goldgelb, messinggelb, grünlichgelb, broncefarbig oder kupferroth 868
- Mineralien mit Metallglanz und silberweiss, zinnweiss, hell blaugrau, stahl-, oder eisenschwarz 876
868. Gold-, messing- oder grünlichgelb 869
- Broncefarbig oder kupferroth 872
869. Goldgelb; gewöhnlich in Quarz eingesprengte Blättchen; unter dem Hammer dehnbar
- Gediegen Gold** 16
- Messing- oder grünlichgelb 870
870. Messinggelb; starker Glanz; schlägt Feuer und giebt nach dem Rösten eine schwarze magnetische Schlacke . . . **Schwefelkies** 17
- Etwas heller gefärbt **Binarkies** 233
- Grünlichgelb 871
871. Wenig grünlich; giebt mit Borax in der Reductionsflamme ein grünes, in der Oxydationsflamme ein ziegelrothes Email
- Kupferkies** 107
- Stark grünlich; giebt mit Borax ein weisses Email und oft auf Kohle Arsengeruch
- Zinnkies** 36
872. Kupferroth, bisweilen etwas blass 874
- Röthlichbraun, tombak- oder broncefarbig, bisweilen bunt angelaufen 873
873. Hart, kaum von einer Stahlspitze geritzt; magnetisch **Magnetkies** 188
- Milde, lässt sich mit dem Messer schneiden, oft bunt angelaufen . . . **Buntkupfererz** 37
874. Hämmerbar, dehnbar; auf Kohle ein Kupferkorn **Gediegen Kupfer** 15
- Hart und spröde; giebt auf Kohle weissen Rauch von Arsen, oder Antimon 875

875. Arsengeruch; ist in Salpetersäure ohne Rückstand löslich:

Kupfernicksel.

Rothnickelkies, Nickelkies.

Ni As

Scheint wie Binarkies zu krystallisiren; baumförmig, derb, eingesprengt; undeutlich spaltbar; licht kupferroth, oft schwärzlich angelaufen; H. 5—5,5; G. 7,6; zur spröden, nicht magnetischen, grauweissen Kugel schmelzbar; reagirt bisweilen auch auf Antimon und Kobalt.

Riechelsdorf, Schneeberg, Joachimsthal, Andreasberg, Schladming.

- Giebt Antimongeruch und lässt in Salpetersäure einen Rückstand **Nickelantimonglanz** 28
876. Silber- oder zinnweiss, oder bleigrau . . . 877
 Hell blaugrau, stahl- oder eisengrau . . . 890
877. Matt silberweiss, oder etwas graulich . . . 878
 Zinnweiss oder bleigrau . . . 881
878. Weich; dehnbar; giebt im Kolben Quecksilber
Amalgam 38

Weich, geschmeidig; giebt mit Soda nach langem Rösten ein Kupferkorn, Selengeruch:

Selenkupfer.

Cu² Se.

Giebt in offener Röhre Selen und Selensäure; schmilzt auf Kohle zu einer grauen, etwas geschmeidigen Kugel; findet sich meist baumförmig und angeflogen. Mit Kalkspath auf der Strickergrube in Smaland.

- Hart, schlägt Feuer, ist wenigstens spröde und zerbrechlich . . . 879
879. Matt silberweiss; giebt auf Kohle weissen Arsen- oder Antimonrauch und ein Silberkorn, schlägt kein Feuer . . . 880
- Graulich silberweiss; schlägt Feuer; giebt auf

- Kohle Arsendämpfe und eine magnetische Schlacke **Arsenikkies** 235.
880. Mit Rückstand von weisser Antimonsäure in Salpetersäure löslich . **Antimonialsilber** 189
- Ohne Rückstand löslich; giebt starken Arsen-geruch:

Arseniksilber.

Nierenförmig, kolbig, röhrenförmig, von feinstängeliger und derb von feinkörniger Textur; auch wohl krummschalig; schmutzig silberweiss ins Gelbe; matt; läuft schnell schwarz an. Ist anscheinend ein Gemenge von Arsen und Antimonialsilber.

Auf Gängen bei Andreasberg.

881. Silberweiss 882
- Bleigrau 886
882. Muscheliger Bruch; lebhafter Glanz, etwas Fettglanz **Bournonit** 240
- Bruch eben, bisweilen etwas körnig 883
883. Starker Glanz; am Kerzenlichte schmelzbar ohne Arsengeruch; Neigung zu nadelförmiger Structur **Wismuthglanz** 238^a
- Wenig glänzend; schmilzt mit starkem weissem Arsenikrauch 884
884. Zinnweiss oder graulich; Gewicht etwa 6; reagirt auf Nickel 885
- Gelblich zinnweiss; Gewicht 4, 5; giebt nach langer Röstung mit Borax in der Reductionsflamme ein rothes Email:

Arsenikkupfer:

Röhrenförmig, nierenförmig, kleintraubig, derb; Bruch uneben bis kleinmuscheliger; H. 3, 5; besteht aus Arsenik, Schwefel, Antimon und Kupfer.

Findet sich in Chili.

885. Zinnweiss; mit Rückstand von weisser Antimonsäure in Salpetersäure löslich
- Nickelantimonglanz** 28

Graulichweiss; ohne Rückstand löslich:

Weissnickelkies.

Arseniknickel.

Ni As^2 .

Giebt im Kolben ein Sublimat von metallischem Arsenik und hinterlässt kupferrothes Kupfarnickel.

Findet sich zu Schneeberg, Tanne, Riechelsdorf.

886. Dehnbar, lässt sich mit dem Messer schneiden, oder wird durch Anfeilen glänzend . 887

Spröde und zerbrechlich 889

887. Angelaufene Oberfläche; dehnbar; schmilzt leicht ohne Geruch; giebt auf Kohle gelben Beschlag und ein Bleikorn **Gediegen Blei** 37^a

Oberfläche sehr glänzend; lässt sich nicht hämmern und dehnen; wird durch Anfeilen glänzend und lässt sich mit dem Messer schneiden; schmilzt leicht und giebt Selen- oder Tellurrauch 888

888. Giebt im Kolben ein rothes Sublimat von Selen und auf Kohle ein silberartiges Bleikorn:

Eukairit.

Selenischer Silberkupferglanz.

$\text{Cu}^2 \text{Se} + \text{Ag Se}$,

Derb, mit körnigem Gefüge; bleigrau; St. glänzend; weich. Auf der Strickerumgrube in Smaland.

Giebt im Kolben ein weisses Pulver, welches sich zu hellen Tröpfchen schmelzen lässt; auf Kohle ein Silberkorn:

Tellursilber.

$(\text{Ag Au}) \text{Te}$.

Soll in Rhomboëdern, auch in zwei- und eingliedrigen Krystallen gefunden seyn; gewöhnlich derb; von körniger, ausgezeichnet eckiger Textur; Geschmeidig; H. 2, 5—3; G. 8, 4—8, 5.

Nagy - Ag, Altai, Sibirien.

889. Schlägt Feuer mit deutlichem Arsengeruch;
 färbt Borax blau **Speiskobalt** 28
 Spröde; schlägt aber kein Feuer 889^a
 889^a. Giebt auf Kohle Tellurgeruch:

Tellurblei.

Pb Te.

Nach dem Hexaëder theilbar; derb, körnig; zinnweiss etwas ins Gelbe; H. 3—3,5; G. 8; färbt die Flamme blau; schmilzt im Reductionsfeuer zu einer Kugel, die immer kleiner wird.

Auf der Grube Savodinsky in Altai.

Schwacher Metallglanz; Giebt auf Kohle Antimonrauch:

Embrithit. $3 \text{ Pb} + 2 \text{ Sb}$

Derb und in kugeligen Massen; klein- und feinkörnig; wie bleigrau, schwach metallglänzend; St. etwas glänzender; decrepitiert auf Kohle; H. 2,5; G. 6, 29.

Zu Kalvola in Finnland; gehört vielleicht zum Boulangerit.

Starker Metallglanz; giebt auf Kohle Antimon- oder Arsenrauch:

Grokronit. $\text{Pb} (\text{Sb As}) + 4 \text{ Pb}$

Derb, ohne Theilbarkeit; im Bruche etwas geradeschieferig, sonst splittrigkörnig; hell bleigrau; H. 2—3; G. 5, 8—6, 4; leicht schmelzbar.

In der Salagrube in Sala in Schweden.

Metallisch glänzend; bläulich bleigrau:

Kilbrickenit. $\text{Pb} \text{ Sb} + 5 \text{ Pb}$

Derbe Massen mit blättriger oder erdiger Zusammensetzung; H. 2—2,5; G. 6, 4; in Salzsäure unter Entwicklung von Schwefelwasserstoffgas schwer löslich.

Bei Kilbricken in England.

- Hell bläulichgrau 891
 Stahl- oder eisengrau 899
 891. Sehr milde, wird vom Nagel geritzt und färbt
 oft selbst an den Fingern ab; Gewicht 4,5—5 892
 Härter, etwas spröde; giebt durch eine Stahl-
 spitze einen grauen Strich; Gewicht 6,8—7,8 893
 892. Unschmelzbar; brennt zu gelbem Pulver
 Wasserblei 191
 Schmelzbar am Kerzenlicht Grauantimonerz 239
 893. Giebt auf Kohle Schwefelgeruch und ein Blei-
 korn Bleiglanz 21
 Giebt auf Kohle Selengeruch
 Selenverbindungen 894
 894. Giebt im Kolben Quecksilbertröpfchen
 Selenquecksilberblei 418
 Giebt kein Quecksilber 895
 895. Giebt auf Kohle Bleibeschlag und ein Bleikorn 896
 Keinen Blei- sondern einen weissen Beschlag
 und ein Silberkorn Selensilberzink
 896. Weich wie Blei, färbt Borax schmutzig gelb
 und giebt nach Verflüchtigung des Bleies
 kein Silberkorn Selenblei 34
 Spröder, lässt sich schlecht hämmern . . . 879
 897. Giebt ein grosses Silberkorn auf Kohle:

Selensilberblei.


Selensilber, Selensilberglanz.

(Ag Pb) Se.

Krystallinische, nach dem Würfel theilbare Platten; eisen-
 schwarz; stark metallglänzend; H. 2,5; G. 8.

Bei Tilkerode auf sehr schwächtigen Gangtrümmern.


- Giebt kein Silberkorn 898
 898. Giebt nach langem Rösten dem Borax blaue
 Farbe;

Selenkobaltblei.

Dem Selenblei ganz ähnlich.

Zorge, Clausthal, Tilkerode.

Färbt nach der Röstung Borax in der Reduc-
tionsflamme grün; im Oxydationsfeuer zie-
gelroth:

Selenkupferblei.

Derb; hell bleigrau, oft messinggelb oder blau angelaufen;
geschmeidig; weich; G. 7.

Findet sich mit Selenblei zusammen am Harze und bei Hild-
burghausen.

- | | |
|--|-------------------------------|
| 899. Stahlgrau | 900 |
| Eisenschwarz | 907 |
| 900. Eisengrau mit röthlichem Schein; milde; Strich
cochenilleroth | Rothsilber 924 |
| Strich grau oder schwarz; kein rother Schein | 901 |
| 901. Giebt auf Kohle deutlichen Knoblauchgeruch | 902 |
| Riecht nach Selen oder Schwefel, nicht nach
Arsen | 905 |
| 902. Giebt auf Kohle weissen Rauch und verflüch-
tigt sich ganz | Arsenikspiessglanz 564 |
| Verflüchtigt sich nur zum Theil | 903 |
| 903. Durchs Rösten erhält man eine metallische
Schlacke, welche mit Soda ein Kupferkorn,
mit Borax ein grünes oder ziegelrothes
Email giebt | Fahlerz 14 |
| Giebt mit Soda kein Kupferkorn, mit Borax
ein violettes oder gelbliches, fast farbloses
Glas | 904 |
| 904. Röstet zu einem den Borax violett färbenden
Pulver: | |

Arsenikmangan.

Mn As.

Derb, von körniger und schaliger Zusammensetzung; weiss ins Graue, lebhafter Glanz; hart; G. 5,5; nur in Königswasser auflöslich.

Ist in Sachsen gefunden.

Giebt eine Speise, welche mit Borax zu einem in der Wärme röthlichgelben, kalt fast farblosen Glase schmilzt; Auflösung in Salpetersäure ist grün. **Nickelantimonglanz** 28

905. Auf Kohle. Selengeruch, rothes Sublimat im Kolben:

Selenzink.

Bildet mit Selenquecksilber den zinnoberrothen Biolit von Culebras in Mexico und den Culebrit, ein graues Selenquecksilberzink; beide noch nicht näher bekannt.

Giebt auf Kohle Schwefelgeruch und im Kolben ein gelbes Sublimat. 906

906. Die geröstete Probe färbt Borax blau

Kobaltkies 29

Reagirt nach dem Rösten (Schwarzkupfer) auf

Kupfer und Silber. **Silberkupferglanz** 243^a

907. Färbt an den Fingern ab. 908

Härter, färbt nicht ab. 909

908. Gewicht 1,8—2,4; brennt in der Flamme

Graphit 191

Gewicht 4,5—5; wird in der Flamme roth

Pyrolusit 246

909. Glashart, 5,5—7. 910

Wird leicht von der Stahlspitze geritzt. 918

910. Wird vom Magnet angezogen. 911

Wirkt auf den Magnet nicht merkbar ein. 912

11. Giebt wegen Titangehalt mit Borax ein gelb-


liches Email. **Nigrin** 142

Giebt ein bouteillengrünes Glas

Magneteisenstein 231^a

- 912 Giebt bei Zerstossen ein rothes oder braunes
Pulver 913
Ein schwarzes oder graues Pulver 914
913. Pulver roth **Eisenglanz** 154
Pulver braun **Hausmannit** 109
914 Bläulichschwarz; Bruch eben und dunkel;
schalige Structur wie bei Concretionen:

Manganaluminat.



Ist eine Verbindung der Thonerde mit Mangansuperoxyd.
Bedarf einer näheren Untersuchung und findet sich bei Kalte-
born unweit Siegen.

- Dunkel eisengrau; Bruch etwas körnig . . . 915
915. Vor dem Löthrohre unveränderlich . . . 916
Wird roth und magnetisch 917
916. Gewicht 7, 8 **Tantalit** 247
Gewicht 4, 8—5 **Ilmenit** 153^b
917. Wird magnetisch und giebt mit Borax ein
smaragdgrünes Glas . . . **Chromeisenstein** 27
Wird roth; namentlich beim Zerstossen der
Probe sichtbar; giebt mit Borax ein violet-
tes Glas **Braunit** 109
918 Lässt sich hämmern und mit dem Messer
schneiden; wird durchs Anfeilen glänzend 919
Spröder, aber durch eine Stahlspitze zu
ritzen; wird durchs Feilen nicht glänzend 922
919. Leicht schmelzbar; giebt auf Kohle weissen,
nach Selen oder Tellur riechenden Rauch 920
Am Kerzenlicht schmelzbar; riecht etwas nach
Schwefel 921
920. Giebt im Kolben Selenbeschlag **Selensilberblei** 897
Giebt im Kolben weissen Beschlag **Tellursilber** 888
921. Giebt auf Kohle ein Silberkorn . . . **Glanzerz** 20

- Ein Kupferkorn **Kupferglanz** 243^a
 922. Strich roth 923
 Strich grau oder schwarz 925
 923. Gewicht 5, 2—5, 4; Strich dunkelroth **Miargyrit** 323
 Gewicht 5, 6—6; Strich cochenilleroth
Rothsilber 924
 924. Giebt auf Kohle starken Arsengeruch **Proustite** 155
 Weissen Rauch ohne Arsengeruch
Dunkles Rothgültigerz 155
 925. Bläulicher, dichter Bruch; Glanz halbm metallisch 926
 Bruch etwas körnig; uneben; starker Metall-
 glanz 928
 926. Schwarzer Strich 927
 Brauner Strich; giebt 10 p. C. Wasser im
 Kolben **Manganit** 246
 927. Ritzt Flussspath; die Auflösung giebt mit
 Schwefelsäure einen Niederschlag; Gewicht
 4, 1—4, 2:

Schwarz-manganerz.

Schwarzeisenstein, Psilomelan, Barytmanganerz.

Mn, Mn, Ba, H.

Afterkrystall nach Flussspath, fast stalaktitisch; nieren-, kolben-, röhrenförmig; mit feinstängelförmiger (Leptonemerz), dichter oder krummschaliger (schwarzer Glaskopf) Structur; derb; matt; St. bräunlichschwarz; glänzend; undurchsichtig; H. 5—6; G. 4.

Auf Gängen und Stöcken: Ilmenau, Elgersburg, Annaberg, Schneeberg, Siegen.

- Wird von Flusskalk geritzt; die Auflösung
 giebt mit Schwefelsäure keinen Nieder-
 schlag; Gewicht 4, 8—4, 9 . . . **Pyrolusit** 246
 928. Oberfläche schwarz; Bruch glänzend stahl-
 grau; giebt beim Zerstossen Arsengeruch
 und verflüchtigt sich damit auf Kohle
Gediegen Arsenik 564
 Wird an der Luft nicht schwarz 929

929. Strich schwarz; leicht zerbrechlich **Pyrolusit** 246
 Strich grau; spröde, schwer zerbrechlich . 930
930. Mit weissem Rauch und Arsengeruch schmelzbar 931
 Unschmelzbar; färbt Borax violett
- Manganblende** 29
931. Gewicht 6, 2; mit weissem Rauche und schwachem Arsengeruch zu einem bedeutenden Silberkorn, (wenigstens 60 p. C.), schmelzbar
- Polybasit** 195
- Gewicht 4, 3—4, 4; brennt mit starkem Arsengeruch zu einer magnetischen Schlacke, die mit Soda ein Kupferkorn giebt . **Tennantit** 14
932. Deutlich muscheliger Bruch; schmilzt zu weissem Email und giebt im Kolben Wasser
- Pechstein** 1010
- Bruch muscheliger und zuletzt grobkörnig; zu grauem Email schmelzbar; wasserfrei
- Colophonit** 81
933. Ganz oder theilweise in Wasser löslich . . . 934
 Durchaus unlöslich in Wasser 944
934. Ganz auflöslich 935
 Nur theilweise auflöslich; überzieht sich an der Luft mit einer weissen Schicht . . . 943
935. Blau oder grün gefärbte Salze 936
 Wasserhelle, farblose, oder milchweisse Salze 937
936. Grün **Eisenvitriol** 319
 Blau **Kupfervitriol** 392
937. Bedeckt sich an der Luft mit einer weissen Kruste und efflorescirt 938
 Aendert sich an der Luft kaum 940
938. Ist wasserfrei, ... **Thenardit** 228
 Enthält Wasser 939
939. Die Lösung braust mit Säuren . . **Natron** 320^a
 Braust nicht damit **Glaubersalz** 319^a
940. Im Kolben ganz zu verflüchtigen . **Salmiak** 90
 Deccrepitirt oder schmilzt, verflüchtigt sich aber nicht; verliert das Krystallisationswasser 941

941. Sehr adstringirend; enthält Schwefelsäure **Alaun** 63
 Salziger oder süsslicher Geschmack; enthält
 keine Schwefelsäure 942
942. Salziger Geschmack, enthält Salzsäure **Steinsalz** 69
 Süsslicher Geschmack; aus der concentri-
 schen Auflösung fällt eine andere Säure
 Krystalle von Borsäure. **Borax** 320
943. Durchsichtig, hellgrau, gelblichgrau oder röth-
 lich; enthält schwefelsaures Natron und
 Gyps **Glauberit** 317
 Undurchsichtig, milchweiss, bisweilen etwas
 röthlich; enthält schwefelsaures Kali, schwe-
 felsauren Kalk und schwefelsaure Bittererde
 **Polyhalit** 226
944. Ritzt Glas 945
 Ritzt Glas nicht 1011
945. Sehr porös 954
 Dichte Masse 948
846. Bruch muschelrig 947
 Bruch splittrig; uneben oder körnig 986
947. Glasglanz 948
 Harzglanz 983
 Matt 984
948. Wasserhell, stark durchscheinend, farblos,
 oder sehr schwach grünlich oder gelblich ge-
 färbt; auch durchscheinend und milchweiss 949
 Selten durchsichtig, meist durchscheinend oder
 undurchsichtig und lebhafter gefärbt 955
949. Ritzt Quarz mit Leichtigkeit 950
 So hart oder weicher als Quarz 951
950. Unschmelzbar; Gewicht 3,4—3,5 . . . **Topas** 254
 Schwer und nur an den Kanten schmelzbar;
 Gewicht 2,6—2,7 **Smaragd** 205
951. Wasserhell; Bruch grossmuschelrig; unschmelz-
 bar **Bergkrystall** 220
 Durchsichtig oder durchscheinend, milchweiss 952
952. Durchsichtig, milchweiss oder meergrün; ritzt

- Glas kaum, schmelzbar mit Schäumen
Datolith 329
 Milchweiss, mit oder ohne Widerschein . . . 953
 953. Milchweiss, ohne Widerschein, unschmelzbar
Quarz 220
 Milchweiss, opalisirend, zerbrechlich, giebt
 im Kolben Wasser **Opal** 656
 954. Sehr löcherig, wie zerfressen; zwischen den
 Höhlungen feste Parthien; schmutzig weiss;
 undurchsichtig; unschmelzbar
Mühlsteinquarz 220
 Höhlungen langgezogen, dicht neben einan-
 der; schwammartig; unregelmässig faserig
 und seidenglänzend; grünlich grau; zu weis-
 sem Email schmelzbar:


Bimstein.

Graulich-, gelblichweiss, gelblich aschgrau, schwärzlichbraun;
 kantendurchscheinend; H. 2, 2; schwimmt häufig auf dem Was-
 ser; zerreiblich; giebt ein scharfes Pulver; sehr spröde.

In Lavaströmen und als vulkanische Auswürflinge: Lipari, Is-
 land, Ungarn, Andernach.

Derbe, dichte, löcherige, kugelige, undurch-
 sichtige Massen:

Anchelit.



Grau; ins Weisse, Rothe, Grüne und Braune; schimmernd
 bis matt; G. 3,7; unschmelzbar. Fundort unbekannt.

955. Gelb, gelblich, blau, grün oder grüngrau . . . 956
 Rosa, violett, braun, röthlichbraun, bräun-
 lichroth, rauchgrau oder schwarz . . . 967
 956. Gelb oder gelblich 957
 Blau, grün oder grüngrau 961
 957. Ritzt leicht Quarz 958
 Härte etwa die des Quarzes 959

958. Ritzt den Topas; Gewicht 3,7—3,8; oft opalisirend; unschmelzbar; in Säuren unlöslich

Chrysoberyll 254

Topashärte; Gewicht 3,5—3,6; unschmelzbar; wird durch Erwärmen und Reiben electrisch **Topas 254**

959. Wasserhell; Bruch grossmuschelartig; Quarzhärte; Gewicht 2,65; unschmelzbar

Bergkrystall 220

Undurchsichtig oder kantendurchscheinend; fast Quarzhärte; verändert sich in der Flamme **960**

960. Etwas härter als Quarz (6,5); zu grüngrauem Email schmelzbar; Gewicht 3,8 **Grossular 81**

Etwas weicher als Quarz (5,5); ritzt kaum Glas; wird von einer Stahlspitze geritzt; decrepitirt vor dem Löthrohre; zur Rothglühhitze gebracht, wird es beim Erkalten weiss; schmilzt nicht; Gewicht 5,4—5,8

Yttrotantalit 119

961. Blau, wasserhell oder durchscheinend; schwer schmelzbar **Dichroit 285**

Grün, bräunlich - oder grünlichgrau **962**

962. Bräunlichgrau; bisweilen etwas gelblich - oder grünlichgrau **963**

Grün **964**

963. Grünlichgrau; leicht schmelzbar; giebt eine magnetische Schlacke:

Erlan.

Derb, unvollkommen krystallinisch, gewöhnlich dicht; Bruch splittrig, ins Ebene; grünlichgrau ins Weisse; undurchsichtig; schimmernd bis matt; H. 5—6; G. 3.

Bei Erla und Schwarzenberg im sächsischen Erzgebirge.

Bräunlichgrau, bisweilen gelblich; unschmelzbar; schwer

Zinnstein 142

964. Hellgrün, seltener smaragdgrün; gewöhnlich wasserhell 965
 Dunkelgrün, bouteillengrün; undurchsichtig oder durchscheinend 966
965. In kleinen smaragdgrünen Stücken oder in grossen hellgrünen Massen; ritzt leicht den Quarz (7, 5); Gewicht 2, 6—2, 7 **Smaragd** 205
 In kleinen Stücken hellgrün; ritzt leicht Quarz (7); Gewicht 3, 4—3, 6 . . . **Chrysolith** 292
966. Deutlich krystallinisch; dunkelgrüne krystallstücke; ritzt leicht Quarz (8); Gewicht 3, 4—3, 6; im Feuer unveränderlich **Ceylanit** 60
 Bruch grossmuscheliger; Ansehen geschmolzener Massen; ritzt selten Glas; zu weissem Email schmelzbar; Gewicht 2, 2—2, 5 :


Obsidian.

Dicht, derb, in runden Körnern (Marekanit) oder platten Stücken (Pseudochrysolith); rauchgrau, nelkenbraun, pistaziengrün, schwarz; bisweilen mit bläulichem oder metallartig glänzendem Schillern; durchsichtig bis kantendurchscheinend; Glasglanz; H. 6—7; G. 2, 3—2, 4.

Bildet vulkanische Gebirgsmassen: Island, Ungarn, Böhmen, Mexico, Kamtschatka; nur eine Abart scheint der Flurlith von Island zu sein.

967. Rosa oder violett 968
 Braun, rothbraun, braunroth, rauchgrau oder schwarz 969
968. Hell rosenroth, wasserhell; grossmuscheliger, milchweisser Bruch; grosse Stücke **Rosenquarz** 220
 Violett; wasserhell; deutlich muscheliger, bisweilen netzförmig gestreifter Bruch **Amethyst** 220
959. Braunroth, braun oder rothbraun 970
 Rauchgrau oder schwarz 975
970. Ritzt kaum Glas und wird von einer Stahlspitze geritzt 971
 Ritzt leicht Glas 972

- 971.** Zimmtbraun; undurchsichtig; Gewicht 5, 5—5, 6; decrepitirt in der Flamme und wird gelb darin **Yttrotantalit** 119
 Hellbraunroth, stark durchscheinend; Gewicht 4, 1; wird in der Flamme undurchsichtig **Willemit** 167
- 972.** Gewicht 6, 6—6, 7 **Zinnstein** 142
 Gewicht 3, 2—4, 1 974
- 973.** Schmelzbar 974
 Unschmelzbar **Staurolith** 304
- 974.** Röthlichbraun; leicht zu schwarzem Email schmelzbar; Gewicht 3, 6 . . . **Almandin** 81
 Zu magnetischer Schlacke schmelzbar; Gewicht 4, 1; Bildet Nieren in Mandelsteinen **Gökumit** 147
- 975.** Glasige oder dichte Massen mit grossmuscheligen Bruch 976
 Dunkelschwarz; undurchsichtig; meist kleinere Stücke in älteren Gesteinen 979
- 976.** Glasig, wasserhell bis stark kantendurchscheinend 977
 Undurchsichtig 978
- 977.** Wasserhell oder stark durchscheinend; rauchfarbig; unschmelzbar **Rauchquarz** 220
 Kantendurchscheinend; glasartig; zu weissem Email schmelzbar **Obsidian** 932
 Obsidian ähnlich; Gewicht 2, 9; schmilzt zu magnetischer Schlacke; in Säure schwierig und unvollkommen löslich; färbt in Platindraht die Löthrohrflamme; wirkt auf die Magnetnadel:

Isophr.

Derb, eingesprengt; starker Glasglanz; grünlich- und sammtschwarz; oft roth punctirt; Strich hell grünlich grau, leberbraun; kantendurchscheinend oder undurchsichtig; H. 5, 5—6.

Im Granit bei St. Just in Cornwall.



978. Unschmelzbar **Lydischer Quarz 220**

Zu schwarzem Email schmelzbar; im Kolben

Wasser gebend **978^a**

978^a. Gewicht 2,5; schwärzlich:

Sordawalit.



Nieren-, rinden- und plattenförmige Gestalten; derb; Glasglanz in unvollkommenen Metallglanz geneigt; grünlich-, graulich-, bräunlichschwarz; St. leberbraun; undurchsichtig; H. 4.

Bodemais, Ryddarhyttan; Sordavala in Finnland.

Gewicht 4,5; sammetschwarz:

Tschewkinit.

Derbe Massen; amorph; Bruch flachmuschelrig; starker Glasglanz; St. dunkelbraun; zeigt beim Erhitzen eine Feuererscheinung, bläht sich sehr auf und schmilzt zu einer schwarzen Kugel; in Salzsäure löslich.

Im Ilmengebirge bei Minsk.

979. Ritzt leicht Quarz; unschmelzbar und in Säuren unlöslich **Pleonast 60**

Ritzt Quarz nicht; schmelzbar oder doch durch die Flamme verändert; in Säuren löslich . **980**

980. Gewicht 5,5; ritzt kaum Glas; decrepitirt in der Flamme und wird gelb ohne zu schmelzen **Yttrotantalit 119**

Gewicht 2,5—4,2; ritzt leicht Quarz; schmelzbar **981**

981. Kleine, langgezogene, fast stängelförmige, mit Aufblähen schmelzbare Massen: Gewicht 3,2; giebt 6—8 p. C. Wasser im Kolben **Orthit 864**

Giebt im Kolben kein oder sehr wenig Wasser **982**

982. Gewicht 4,2; schmelzbar, bisweilen mit Aufblähen zu einem dunkelgrünen, undurch-

sichtigen Glase; wird von Säuren angegriffen; die Auflösung giebt mit überschüssigem Aetzkali einen Niederschlag, der sich in kohlensauren Ammoniak theilweise wieder auflöst

Gadolinit 383

Gewicht **3,7**; schwer zu brauner Schlacke schmelzbar

Allanit 400

In Basalt und Wacke eingewachsene Kugeln oder Knollen; Gewicht **2,5**:

Tachylit.

Bruch muscheligen bis uneben; sammtschwarz oder bräunlich-schwarz; Strich dunkel aschgrau; undurchsichtig; schmilzt zu einem undurchsichtigen Glase; in Salzsäure löslich.

In Basalt bei Göttingen; ähnlich ist der Glaukophan von Syra.

Nierenförmig und derb mit kleinmuscheligen Bruch; Gewicht **3,4**; ist nur an den Kanten schmelzbar und bildet dabei blumenkohlartige Verzweigungen:

Uralorthit.

Bräunlichschwarz; St. grünlichgrau, etwas kantendurchscheinend; H. 6; ist dem Orthit von Finbo ähnlich; enthält aber statt Yttererde, Talkerde, und nur 2 p. C. Wasser.

In fleischrothem Feldspath bei Minsk.

983. Schmelzbar 932

Unschmelzbar; derb, bisweilen schalig; dicht:

Pechstein.

Al, Na, Si, H.

Lauch-, olivengrün, rauchgrau, ochergelb, bräunlichroth, leberbraun, graulichschwarz; durchscheinend bis kantendurchscheinend; fettglänzend; H. 5—6; G. 2,2.

Bildet vulkanische Gebirgsmasse: Meissen, Tokay, Arran, Fugarran.

984. Bruch grossmuscheligen, scharfkantig; schmutzig-

- weiss, rauchgrau oder schwarz; kanten-
durchscheinend 985
- Bruch undeutlich muschelig; dunkelschwarz,
matt; undurchsichtig; unschmelzbar
- Lydischer Stein 220**
985. Bruch sehr scharfkantig; rauchgrau oder
schwarz; schlägt sehr leicht Feuer **Feuerstein 220**
- Bruch etwas kegelförmig; schmutzigweiss oder
graulichweiss, etwas körnige Textur
- Grès lustré**
986. Bruch splittrig 987
- Bruch körnig, uneben oder eben 1002
987. Bruch deutlich- und grosssplittrig 988
- Bruch feinsplittrig bis uneben 993
988. Schmelzbar 989
- Unschmelzbar 991
989. Bruch schiefrig und splittrig zugleich, oft ge-
fleckte Masse; in Säuren theilweise löslich:

Phonolith.


Säulenförmig oder plattenförmig, seltener dünn- und eben-
schiefrig, grau; es ist ein mit Mesotyp innig gemengter, dichter
Feldspath; bildet Gebirgsmassen.

Mittelgebirge, Rhöngebirge, Bodensee, Euganeen.

Lauch- und grasgrün; ins Graue und Weisse
geneigt; Bruch sehr splittrig, im Grossen
oft schiefrig:

Nephrit.

A m a z o n e n s t e i n .



Derb, schimmernd bis matt; St. weiss, etwas glänzend;
durchsichtig bis kantendurchscheinend; H. 7, G. 2, 9—3, 5; brennt
sich weiss und schmilzt dann zu einer grauen Masse.

China, Indien, Amazonenstrom.

Nicht schiefrig 990

990. Verschieden gefärbt; schwer schmelzbar

Feldstein 330

Hell gelbgrau, gross- und kleinsplittrig zugleich; matt bis fettglänzend; kantendurchscheinend:

Saussurit.

L e m a n i t.

Spaltbar in zwei sich unter 124° schneidenden Richtungen; derb; körnig; weiss, ins Grünliche und Graue, berggrün; kantendurchscheinend; spröde und schwer zersprengbar; H. 5, 5; G. 3, 2 — 3, 3.

Als Gemengtheil des Gabbro in Schlesien, Baiern, Alpen.

991. Ritzt leicht Quarz; hellgrau rosenroth; Oberfläche meist von Glimmer bedeckt

Andalusit 297


Ritzt Quarz nicht **992**

992. Stark durchscheinend, wolkig, wie wellenförmig; concretionirt **Achat 220**

Kantendurchscheinend, weder wolkig noch wellenförmig **Hornstein 220**

Durchscheinend, licht grünlichblau; brennt sich weiss:

Ontownit.



Derb; Spuren von Theilbarkeit; Glasglanz, H. 6; G. 2, 8.

993. Ritzt leicht Quarz **994**

Ritzt Quarz nicht oder nur schwierig **995**

994. Durchsichtig oder stark durchscheinend; hellgrün **Smaragd 205**

Undurchsichtig; Splitter-durchscheinend; hell rosenroth oder grauröthlich; vom Glimmer bedeckt **Andalusit 297**


995. Fett- und Oelglanz **1001**

Glanz lebhaft, aber weder fettig noch ölig . **996**

996. Gewicht 4,9—5; violettrosa mit Grau gemengt;
ritzt kaum Glas; enthält 8—9 p. C. Wasser:

Ceririt.

C e r i n s t e i n.



Soll in niedrigen sechsseitigen Prismen vorkommen; gewöhnlich derb; nelkenbraun und kirschroth bis perlgrau; St. weiss; kantendurchscheinend; Demantglanz; H. 5, 5; G. 4, 9; in Salzsäure löslich.

Auf einem Lager bei Ryddarhyttan.


Gewicht höchstens 4,2 **997**

997. Schwarz, leicht zu schwarzem Email schmelzbar; schwer zu zerschlagen . . . **Hornfels**

Röthlichbraun oder grün **998**

Schneeweiss, kantendurchscheinend:

Barsowit.



Derb; körnig oder dicht; perlmutterglänzend bis matt; H. 5—6; G. 2,75; an den Kanten zu blasigem Glase schmelzbar.

In Blöcken in den Seifenwerken bei Barsowskoi; hierher scheint der mit Pimelith in Schlesien vorkommende Saccharit zu gehören.

998. Röthlichbraun **999**

Grün **1000**

999. Leicht zu schwarzem Email schmelzbar **Granat 81**

Unschmelzbar **Staurolith 304**

1000. Dunkel bouteillengrün; deutlich splittriger

Bruch; zu schwarzem Email schmelzbar;

sehr fest, ritzt aber Glas kaum **Lherzonit 387**


Hell- oder gelblichgrün; Bruch splittrig ins

Unebene; zu dunkelgrauem, fast schwarzen,

leicht Glas ritzenden Email schmelzbar

Grossular 81

- | | | | |
|--------------|--|-----------------------|--------------|
| 1001. | Gewöhnlich etwas blättrige Structur; zu weissem, schwach gefärbten Email schmelzbar; ritzt leicht Glas (5, 5) | Skapolith | 124 |
| | Schwer an den Kanten zu weissem Email schmelzbar; färbt die Flamme schön purpurroth | Petalit | 545 |
| 1002. | Körnig | | 1003 |
| | Uneben, (rauh) oder eben | | 1005 |
| 1003. | Ritzt leicht Quarz; etwas glimmeriges, bald röthliches, bald grauliches Gestein | Korund | 160 |
| | Quarzhärte oder etwas geringer | | 1004 |
| 1004. | Grün; körnige, meist in Basalt eingewachsene Masse | Olivin | 292 |
| | Gewöhnlich weiss oder meergrün; zu Körner abgerundete Krystalle in einer porösen Lava; Splintern an den Kanten schmelzbar; in Säuren löslich | Sodalith | 88 |
| | Milchweiss oder etwas graulich | dichter Quarz | 220 |
| 1005. | Ritzt leicht Quarz | Grüner Spinell | 60 |
| | Quarzhärte oder geringer | | 1006 |
| 1006. | Gewicht 4, 9—5; rosaviolett mit Grau; giebt 8—9 p. C. Wasser im Kolben; ritzt kaum Glas | Cererit | 996 |
| | Gewicht 2, 5—3, 5 | | 1007 |
| 1007. | In der Löthrohrflamme unveränderlich | | 1008 |
| | Darin schmelzbar oder doch veränderlich | | 1010 |
| 1008. | Milch-, grau- oder schmutzigweiss | Dichter Quarz | 220 |
| | Roth, röthlich, dunkelgrün, bisweilen gebändert, schwarz oder schwärzlich | | 1009 |
| 1009. | Schwarz oder schwärzlich | | 1009. |
| | Roth, röthlich, dunkelgrün, oft gebändert, ebener Bruch | Jaspis | 220 |
| 1009. | Obne eine Spaltungsebene | Kieselschiefer | 220 |
| | Nach eine Richtung spaltbar: | | |

Polnlith.

Plattenförmig, mit schaliger Zusammensetzung; schwarz; undurchsichtig, glasglänzend; H. 6—6,5; G. 3,2; unschmelzbar.

In Magnet Eisenstein zu Hoboken in New-Jersey.

1010. Dunkelrosa bis kirschroth; mit blauem Vesuvian und Quarz zusammen . . . **Thulit** 379

Rauchgrau, blaugrau bis blau; mit Schäumen schmelzbar; giebt 10 p. C. Wasser im Kolben . . . **Ittnerit** 77

Lauch-, olivengrün, rauchgrau, ochergelb, bräunlichroth, leberbraun, graulichschwarz; schmelzbar:

Pechstein.

Derb; bisweilen schalig; im Bruch uneben; H. 5—6; G. 2,2; durchscheinend bis kantendurchscheinend; fettglänzend; und enthält gewöhnlich Thonerde, Natron, Kieselsäure und Wasser.

Bildet vulkanische Gebirgsmassen und füllt Gänge: Meissen, Tokay, Arran, Euganeen.

1011. Milde, zerreiblich, mit dem Nagel zu ritzen; verhält sich in dieser Beziehung wie die Thone . . . 1012

Härter, ritzt aber Glas nicht . . . 1025

1012. Lebhaft gefärbt . . . 1013

Milchweiss, graulich-, röthlichweiss, hellgrün 1020

1013. Rosenroth, roth oder hyacinthroth . . . 1014

Zeisiggelb oder grün, dunkelbraun schwarz 1016

1014. Cochenilleroth; orange gelber Strich; am Körperstamme Arsengeruch . . . **Realgar** 357

Rosa oder braun hyacinthroth, kein Arsengeruch . . . 1015

1015. Rosenroth; in Adern und Körnern eines dichten, weissen Kalksteins; verliert die Farbe schon in geringer Wärme:

Quinczt.


Leichte flockige Masse; enthält 54 Kieselsäure, 19 Bittererde, 8 Eisenoxyd und 17 Wasser.

Bei Quincy in Frankreich.

Hyacinthroth bis rothbraun; Harzbruch; zu schwarzem Email schmelzbar; reagirt auf Uran:

Gummierz.


Lichtes Uranpacherz.



Derb, eingesprengt, in schmalen Trümmern, selten undeutlich nierenförmig; Bruch klein und flachmuschelartig bis uneben, röthlichgelb bis hyacinthroth; St. etwas heller und matt, undurchsichtig bis wenig durchscheinend; H. 2, 5—3, G. 4.

Mit Uranpacherz zu Johann Georgenstadt.

1016. Zeisiggelb, strohgelb oder grün:

Nontronit.

Nierenförmig, derb, körnig, zerborsten; Bruch uneben; matt; im Strich fettglänzend; undurchsichtig; sehr weich; fettig anzu fühlen, entwickelt in Wasser Luftblasen und wird kantendurchscheinend; wird erhitzt röthlich.

Nontron und Autun in Frankreich, mit Eisenstein bei Andreasberg.


Braun oder schwarz

1017

1017. Braun mit Harzglanz; kantendurchscheinend; giebt im Kolben ein saures Wasser und rothes Eisenoxyd:

Pittizit.

E i s e n s i n t e r.



Nierenförmig, tropfsteinartig, bisweilen krummschalig, derb, oft rissig; gelblich-, röthlich-, schwärzlichgrün; St. hell ocher-gelb; kantendurchscheinend; H. 2—3; G. 24.

In alten Grubenbauen; Freiberg, Schneeberg, Platten, Pless.

Graulich und bräunlichschwarz; fettglänzend;
brennbar:

Idrialit.

Braunes Erdharz.

Derb; von körniger, fast verfließender Textur; Bruch uneben bis unvollkommen muschelrig; undurchsichtig; H. 1—1,5; G. 1,4—1,6; entzündet sich schon am Kerzenlichte. Besteht aus Idrialin ($C^3 H^2$), Kieselsäure, Gyps, Thonerde, Kalk, Schwefelkies und Zinnober.

Mit Zinnober zu Idria in Krain.

Schwarz 1018

1018. Bruch grossmuschelig; Harzglanz; sehr leicht
schmelzbar; verbrennt vollkommen mit
bituminösem Geruch:

Asphalt.

Bergpech, schlackiges oder muschelriges Erdpech.

$C^{20} H^{32} O^3$.

Kugelig, traubig, nierenförmig; als Ueberzug; derb, eingesprengt; schwärzlichbraun bis pechschwarz; fettglänzend bis schimmernd; undurchsichtig; von schwachem bituminösen Geruch; H. 2; G. 1—1,2.

Auf Gängen und Lagern: todttes Meer, Tyrol; Neufchâtel, Harz, (Iberg).

Färbt fast immer an den Fingern ab; schmilzt
nicht, erweicht sich aber in der Hitze; lässt
beim Verbrennen einen geringen Rückstand

1019. Bisweilen etwas schiefrig; schwarz und stellenweise glänzend; erlöscht sofort, wenn man zu blasen aufhört und die Probe sich mit Asche bedeckt:

1019

Steinkohle.

S c h w a r z k o h l e.

Dicht, schiefrig, stängelrig, faserig, erdig, derb; undurchsichtig; schimmernd bis lebhaft fettglänzend; H. 2—2,5; G. 1,27—1,42.

Man unterscheidet die im Bruch sehr grossmuschelige, stark glänzende, sehr spröde Pechkohle; die im Bruch ebene oder flachmuschelige, würflich zerklüftende, schwach fettglänzende, zähe Kännelkohle; die dünnschalige, stark glasglänzende Blätterkohle; die dickschalige, wenig glänzende Schieferkohle; die im Bruch unebene, in der Zusammensetzung grobkörnige, graulichschwarze Grobkohle und die staubartige, locker verbundene, stark abfärbende Rustkohle.

In Steinkohlen- und Wälderthongebirge sehr verbreitet.

Zerbröckelt an der Luft; giebt im Kolben saures Wasser und brennt weiter, wenn sich die Probe auch mit Asche bedeckt

Lignit 815

1020. Deutlich splittriger Bruch; lässt sich mit dem Nagel ritzen, aber nicht wie die Thone schneiden

Gyps 332

Weich anzufühlen, seidenartig; lässt sich leicht wie Thon oder Seife schneiden . . . 1021

1021. Auf Kohle schmelzbar, oder zu einer unzusammenhängenden Masse sich brennend; deutlich muscheliger Bruch; giebt 25—40 p. C. Wasser

1022

Splittriger Bruch; 6—7 p. C. Wasser; un-
schmelzbar; brennt sich aber hart, wie
Porzellan:

Speckstein.

S e i f e n s t e i n .

$\text{Mg}^{\circ} \text{Si}^{\circ} + 4 \text{H}.$


In Pseudomorphosen des Quarzes, Bitterspaths etc.; traubig, derb; graulich-, gelblich-, grünlichweiss; ochergelb, seladon-, spargelgrün, fleisch- und bräunlichroth; oft mit schwarzen Braunsteindendriten; kantendurchscheinend bis undurchsichtig; matt; im Strich fettglänzend; nicht an der Zunge hängend; im Wasser nicht zerfallend; G. 2,6—2,8.

Auf Gängen und Lagern: Oberpfalz, Erzgebirg, Cornwall, Abo.

Der Pimelith ist durch Nickel grüngefärbter Seifenstein von Frankenstein in Sachsen. Auch der wasserärmere Razumovskia von Kosemitz in Schlesien scheint hierher zu gehören,

1022. Giebt im Kolben 36—40 p. C. Wasser; opalartig; halb durchsichtig; zufällig durch Kupferlasur blau gefärbt:

Allophan.



Traubig, nierenförmig, als Ueberzug, derb, eingesprengt; himmelblau ins Spangrüne, auch ins Braune, Rothe, Gelbe und Weisse; gefleckt, geädert; halbdurchsichtig bis kantendurchscheinend; schwacher Glas- bis Fettglanz; H. 2—3; G. 1,8; brennt sich fleckenweise schwarz; in Säuren löslich.

Saalfeld, Schneeberg, Bonn, Namur. Der Opalinallophan (Schrötterit) von Frauenstein in Steiermark brennt sich weiss.

Bruch uneben; undurchsichtig oder kantendurchscheinend; enthält mindestens 50 p. C. Kieselsäure und 24 p. C. Wasser:

Walkererde.

Derb, weich; grün, grau, weiss, roth; Strich fettig glänzend; fühlt sich sehr fettig an; hängt kaum an der Zunge; zerfällt im Wasser zu einer breiartigen Masse, absorbiert Oel und Fett.

Steiermark, Sachsen, Böhmen, England.

1024. Opalartig; milchweiss, mit 35—37 p. C. Kieselsäure:

Lenzinit.

Findet sich bei Kell.

Glasglanz, bläulichgrau, schmutziggrau, von Eisen oft hellgrün gefärbt, wird an der Luft undurchsichtig:

Gallonsit.

Nierenförmige und knollige Massen; weiss oder hell bläulichgrau; kantendurchscheinend; stark an der Lippe hängend; weich; G. 1,8—2; kleine Stücke werden im Wasser durchsichtig.

Auf einem Eisensteinsgange bei Anglar unweit Lüttich.

Sehr ähnlich ist der Lenzin von St. Severe und der Nertschinskite vom Ural.

1025. Deutlich splittriger Bruch 1026
 (Man wähle die erste Nachweisnummer.)
 Bruch muschelig, uneben oder körnig 1034
 1026. Weiss, hellgrau, grünlichweiss . 1027, 1035, 1059
 Lebhafter gefärbt 1031, 1042, 1071
 1027. Gewicht 4, 7; schwer an den Kanten zu
 weissem Email schmelzbar; in Säuren un-
 löslich **Schwerspath** 267
 Gewicht 2, 7—3, 2 1028
 1028. In Salz- und Salpetersäure löslich 1029
 Unlöslich, oder nur wenig davon angegriffen . 1030
 1029. Mit Aufbrausen löslich **Kohlensaurer Kalk** 163
 Ohne Aufbrausen **Apatit** 209
 1030. Violett; wird von Schwefelsäure angegriffen
 und entwickelt dadurch Flusssäure; schmilzt
 zu einer undurchsichtigen Perle

Flussspath 65

Sehr weich anzufühlen; Fett- bis Wachs-
 glanz; wird in Schwefelsäure etwas an-
 gegriffen, ohne Flusssäure zu entwickeln;
 unschmelzbar:

Bildstein.

Agalmatholith, chinesischer Speckstein.

Äl Si.

Derb, grobschieferig; gelblich-, grünlich-, perlgrau; berg-,
 ölgrün; isabellgelb; fleischroth; durchscheinend; matt; im St.
 schimmernd; etwas fettig anzufühlen.

Lagerartig im Glimmerschiefer: Nagy - Ag und in China.

1031. Roth oder violett 1032
 Grün, grünlich, gelblichgrün, apfelgrün,
 grünlichgelb 1033
 Dunkel röthlichbraun:

Chalilith.

Derbe Massen mit splittrigem oder flachmuscheligen Bruch;
 Fett- bis Glasglanz; kantendurchscheinend; H. 4, 5; G. 2, 25;

brennt sich weiss und blähet sich auf. Ist ein Thon- und Kalk-
erdesilikat mit 16 p. C. Wasser.

Im Donagoragebirge in Island.

1032. Gewicht 2, 7—2, 8; mit Brausen in Säuren
löslich; giebt in der Flamme Aetzkalk

Eisenkalk 163

Violett; ohne Aufbrausen in Säuren löslich;
büst in der Flamme die Farbe ein; Ge-
wicht 3, 4—3, 6


Yttrocerit 75

1033. Apfelgrün oder smaragdgrün; schmelzbar . 1033^a

Dunkelgrün, grüngelb, roth; gewöhnlich grün-
bunt; die grüngelbe Art stark durchschei-
nend; unschmelzbar; giebt im Kolben 10
—12 p. C. Wasser:

Serpentin.

O p h i t z. Th.




In Afterkrystallen des Olivins; derb; schalig; schimmernd bis
matt; H. 3; G. 2, 7.

Gebirgsart: Schlesien, Sachsen, Fichtelgebirge, Norwegen.

Kommt meerschaumartig (Aphrodit) bei Taberg und Sala
vor; vanadinsäurehaltig (Hydrophit) bei Taberg; chromhaltig
(Rhodochrom) am Ural und in Steiermark, mit etwas mehr
Wassergehalt als Deweylit zu Middlefield in Massachusetts; sehr
durchscheinend als Kieselkalkhydrat (Hymnit) in Nord-
Amerika; etwas härter als Pyknotrop bei Waldheim in Sachsen.

Gelblichbraun; deutlicher Harzglanz; giebt
im Kolben 20 p. C. Wasser:

Retinalith.



Derb; von harzigem Ansehen; fettglänzend; wird in der
Flamme weiss und zerreiblich, ohne zu schmelzen.

Findet sich mit Kalkspath bei Granville in Unter-Canada.

1033^a. Nach zwei Richtungen spaltbar **Pyrosklerit** 293

- bar; wird gebrannt theilweise löslich und
schmeckt dann wie Alaun . . . **Alunit** 167
1042. Roth, rothbraun oder schwarz . . . 1043
- Gelb, grüngelb, gelbgrau, grau oder grün 1053
- Lavendelblau; durchscheinend:

Lavendulan.

Nierenförmig; krummschalig; Fett- bis Glasglanz; H. 2, 5 — 3;
G. 3; leicht schmelzbar; auf Kohle im Reductionsfeuer Arsengeruch.
Enthält Arseniksäure, Kobalt-, Nickel-, Kupferoxyd und Wasser.
Auf Gängen bei Annaberg.

1043. Roth . . . 1044
- Rothbraun oder schwarz . . . 1047
1044. Strich schön cochenilleroth . . . 1045
- Strich orange gelb . . . 1046
1045. Mit Arsengeruch leicht schmelzbar **Proustite** 155
- Kein oder geringer Arsengeruch

Rothgültigerz 155

1046. Schmilzt leicht mit weissem Arsenikrauch
und verflüchtigt sich ganz . . . **Realgar** 357
- Auf Kohle schmelzend, sich ausbreitend und
ein Bleiregulus gebend; dabei Blei-, aber
keine Arsenikdämpfe . . . **Rothbleierz** 375


1047. Rothbraun . . . 1048
- Schwarz . . . 1049

1048. Leicht, zerbrechlich; durchsichtig oder durch-
scheinend; brennt am Kerzenlichte . . . 1052

- Gewicht 4, 2; hart; brennt und schmilzt nicht,
wird aber in der Flamme gelb **Pyrochlor** 68
- Derbe Massen; nierenförmig; G. 1, 8; schmelz-
bar zu grauer, stark magnetischer Kugel:

Delvauxit.

Delvauxin.



Gelblich-, röthlichbraun, auch schwarz; St. gelblichbraun;
Harzglanz; kantendurchscheinend; St. 2, 5; in Salzsäure löslich.

Findet sich zu Berneau bei Visé in Belgien.

1049. Leicht; Gewicht höchstens 1,6; brennt vor dem Löthrohre 1050
Gewicht 4,2; Harzglanz; unschmelzbar, aber auf Kohle sich gelb brennend **Pyrochlor** 68
Bräunlichschwarz; Strich leberbraun; Gewicht 2,5:

Pelokonit.

Derb; Bruch muschelrig; undurchsichtig, schwacher Glasglanz, fast matt; giebt im Kolben viel Wasser; leicht in Salzsäure löslich; wird sich vom Kupfermanganerze wohl hauptsächlich durch grössern Gehalt an Eisenoxyd unterscheiden.

Findet sich mit Malachit in Chili.

1050. Schmilzt und brennt mit stark bituminösem Geruch **Asphalt** 1018
Brennt, lässt wenig Rückstand; schmilzt aber nicht 1051

1051. Brennt leicht mit bläulicher, lebhafter Flamme
Känelkohle 1019

Brennt nur in grösster Hitze:

Kohlenblende.

Anthracit, Stangenkohle, Glanzkohle.

Eisenschwarz; undurchsichtig; derb; schiefrig; im Bruch flach-muschelig; halbmatt glänzend; H. 2—2,5; G. 1,4; giebt im Kolben kein Brennzöl.

Auf Gängen und Lagern: Lobenstein, Hof, Königsberg, Zorge, Elbingerode.


1052. Mit Schwefelgeruch **Schwefel** 255
Mit aromatischem Geruch 1111

1053. Gelb, grüngelb oder etwas röthlich 1054
Grün, gelblich-, graulichgrün, gelblich-, schmutziggrau 1055

1054. Schwefelgelb; brennt mit Schwefelgeruch
Schwefel 255

Dunkelwachsgelb, ins Bräunliche, nur an den Kanten zu schmelzen, etwas magnetische Schlacke schmelzbar:

Diadochit.



Derb; nierenförmig; tropfsteinartig mit schaliger Structur; Strich weiss; durchscheinend bis undurchsichtig; Wachs- bis Glasglanz; H. 3; G. 2.

Auf Alaunschiefer bei Arnsbach im Saalfeldschen.

Ambragelb; brennt mit Bernsteingeruch:

Bernstein.

Succinit, Agtstein, Börnstein, Ambra.

Rundliche Stüce und Körner mit flachmuschelartigem Bruch; gelblichweiss, stroh-, schwefel-, honig-, wachsgelb; gelblich-, röthlichbraun; durchsichtig bis durchscheinend; fettglänzend; H. 2,—2, 5; G. 1, 08.

An der Ostseeküste angespühlt und in Braunkohlenlagern.

1055. Gewicht 6—6, 6 **Weissbleierz** 263

Gewicht 2,—3, 4 1056

1056. Grün oder grünlich 1057

Grau oder graulich; in Säuren brausend . 1094


1057. Bruch muschelartig und körnig; Fettglanz; krystallinisch **Apatit** 209

Bruch grossmuschelartig; Harzglanz

Kieselkupfererz 683


Bruch muschelartig; Glasglanz; derb; schmelzbar:

Trombolith.



Dunkel lauch- bis smaragdgrün, schwärzlich angelaufen; H. 3—4; G. 3, 4; undurchsichtig oder etwas kantendurchscheinend. Mit Malachit bei Razbanya in Ungarn.

Bruch muschelartig, bitterlicher Geruch nach dem Anhauchen:


Dermatin.

Nierenförmig, tropfsteinartig, hautähnlicher Ueberzug auf Serpentin und Kalkspath, schwärzlich - bis lauchgrün, dunkel olivengrün und dunkel leberbraun; St. gelb ins Graue; fühlt sich fettig an und hängt nicht an der Zunge; unschmelzbar.

Im Serpentin bei Waldheim in Sachsen.

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1058. Undeutlich muschelrig oder uneben | 1026 |
| (Man wähle die dritte Verweissnummer.) | |
| Körnig, zellig oder voll kleiner Höhlen | 1068 |
| 1059. Lebhafter Glas- bis Demantglanz | 1060 |
| Glasglanz oder Steinglanz | 1065 |
| 1060. Weich, dehnbar, mit dem Messer schneidbar | 1061 |
| Zerbrechlich, zerbröckelt unter dem Messer | 1062 |
| 1061. Am Kerzenlichte schmelzbar; auf Kohle ganz zu verflüchtigen | Quecksilberhornerz 135 |
| Am Kerzenlichte schmelzbar; giebt auf Kohle ein Silberkorn | Hornerz 74 |
| 1062. Gewicht wenigstens 6 | 1063 |
| Gewicht 2,9—3; mit Aufbrausen in Säuren löslich | Arragonit 275 |
| 1063. In Säuren unlöslich; giebt auf Kohle Blei | Bleivitriol 263 |
| Ganz oder zum Theil in Säuren löslich | 1064 |
| 1064. Mit Aufbrausen | Weissbleierz 263 |
| Lösst sich mit Rückstand eines gelblichen Pulvers | Schwerstein 149 |
| 4065. Etwas öliger Fettglanz | 1066 |
| Steinglanz oder matt | 1067 |
| 1066. In Säuren löslich | Apatit 209 |
| Unlöslich; Schwefelsäure entbindet Flusssäure | Flussspath 65 |
| 1067. In Säuren unlöslich | Anhydrit 274 |
| Mit Aufbrausen löslich | 1039 |
| Ohne Aufbrausen löslich; | |

Chonikrit.



Derb; Bruch uneben und unvollkommen muschelrig; schnee-, gelblich- und graulichweiss; matt oder wenig schimmernd; durchscheinend oder kantendurchscheinend; H. 2,5—3; G. 2,9; leicht schmelzbar; nicht mit Phosphorsalz.

Mit Pyrosklerit auf Elba.

- | | | |
|--|----------------------|------|
| 1068. Körnig | Apatit | 209 |
| Voll von Zellen, Höhlen, Poren | | 1069 |
| 1069. Mit Aufbrausen in Säuren löslich | | 1070 |
| Unlöslich; geröstet lässt sich Alaun herauswaschen | Alunit | 167 |
| 1070. Braust langsam und schwer | Dolomit | 164 |
| Braust lebhaft; Aetzammoniak giebt einen Niederschlag, der sich im Ueberschusse wieder auflöst | Kieselzinkerz | 272 |
| 1071. Rosenroth, roth, röthlich, gelbroth, gelblich- oder röthlichbraun oder schwarz | | 1072 |
| Gelb, grünlichgelb, gelblichgrün, grün, blau, bläulich | | 1100 |
| 1072. Rosenroth | | 1073 |
| Roth, röthlich, gelblichroth, gelblich- oder röthlichbraun, oder schwarz | | 1074 |
| 1073. Mit Aufbrausen in Säuren löslich | Manganspath | 171 |
| Löslich zu einer Gallert oder unlöslich | Kieselmangan | 387 |
| 1074. Roth | | 1075 |
| Röthlich, röthlichgelb; gelblich- oder röthlichbraun, braun oder schwarz | | 1079 |
| 1075. Eisenroth; unschmelzbar; giebt auf Kohle eine magnetische Schlacke Rotheisenstein | | 154 |
| Cochenilleroth; ist schmelzbar zu einer nicht magnetischen Schlacke | | 1076 |
| Ziegelroth; weder für sich noch mit Flüssen schmelzbar: | | |

Plinthit.

(Äl, F) Si + 3 H.

Derb; flachmuschelig und erdig; undurchsichtig; nicht an der Zunge hängend; brennt sich schwarz, aber nicht magnetisch.

Grafschaft Antrim in Irland.

1076. Giebt einen cochenillerothen Strich 1077

Strich orangeroth 1046

1077. Verflüchtigt sich auf Kohle ganz und giebt im Kolben Quecksilberkügelchen . **Zinnober** 153.

Verflüchtigt sich nicht ganz und enthält kein Quecksilber 1078

1078. Giebt auf Kohle starken weissen Rauch mit oder ohne Arsengeruch 1045

Kein Rauch, schmilzt aber im Oxydationsfeuer zu schwarzer Schlacke, im Reductionsfeuer zu einem Kupferkorn

Rothkupfererz 15

1079. Röthlichgelb, röthlich, gelblich - oder röthlichbraun 1080

Braun, schwarzbraun, schwarz 1086

1080. Bräunlichgelb, Strich gelb; zu einer magnetischen Schlacke schmelzbar

Brauneisenstein 650

Röthlichgelb, bräunlichgelb, gelblich - oder röthlichbraun; giebt keine magnetische Schlacke 1081

1081. Giebt im Kolben Wasser 1082

Giebt kein oder nur sehr wenig Wasser 1083

1082. Bruch matt, wachsartig; hält 9—10. p. C.

Wasser; Gewicht 2,6—2,7; wird in der Flamme weiss, und schmilzt am Rande mit Schäumen zu einem schwach gefärbten Glase **Fahlunit** 370

Bruch glänzend; hält nur 4—5 p. C. Wasser; Gewicht etwa 4,2; unschmelzbar;

wird in der Flamme schwarz; beim Abkühlen roth, dann orangefarbig:

Basischer Fluocerit.

Basicerin.


Krystallinische Massen; Bruch muschelig; Glas – bis Fettglanz; gelb, ins Rothe und Braune geneigt, Strich bräunlichgelb; undurchsichtig; H. 4, 5.

Findet sich bei Ryddarhyttan.

1083. Deutlicher Harzglanz; leicht zu schwarzem Email schmelzbar **Triplit** 502
 Steinglanz; unschmelzbar 1084
 1084. Gewicht 4, 5—4, 7 1085
 Gewicht 3, 4—4; violettroth **Yttrocerit** 75
 1085. Röthlich; Gewicht 4, 7; schwärzt sich im Feuer und ist in Säuren löslich **Fluocerit** 218
 Bräunlichgelb, wie Zirkon; Gewicht 4, 5; in Säuren unlöslich
 **Phosphorsaure Yttererde** 118
 1086. Braun 1087
 Schwärzlichbraun und schwarz 1089
 1087. Gewicht wenigstens 6; leicht schmelzbar zu einer krystallinischen schwarzen Kugel
 **Buntbleierz** 198
 Gewicht 3, 6—3, 8 unschmelzbar oder zu einer schwarzen magnetischen Schlacke 1088
 1088. Unschmelzbar; zerlegt sich und giebt dabei den Geruch der schwefligen Säure **Blende** 13
 Giebt eine schwarze magnetische Schlacke
 **Spatheisenstein** 174
 1089. Schwarz 1090
 Bräunlichschwarz 1097
 1090. Verbrennt zum Theil in der Flamme 1091
 Verbrennt nicht; ist unschmelzbar 1094
 1091. Deutlicher Harzglanz; Gewicht 2, 7; lässt nach dem Verbrennen etwa 45 p. C. Rückstand,

- der sich schwer zu weissem Email schmelzen lässt **Pyrrhith** 390
- Gewicht unter 1,6; meist zerreiblich; verbrennt bis auf einen geringen Aschen-Rückstand 1092
1092. Fest; Bruch glänzend mit meist halbmetal-
lischem Harzglanz 1093
- Zerreiblich; meist an den Fingern abfärbend;
schmilzt nicht, erweicht sich aber im Feuer 1019
1093. Brennt nur im starken Luftstrome; schmilzt
nicht **Anthracit** 1051
- Schmilzt in geringer Wärme; verbrennt mit
lebhafter Farbe und mit bituminösem Ge-
ruch **Asphalt** 1018
1094. In Säuren mit Aufbrausen löslich 1095
- Wird in Säuren ohne Aufbrausen zu einer
gallertartigen Masse gelöst 1096
- Ohne Aufbrausen, aber mit Chlorentwicke-
lung in Salzsäure löslich:

Kupfermanganerz.




Traubig, stalaktitisch, klein nierenförmig; Oberfläche glatt;
Bruch unvollkommen muschelartig; bläulichschwarz; im Innern mehr
graulichschwarz; undurchsichtig; H. 3, 5; G. 3, 1.

Gemengt mit Kupferoxyd. Findet sich auf Gängen bei Kams-
dorf, Schlackenwalde.

1095. Lebhaftes Aufbrausen; wird in der Flamme
weiss und giebt ein caustisches Pulver
Bituminöser Kalkstein 163
- Braust langsam und giebt auf Kohle eine
schwarze magnetische Schlacke
Spatheisenstein 164
1096. Schmilzt schwer; giebt eine magnetische
Schlacke und im Kolben 20 p. C. Wasser:

Hisingerit.


Göllingit, Thraulit.



Derb, in parallele Blätter theilbar; Bruch erdig; matt; schwarz; St. grünlichgrau; weich; G. 3.

Mit Eisenstein zu Ryddarhyttan und Bodemais. Hierher gehört auch wohl der Polyhydrit von Breitenbrunn.

Unschmelzbar, brennt sich blass rothbraun und enthält nur 9—10 p. C. Wasser;

Thorit.

Derb; schwarz, oft mit röthlichem Anfluge; St. dunkelbraun; spröde; halbhart; G. 4, 6—4, 8.

Im Syenit auf der Insel Lövön bei Brewig.

1097. Gewicht etwa 6, 4; unschmelzbar; in Salpetersäure unter Entwicklung von salpetriger Säure löslich . . . **Uranpecherz 648**

Gewicht zwischen 2, 7 und 4, 6; in Salpetersäure löslich oder nicht, aber jedenfalls ohne Entwicklung salpetriger Säure . . . **1098**

1098. Glanz und Bruch deutlich harzig; leicht schmelzbar; ungleich dunkel gefärbt

Triplit 502

Metallischer Fettglanz; unschmelzbar:

Cuxenit.

Derbe Massen; Bruch unvollkommen muschelrig; bräunlich schwarz; in dünnen Splittern röthlichbraun durchscheinend; St. röthlichbraun; giebt mit Borax ein gelbes Glas; G. 4, 6; enthält hauptsächlich Tantal- und Titansäure, Yttererde, Uran- und Cer-oxydul.

Bei Jölster in Norwegen.

Matt, glanzlos; schwer schmelzbar . . . **1099**

1099. Wachsglanz; in Talkschiefer eingewachsen;

die Kanten der Probe schwer zu graulich-
weissem Email schmelzbar; Gewicht

2,6—2,7 Fahlunit 370

Giebt auf Kohle eine magnetische Schlacke;

Gewicht 3,3 Cronstedtit 217

1100. Gelb oder grünlichgelb **1101**

Grün, grünlich; blau, bläulich 1107

1101. Gewicht 1, 1—3, 4 1102

Gewicht 5,5—6,5; durchscheinend, oft undurchsichtig	1105
---	------

1102. Gewicht **2, 5—3, 4**; schwer schmelzbar, nicht brennbar **1103**

Sehr leicht; Gewicht 1,1—2; zerreiblich;
an einer Kerzenflamme brennend . . . 1104

1103. Ochergelb; undurchsichtig; milde; giebt auf Kohle eine magnetische Schlacke

Gelbeisenstein 650

Härter als Kalkspath, schwer zu weissem
Email schmelzbar; Fettglanz . . **Apati**

Strohgelb; zu schwarzer magnetischer Kugel
schmelzbar:

Rarphosiderit.

Nierenförmige und zerborstene, rindenförmige Massen; wenig glänzend bis schimmernd; wird durch Befühlen fettig glänzender; H. 4—4,5; G. 2,5. Wird ein wasserhaltiges, basisch phosphorsaures Eisenoxyd sein.

Auf Glimmerschiefer von Labrador.

1104. Ambragelb; Harzbruch; mit angenehmem Geruch verbrennend . . . **Bernstein 1054**

Schwefelgelb oder röthlich; riecht beim Verbrennen stark nach schwefliger Säure

Schwefel 255

1105. Gelbgrün mitlebhaftem Glanz; leicht schmelzbar; giebt auf Kohle eine schwarze krystallinische Kugel . . . **Buntbleierz** 198

Schmutziggelb; orangegelb 1106

1106. Schmilzt mit starkem Arsen-Rauch und Geruch **Buntbleierz** 198

Schmilzt ohne Arsengeruch; giebt auf Kohle ein Bleikorn und gelblichen Beschlag

Gelbbleierz 116

1107. Grün oder grünlich 1108

Blau oder bläulich, oft etwas ins Grüne geneigt 1109


1108. Grössere Massen; Bruch eben, etwas körnig; weich anzufühlen; unschmelzbar; lässt sich schneiden und abdrehen **Topfstein** 186

Bruch glasartig; schmelzbar; giebt auf Kohle ein Silberkorn und reagirt auf Jod

Jodsilber 74

Sehr dünn - und geradeschiefzig:

Antigorit.



Schwärzlichgrün, bei durchfallendem Lichte lauchgrün; schmutzig grünlichbraun gefleckt; St. weiss; durchsichtig bis durchscheinend; H. 2, 5; G. 2, 6; an den Kanten zu gelblichbraunem Email schmelzbar; in Säuren löslich.

Wahrscheinlich im Antigorathale in Piemont.

1109. Blaugrün oder grünlichblau; leicht zu schwarzem Email schmelzbar und dabei nach Arsenik riechend **Skorodit** 285

Lavendelblau 1110

1110. Mit Feldspath und körnigem Kalkstein zusammen; schwer zu weissem Email schmelzbar; Gewicht 2, 7—2, 9 **Glaukolith** 552


Gewicht 3, 2—3, 3; leicht zu magnetischem schwarzen Email, oder schwarzer Schlacke schmelzbar **Krokydolith** 837

1111. Verbrennt mit deutlichem Ambrageruch und giebt bei der Destillation viel Bernsteinsäure **Bernstein** 1054

Verbrennt mit schwach aromatischem und zugleich bituminösem Geruch; giebt wenig oder gar keine Bernsteinsäure bei der Destillation:

Fossiler Copal.

Highgate Harz.



Schmilzt in der Hitze ohne Zersetzung und verflüchtigt sich in mäsiger Wärme mit geringem, erdigem oder kohligen Rückstande.


Findet sich im Thone bei London.

Aehnliche Verbindungen sind der Berengelit und der Guyaquillit aus Südamerika; der Middletonit aus England; der Succinasphalt von Bergen in Baiern.

Erdige Massen.

- | | |
|--|-------------------|
| 1113. Weiss oder weisslich, schwach gefärbt | 1116 |
| Lebhaft gefärbt | 1149 |
| 1114. Ganz oder theilweise im Wasser löslich: Salze | |
| Ganz oder fast unauflöslich im Wasser | 1113 |
| 1115. Weiss, oder wenig gefärbt durch Beimi-
schungen | 1136 |
| Lebhaft gefärbt | 1180 |
| 1116. Giebt auf glühenden Kohlen lebhaften Arsen-
oder Schwefelgeruch | 1117 |
| Kein Arsen- oder Schwefelgeruch auf Kohlen | 1118 |
| 1117. Riecht nach schwefliger Säure Schwefel | 255 |
| Riecht nach Arsen Weissarsenikerz | 63 |
| 1118. Gewicht 3,4—4,7 | 1118 ^a |
| Gewicht höchstens 3 | 1119 |
| 1118 ^a . In Säuren unlöslich Schwerspath | 267 |
| In Säuren mit Brausen löslich: | |

Hydrocerit.




Krystallinische oder erdige Massen; als Ueberzug; weiss, ins Graue und Gelbliche; St. weiss; brennt sich braungelb.

Mit Kupferkies zu Bastnas bei Ryddarhyttan.

1119. In Säure mit Brausen löslich 1120
 Unlöslich oder ohne Brausen löslich 1123
 1120. Mit starkem Aufbrausen **Kreide** 163
 Mit langsamem Aufbrausen 1121
 1121. Giebt im Kolben 16—18 p. C. Wasser:

Hydromagnesit.



Rundliche, etwas plattgedrückte Massen mit erdigem bis unvollkommen muschellgem Bruch; weiss; matt, wird vom Nagel geritzt; fettig anzufühlen; färbt ab und schreibt.

Im Serpentin bei Kumi auf Negropont und bei New-York.


Der Baudisserit aus Piemont scheint mit Quarz gemengter Hydromagnesit zu sein.

Giebt im Kolben kein Wasser 1122

1122. Kleesäure giebt in der Auflösung keinen,
 oder geringen Niederschlag:

Magnesit.

G i o b e r t i t.



Nierenförmig, knollig, derb; mit rauher Oberfläche; Bruch flachmuschelartig bis eben und erdig; gelblich bis graulichweiss; schimmernd bis matt; St. etwas glänzend; H. 3—4; G. 2,8—2,9; unschmelzbar.

Hrubschütz, Baumgarten, Frankenstein, Steiermark.

Der Kieselmagnesit von Kosemütz ist wohl nur ein Gemenge von Magnesit oder Talkspath und Quarz.

Kleesäure giebt starken Niederschlag

- Erdiger Dolomit** 164
1123. In Säuren unlöslich **Erdiger Gyps** 332
 Auflöslich 1124
 1124. Die Auflösung enthält eine, wenigstens bei
 der Concentrirung bemerkbare Gallerte 1125

Keine Gallerte; mit Arsengeruch schmelzbar


Pharmakolith 351

1125. Mit Aufblähen zu weissem Email schmelzbar

Mehlartiger Stilbit 272

Unschmelzbar, sich bloss frittend:

Meerschäum.



Afterkrystalle nach Kalkspath; derb oder knollig; meist ins Gelbliche und Röthliche; matt; undurchsichtig; mager anzufühlen; hängt stark an der Zunge; H. 2—3; G. 1,2—1,6; giebt im Kolben Wasser, wird schwarz und riecht brennzlich.

Livadien, Natolien, Toledo, Frankreich.

1126. Weich anzufühlen, thonartig, lässt sich, mit

Wasser vermischt, kneten **1127**

Zerfällt im Wasser nicht, lässt sich nicht

kneten, und ist von den Thonen überhaupt verschieden **1115**

1127. Weiss oder grau **1128**

Von Eisenoxyd gefärbt:

Thon.

Dicht, derb, schiefrig; weiss, grau, gelb, roth, braun; undurchsichtig; matt, im Strich glänzend; fettig anzufühlen; an der Zunge hängend; im Wasser zerfallend und damit bildsam werdend; schmelzbar bis unschmelzbar; absorbirt Fett. Es ist Thonsilikat mit Wasser, aber in sehr verschiedenen Verhältnissen. Man unterscheidet den derben, weissen, grauen oder bunten Töpferthon; den derben, erdigen, ochergelblichen Lehm; den schiefrigen, asch- bis schwärzlichgrauen, im Wasser sich aufblättern- den Schieferthon; den verhärteten Thonstein.

Alle Varietäten sind sehr verbreitet.

Kaum zu unterscheiden ist die bei Bilin, Dillenburg und Waltershausen vorkommende, schreibende, licht bräunlichschwarze, im Strich fettige und glänzende Berg- oder Bocksseife; desgleichen ist der Cimolith von Argentiera nur ein weisser Thon.

1128 Leicht schmelzbar **1129**

Unschmelzbar und höchstens zu fritten . **1130**

1129. Schmelzbar zu schwarzem Email:

Wacke.

Dicht, derb, blasig; grau, grün, blau, roth, braun; undurchsichtig; matt; mager anzufühlen; nicht an der Zunge hängend; im Wasser unveränderlich; H. 2—3.

Im Porphyr- und Basaltgebirge, meist als Grundmasse der Mandelsteine. Der Skorilith aus Mexico scheint nur Varietät zu sein.

Schmilzt zu einer Art Schlacke oder einem grünlichen Email . . . **Walkererde 1022**
Schmilzt unter Aufblähen zu einem gelben Email:

Bol.

Lemnische Erde, Sphragid.

Derb; gelblichweiss, gelb, grau, roth, braun; kantendurchscheinend bis undurchsichtig; leicht zersprengbar; stark an der Zunge hängend; matt; im Strich glänzend; fettig anzufühlen; mit Knistern im Wasser zerspringend.

In Basalt und Serpentin: Habichtswald, Säsebühl, Frankenstein, Lemnos. Im Fettbol von Freiberg, wird der grösste Theil der Thonerde durch Eisenoxyd vertreten. Hierher gehört auch der in dünnen Platten vorkommende, weissliche, nicht an der Zunge hängende, sehr milde, fettig anzufühlende Malthazit von Bautzen. Der rothe Rhodalith aus Irland scheint gar nicht verschieden vom Bol; der Siderobol unterscheidet sich nur durch etwas grösseres Gewicht (3, 24).

1130. Giebt 20—25 p. C. Wasser im Kolben . . . **1131**

Giebt höchstens 15 p. C. Wasser . . . **1132**

1131. Sehr weiss . . . **Lenzinit 1024**

Grünlich, oft ocherfarbig . . . **Walkererde 1022**

1132. 12—15 p. C. Wasser . . . **1133**

Höchstens 6 p. C. Wasser . . . **1135**

1133. Sehr fett anzufühlen; giebt mit Wasser einen sehr formbaren Teig . . . **Töpferthon 1127**

Bildet keinen guten Teig und ist ein magerer Thon . . . **1134**

1134. Meist eine feste, geaderte Masse, die keine Quarzkörner enthält:

Steinmark.


In Pseudomorphosen des Feldspaths, derb, als Ueberzug, eingesprengt; im Bruch flachmuschelig, feinsplittrig oder erdig; weiss, grau, gelb, blau; roth; matt; im Strich fettglänzend; fettig anzufühlen; an der Zunge hängend; im Wasser sich nicht verändernd; enthält Eisen, Thon, Kiesel und Wasser.

Auf Gängen und in Blasenräumen der Mandelsteine nicht selten.

Ganz erdig, weiss oder etwas von Eisen gefärbt; nicht geadert und nicht mit Quarz- und Feldspathkörnern vermengt:

Porzellanerde.

K a o l i n.



Derb und eingesprengt; zerreiblich; weiss ins Graue und Rothe; St. weiss; undurchsichtig; färbt ab; hängt wenig an der Zunge; fühlt sich sanft und mager an.

Findet sich auf Lagern im Granit, Gneus und Glimmerschiefer.


1135. Enthält kaum 1 p. C. Wasser und wird von Säuren schwer angegriffen:

Leelit.

Derb; roth ins Braune und Weisse; kantendurchscheinend; H. 6—6,5. Findet sich in Westmannland.

Enthält 4—6 p. C. Wasser; sehr weich anzufühlen; enthält bis 12 p. C. Natron:

Pfeifenstein.




Derb; Bruch erdig; lichte graulichblau; undurchsichtig, matt; unschmelzbar; H. 2—2,5; G. 2,6. Aus Nordamerika.

1136. In Knollen; weich, sehr fest, schwimmend

Schwimmstein 220

Bildet keine Knollen und schwimmt nicht . 1137
 Nierenförmige Gestalten, schwimmt nicht:

Talksteinmark.



Derb, zerfressen, bisweilen dünnschalig abgesondert; Bruch flachmuschelartig in der Ebene; kantendurchscheinend; gelblich – oder röthlichweiss, fleischroth; St. weiss; etwas fett anzufühlen, wenig an der Lippe hängend; unschmelzbar; H. 2, 5; G. 2, 5.

Nesterweise im Porphyr bei Rochlitz in Sachsen.

1137. Weich und fettig, seifenartig anzufühlen;
 lässt sich in Späne schneiden, wie Blei . 1138

Mager, wenigstens nicht fettig anzufühlen . 1139

1138. Giebt auf Kohle unter Aufbrausen ein Metallkorn:

Bismutit.



Kohlensaures Wismuthoxyd.

Nadelförmige Afterkrystalle, eingesprengt, derb, Bruch muschelartig bis erdig, berg- und schmutzig zeisiggrün, ins Strohgelbe oder gelblichgrau, stroh- oder erbsengelb; undurchsichtig bis kantendurchscheinend; Glasglanz bis matt; sehr spröde; H. 4—4, 5; G. 6, 9.

Hirschberg im Voigtlande, Schneeberg, Johanngeorgenstadt.

Zu einem farblosen Glase schmelzbar, in Säuren löslich:

Saponit.



In zollbreiten Nestern von Seifenconsistenz; erhärtet bald oder zerfällt zu Pulver; weiss, ins Gelbe und Rothe; St. glänzend; fettig anzufühlen; hängt an der Zunge.

Von Svärdsjo in der Schwedischen Provinz Delarne.

Unschmelzbar 1138^a


1138^a. Frittet sich in starker Hitze wie Porzellan

Speckstein 1021

Unschmelzbar; färbt die Flamme röthlich:

Kerolith.

Hydrosilicit, Wachsstein.



Derbe, nierenförmige Massen oder in Platten; flachmuscheli-
ger Bruch; weisslich, gelblich, graulich; durchscheinend bis kan-
tendurchscheinend; Fettglanz bis schimmernd; fettig anzufühlen;
giebt im Kolben Wasser und wird schwarz.

Im Serpentin, Basalt und Mandelsteine in Sachsen, Böhmen.

- 1139.** Bildet pappenartige, weiche, aber sehr feste
Massen **Bergpapier** 785
Unregelmässige, grosse, weder geschichtete
noch gewobene Massen **1140**
Schiefrig, mager anzufühlen **1139^a**
1139^a. Dick - oder dünnschiefrig; an der Luft sich
aufblättern; saugt Wasser mit Zischen
ein; mager anzufühlen:

Klebschiefer.

Weisslichgrau; undurchsichtig; matt; unschmelzbar; hängt
sehr stark an der Zunge; G. 2.

Lagerartig am Mont-Martre bei Paris.

Dünnschiefrig, im Wasser sich aufblättern,
nicht an der Zunge hängend:

Polirschiefer.

Weiss, ins Gelbliche, Grauliche, Bräunliche; unschmelzbar;
zerreiblich; undurchsichtig; G. 1, 6.

Planitz, Bilin, Habichtswald.

Grobschiefrig, hängt nicht an der Zunge und
verändert sich im Wasser nicht:

Trippel.

Aschgrau, gelblichgrau, ochergelb; undurchsichtig, matt, zer-
reiblich; G. 1, 8—2, 2; brennt sich weiss; sehr strengflüssig.

Sachsen, Böhmen, Frankreich; besteht oft nur aus Kieselpanzern von Infusorien.

1140. Erhält durch Anfeilen Glanz; lässt sich mit dem Messer schneiden . . . **Skarbroit:**

Kollnrit.

S k a r b r o i t.

$\text{Al}^3 \text{ Si} + 15 \text{ H.}$

Derb, seltener nierenförmig; weiss, ins Gelbliche, Röthliche, Grauliche; matt, undurchsichtig; Bruch feinkörnig ins Ebene und Flachmuschelige; sehr fett anzufühlen; wenig abfärbend; sehr stark an der Lippe hängend; G. 2,1; enthält Wasser; ist unschmelzbar; in Säuren auflöslich.

Weissenfels, Schemnitz, Skarborough.

Lässt sich schneiden, zerbröckelt aber dabei; nimmt keinen Glanz an **1141**

1141. Reagirt auf Arsenik **1141^a**

Kein Arsengeruch **1142**

1141^a. Verflüchtigt sich auf Kohle **Weissarsenikerz** **63**

Unschmelzbar; reagirt mit Flüssen auf Mangan und Arsen:

Talkpharmakolith.

B e r z e l i i t.

$(\text{Ca}^3, \text{Mg}^3, \text{Mn}^3) \ddot{\text{A}}\text{s.}$

Derbe Massen mit Spuren von Spaltbarkeit nach einer Richtung; Bruch uneben; unrein weiss bis blass honiggelb; H. 5,5; G. 2,5; in Salpetersäure ganz auflöslich.

Findet sich zu Langbanshytta in Schweden.

1142. Mit Aufbrausen in Säuren löslich **1143**

Ohne Aufbrausen oder gar nicht **1147**

1143. Lebhaftes Aufbrausen; oft graulich, hat Thongeruch **Mergel** **164**

Langsames Aufbrausen **1144**


1144. Giebt im Kolben **15—18** p. C. Wasser . . . **1145**

Giebt kein Wasser **1146**

- 1145.** Gewicht 3, 5; in der Lösung giebt Ammoniak einen weissen, im Ueberschuss auflöslichen Niederschlag **Zinkblüthe** 667
Gewicht 2,7—2,8; der Niederschlag ist im überschüssigen Ammoniak nicht wieder löslich **Nemalit** 212
- 1146.** Aus der alkalischen Auflösung fällt Klee- säure keinen Kalk **Talkspath** 164
Kleesäure giebt starken gelblichen Nieder- schlag **Dolomit** 164
- 1147.** Giebt im Kolben Wasser, und eine aufge- blähte, nach Alaun schmeckende leichte Masse **Alunit** 167
Giebt im Kolben eine geschmacklose, stark an der Zunge klebend Masse 1148
- 1148.** Enthält wenigstens 85 p. C. Kieselerde
Randanit
Sehr fest; mager anzufühlen, enthält nicht über 55 p. C. Kiesel und giebt 25—30 p. C. Bittererde **Meerschäum** 1125
- 1149.** Blau, grün oder grünlich 1150
Gelb, rosa, roth, braun oder schwarz . . . 1155
- 1150.** Blau **Erdiger Vivianit** 375
Grün oder grünlich 1151
- 1151.** Staub- oder krustenartige Ueberzüge auf andern Mineralien 1152
Grössere Massen oder kleine erdige Kerne 1152
- 1152.** Dunkelgrün, chromgrün; auf Granit und Rothbleierz; schmilzt mit Schäumen und giebt kleine Bleikörner . . . **Vauquelinit** 377
Weisslichgrün; pulverartig; bedeckt gewöhn- lich Kupfernickel; giebt im Kolben Was- ser und schmilzt auf Kohle mit Entwicke- lung von Arsenikdämpfen zu einer spröden Kugel:

Nickelblüthe.

Nickelocker, Nickelgrün, Arseniksaures Nickel.



Haarförmige Krystalle; derb, eingesprengt, als Ueberzug; Bruch erdig; weich; zerreiblich; apfel- und zeisiggrün, grünlichweiss; St. grünlichweiss; matt, selten schimmernd; in Säuren leicht auflöslich:

Schneeberg, Annaberg, Andreasberg, Saalfeld, Riechelsdorf, Bieber.

1153. Grasgrün; kleine erdige, einzelne oder in ein trachytisches Gestein eingewachsene Nieren; unschmelzbar; wird in der Flamme schwarz und undurchsichtig:

Chloropal.

U n g h w a r i t.

Derb, Bruch muschelrig, ins Erdige; pistaziengrün; undurchsichtig bis kantendurchscheinend; Glasglanz bis matt; G. 2; H. 3—4; enthält 46 Kiesel, 33 Eisenoxydul, 18 Wasser.

Findet sich bei Unghwar in Ungarn.

Oliven- oder schmutziggrün; schmilzt mit
Arsengeruch

1154

1154. Weisslicholivengrün; schmilzt unter Entwicklung weisser Dämpfe zu einem schwarzen Email, und giebt im Reductionsfeuer ein weisses, sprödes Metallkorn **Olivenerz**

257

Schmutziggrün, grün, thonige Nieren; auf Kohle Arsenikdämpfe und magnetische Schlacke **Skorodit von Loaysa**

285

1155. Rosa oder roth

1156

Gelb, braun oder schwarz

1162

1156. Rosa

1157

Roth

1158

1157. Sehr hell rosa; giebt ein wenig gefärbtes, weisses Email **Roselit**

682

Rosa violett; giebt auf Kohle starke Arsen-
dämpfe und ein sprödes Metallkorn

Kobaltblüthe 359

1158. Ziegelroth, braunroth 1159

Zinnober-, mennig- oder orangeroth . . . 1161

1159. Braunroth; schmilzt leicht mit starkem An-
timonrauch; bildet meist einen dünnen
Ueberzug auf Grauantimonerz

Rothantimonerz 359

Ziegelroth; giebt auf Kohle keinen Rauch . 1160

1160. Pulverige Masse; leicht zu einem schwach
gefärbten Glase schmelzbar **Rother Stilbit** 272

Erdige, aber nicht pulverartige, an den Fin-
gern abfärbende, zu einer magnetischen
Schlacke schmelzbare Masse . . **Röthel** 154

1161. Zinnoberroth; lässt sich auf Kohle ganz ver-
flüchtigen; ohne Arsengeruch; giebt im
Kolben Quecksilberkügelchen **Zinnober** 153^a

Mennigroth; giebt auf Kohle ein Bleikorn:

Bleiocher.

Mennige, rothes Bleioxyd.

Pb Pb.

Derb, eingesprengt, angeflogen; in Aftcrkrystallen nach Weiss-
bleierz; Bruch feinerdig; schimmernd bis matt; morgenroth; St.
orange gelb; undurchsichtig; weich; G. 4,6; an der Zunge hängend.

Auf Gängen: Badenweiler, Brilon, Bleialff, Anglesea Mexico.

Orangeroth, mit starken Arsenikdämpfe auf

Kohle verflüchtigend . . . **Ranschroth** 357

1162. Gelb 1163

Braun oder schwarz 1172

1163. Dünner Ueberzug auf andern Mineralien . 1164

Kommt in grössern Massen vor . . . 1168

1164. Ist auf Kohle leicht zu reduciren . . . 1165

Reducirt sich nicht, ändert die Farbe und
schmilzt meistentheils leicht . . . 1166

1165. Isabellgelb; giebt Antimonrauch und metallische Körner; sitzt auf Rothantimonerz und bildet oft harte und dicke Krusten darauf:

Antimonocher.

Gelbantimonerz, Spiessglanzocher.

Šb + H.

Derb, eingesprengt, angeflogen, als Ueberzug; Afterkrystalle nach Grauantimonerz; Bruch erdig oder uneben; St. gelblichweiss, glänzend; sehr weich; G. 3,7; giebt im Kolben Wasser.

Wolfsberg, Braunsdorf, Horhausen.

Grünlichgelb, weisslich; leicht zu glänzendem Metallkorn reducirt, am Kerzenlichte schmelzbar; sitzt auf Wismutherzen:

Wismuthocher.

Wismuthblüthe, Wismuthoxyd.

Bi.

Derb, eingesprengt, angeflogen, gestrickt; Bruch uneben bis erdig; pommeranzen- oder strohgelb, ins Grüne und Graue gemengt, etwas Demantglanz; sehr weich; G. 4,3—4,7.

Schneeberg, Johannegeorgenstadt, Joachimsthal. Hierher gehört auch das kohlensaure Wismuthoxyd aus Cornwall.

1166. Citronengelb oder braungelb; giebt im Kolben Wasser; wird in der Flamme grünlich ohne zu schmelzen

1167

Ist wasserfrei; sitzt auf Molybdänglanz oder auf Wolfram; färbt Phosphorsalz am Platindrath in der Reductionsflamme schön grün:

Molybdänocher.

Wasserbleiocher, Molybdänsäure.

Mö.

Eingesprengt, als Anflug oder Ueberzug; Bruch feinerdig; zerreiblich; schwefel-, Citrone-, orange- und strohgelb, ins Zeisiggrün; undurchsichtig; matt.

Pfälzerthal in Tyrol, Schweden, Norwegen, Sibirien.

1167. In Säuren löslich; die Lösung enthält Schwefelsäure und giebt mit Cyaneisenkalium einen braunen Niederschlag:

Urangrün.

Soll basisch schwefelsaures Urankupferoxyd seyn, und findet sich bei Joachimsthal.

Die Lösung enthält keine Schwefelsäure, und giebt mit Cyaneisenkalium einen braunen Niederschlag:

Uranocher.

Derb, eingesprengt, angeflogen, staubartig; Bruch unvollkommen muschelrig, erdig; stroh-, citron-, schwefel-, orangegelb bis Zeisiggrün; schimmernd bis matt; St. citrongelb; wird im Kolben roth.

Ist wahrscheinlich reines Uranoxyd, und findet sich mit Uranpecherz zu Johannegeorgenstadt und Joachimsthal.

Zu erwähnen ist hier die citronen- oder schwefelgelbe, in haarförmigen Krystallen oder krystallinischen Flocken vorkommende, perlmutterglänzende Uranblüthe von Joachimsthal; vielleicht kohlenaures Uranoxyd.

1168. Gewicht wenigstens 6; giebt auf Kohle ein Bleikorn:

Bleiglötte.

M a s s i c o t.

Pb.

Hat sich, mit der künstlichen vollkommen übereinstimmend, in den Schluchten mexicanischer Vulkane gefunden.

Gewicht geringer **1169**


1169. Ochergelb, schmutziggelb; giebt eine magnetische Schlacke **1170**

Hell schwefelgelb, weisslich oder rausch-

- gelblich; schmilzt leicht mit Schwefel- oder
 Arsengeruch 1171
 1170. Ochergelb **Gelbeisenstein** 650
 Schmutziggelb; giebt auf Kohle einen vege-
 tabilischen Geruch:

Oralit.

Humboldtite, Humboldtine; Eisenresin, Faserresin,
 oxalsaures Eisen.



Haarförmige Krystalle, oder kleintraubig, derb, eingesprengt;
 als Beschlag und Anflug; ochergelb, dunkel hochgelb bis hell
 graulichgelb; Fettglanz bis matt; H. 2; G. 2, 2; wird bei anfan-
 gender Glühhitze schwarz und magnetisch.

Bei Bilin und Grossalmerode auf Braunkohlenlagern.

1171. Hellgelb, riecht auf Kohle nach schwefliger
 Säure **Schwefel** 255
 Rauschgelblich, giebt auf Kohle starke weisse
 Dämpfe und Arsengeruch . . **Rauschgelb** 300
 1172. Braun 1173
 Schwarz 1174
 1173. Gewicht 1, 1—1, 3; brennbar . . **Umbra** 815
 Gewicht 3, 3—4, 6; bekommt in der Flamme
 schwarze Farbe und metallischen Glanz
Grorolith 706
 1174. Verbrennt in der Flamme ganz oder gröss-
 tentheils 1175
 Brennt nicht 1178
 1175. Deutliche Holztextur 1176
 Zeigt keine organische Textur 1177
 1176. Lange Holzfasern **Faserkohle** 815
 Kohlenartige Textur **Steinkohle** 1019
 1177. Entzündet sich schwer und erlischt, wenn
 die Probe sich mit Asche bedeckt; riecht
 wie Steinkohle . . **Erdige Steinkohle** 1019
 Entzündet sich leicht; brennt unter der Asche

fort und giebt dabei einen bituminösen und säuerlichen Geruch

Erdige Braunkohle 815

1178. Schmelzbar; giebt auf Kohle ein Kupferkorn; bricht mit Kupferkies oder Kupferlasur

Kupferschwärze 700

Schmelzbar, giebt auf Kohle ein Silberkorn:

Silberschwärze.

Erdiges Glanzerz, Silbermulm.

Weich, zerreiblich, etwas abfärbend; kleinnierenförmig, angefliegen, als Ueberzug auf Glanzerz und eingesprengt; Bruch erdig; bläulichschwarz, ins schwärzlich Bleigraue; St. metallisch glänzend; matt bis schimmernd.

Kommt mit Glanzerz zusammen vor, und scheint daraus entstanden zu sein.

Verflüchtigt sich auf Kohle mit Arsengeruch:

Arsenikschwärze.

As ?


Derb, aus staubartigen Theilen bestehend, auch eingesprengt, angefliegen und als Ueberzug; Bruch erdig; weich; undurchsichtig; matt; graulichschwarz.

Bei Joachimsthal auf Speiskobalt; auch der schwarze Ueberzug des gediegenen Arseniks wird hierher gehören.

Unschmelzbar	1179
1179. Färbt Borax violett	Pyrolusit 246
Färbt Borax blau	Kobaltmanganerz 700
Färbt Borax grün	Schwarzes Nickeloxyd 000
1180. Grün, blau oder grünlich	1181
Roth, röthlich, gelb, gelblich, braun und schwarz	1186
1181. Blau oder bläulich	1182
Grün oder grünlich	1183
1182. Kleine hellblaue, harte, politurfähige Stücke :	

Türkis.

Calait; untheilbarer Lasurspath.




Derb, tropfsteinartig, als Ueberzug und in Geschieben; untheilbar; Bruch muschelrig bis uneben; himmelblau; span-, pistazien-, apfelgrün, grünlichgrau; St. grünlichweiss; kantendurchscheinend bis undurchsichtig; H. 6; G. 2,8—3; giebt im Kolben Wasser, wird schwarz; schmilzt nicht.

Jordansmühle in Schlesien, Voigtland, Persien.

Grössere, lavendel- oder pflaumbraue, weiss und roth geaderter oder gefleckter, selten perlgraue Stücke:

Eisensteinmark.


Teratolith, sächsische Wundererde.



Derbe Massen mit feinkörnigem, unebenen Bruch; undurchsichtig; matt; etwas an der Lippe hängend; mager anzufühlen; unschmelzbar; wasserhaltig.

Bildet ein Lager unter Steinkohlen bei Planitz in Sachsen.

Indigblau bis seladongrün, im Wasser unter Knistern zerspringend:

Miloschin.

Derb, meist ins Erdige übergehend; schimmernd bis matt; auf den Klüften glänzend; kaum kantendurchscheinend; fühlt sich fein und mager an; in Salzsäure nur theilweise löslich.

Auf einem Gange zu Rudmak in Serbien.

Grössere Stücke; Bruch eben; indigblau

Blaueisenerde 375

1183. Dunkelgrün, bouteillengrün; Bruch eben, etwas körnig; giebt in der Flamme eine magnetische Schlacke:

Grünerde.**Veroneser Erde.**

Dicht bis erdig; derb, im Pseudomorphosen des Augits; als Ueberzug; seladongrün, olivengrün; St. bläulichgrün oder grünlichweiss; schimmernd bis matt; etwas fettig anzufühlen; un-
schmelzbar; etwas an der Lippe hängend; G. 2, 8; enthält Eisen,
Kali, Kiesel und Wasser.

Am Monte Baldo, Fassathal, Oberstein, Island.

1184. Ueberzieht Quarzgestein und färbt dasselbe
auch innen schön grün; verliert in der
Flamme die Farbe:

Chromocher.**Grünes Chromoxyd.**

Derbe, lockererdige Massen, eingesprengt; grasgrün ins Zei-
sig- und Gelblichgrüne; kantendurchscheinend bis undurchsichtig;
weich; ist wahrscheinlich reines Chromoxyd.

Findet sich auf der Schottlandsinsel Unst. Hierher gehört
auch der aus Chrom, Eisen, Thonerde und Kieselsäure bestehende
Chromstein von Creuzot, Halle, Waldenburg.

Grüngelb und gelbgrün, ist in Aetzammo-
niak auflöslich:

Wolframocher.


Derb, angeflogen, als Ueberzug; Bruch erdig; matt; undurch-
sichtig; spröde, weich; verhält sich ganz wie Wolframsäure.

Auf einem Quarzgange bei Huntington in Nordamerika.

Bruch muschelrig bis eben, fest; gleicht grü-
nem Mergel **1185**

1185. Unschmelzbar; wird schwarz und undurch-
sichtig; giebt mit Borax ein bouteillen-
grünes Glas **Chloropal 1153**


Strich fettig glänzend; wird in der Flamme
kaffeebraun; giebt mit Borax ein smaragd-
grünes Glas:

Wolchonskoit.

Derb; Bruch muschelig bis uneben; grasgrün, ins Pistazien-grüne und Schwärzlichgrüne; undurchsichtig; H. 2—2,5; G. 2,2—2,3; fühlt sich etwas fettig an, hängt nicht an der Zunge.

In Adern und Nestern im Berge Infimicki im Kreise Perm.

An den Kanten schmelzbar; zeisiggrün oder ölgrün:

Pinguit.

Derb; Bruch im Grossen muschelig; fettig anzufühlen; hängt nicht an der Zunge; zerweicht nicht im Wasser; riecht schwach thonig; H. 1; G. 2,3; in Salzsäure leicht löslich.

Auf einem Gange bei Wolkenstein in Sachsen.

1186. Roth oder röthlich **1187**

Gelb, gelblich, Braun oder schwarz . . . **1189**

1187. Löst sich in Säuren mit Aufbrausen **Eisenkalk** **163**

Dunkelroth; löst sich in Säuren langsam, bisweilen mit Entwicklung von salpetriger Säure **1188**

Rostroth, löst sich, ohne Entwicklung von salpetriger Säure, zu einer orangerothern Flüssigkeit **Rotheisenstein** **158**

Ziegelroth; oft unrein; löst sich, bisweilen mit Entwicklung von salpetriger Säure, zu einer grünen Flüssigkeit:

Kupferpecherz.

Ziegelerz, Kupferbraun, Kupfereisenerz.

Traubig, nierenförmig, zellig, in Platten, derb, als Anflug, eingesprengt, auch staubartig; Bruch muschelig, eben oder erdig; ziegelroth, gelblich- und röthlichbraun bis bräunlichroth; ins Graue und Schwarze; St. gelblichbraun; undurchsichtig; fettglänzend; wachsartig schimmernd oder matt; wird in der Flamme schwarz; färbt Borax grün. Besteht aus Rothkupfererz, Roth- und Brauneisenstein.

Lauterberg, Rammelsberg, Iberg, Saalfeld, Kamsdorf, Siegen.
Auch das Hepatinerz aus dem Banate wird hierher gehören.

1189. Gelb oder gelblich	1190
Braun, bräunlich oder schwarz	1193
1190. Gewicht wenigstens 6	Weissbleierz 263
Gewicht 2, 2—3, 6	1191
1191. Mit Aufbrausen in Säuren löslich	
	Eisenkalkstein 163
Ohne Aufbrausen	1192
1192. Ohne oder mit geringem Rückstand	
	Gelbeisenerde 650
Mit starkem Rückstande	Gelbeisenoher 650
Mit gallertartigem Rückstande; reagirt auf Kobalt:	

Kobaltocher.

L e d e r k o b a l t.

Derb, als Ueberzug, eingesprengt, geborsten, zerfressen;
Bruch flachmuschelartig bis erdig; lederbraun und strohgelb; matt;
St. fettglänzend; undurchsichtig; wenig an der Zunge hängend;
H. 1—2; G. 2, 2; schmilzt unter Arsengeruch leicht zu schwarzer
Schlacke.

Saalfeld, Kamsdorf, Riechelsdorf, Kupferberg.

1193. Braun oder bräunlich	1194
Schwarz	1203
1194. Gewicht höchstens 1, 6; verbrennt mit bitu- minösem Geruch	1195
Gewicht wenigstens 2, 7	1202
1195. Schiefbrig, papierartig:	

Nsodil.

S t i n k k o h l e.

Ist der Papierkohle ähnlich; besteht ebenfalls aus elastisch
biegsamen Scheiben und entwickelt beim Verbrennen einen sehr
widerlichen Geruch.

Findet sich in der Wetterau.

- Stärkere Massen, nicht blättrig 1196
 1196. Deutliche Holztextur 1197
 Ohne Holztextur, matt wie Wachs **Asphalt** 1018
 1197. Deutliche Holztextur **Braunkohle** 815
 Enthält noch unzersetzte Pflanzentheile:

Torf.


Geht in eine scheinbar homogene, der erdigen Braunkohle ähnliche Masse über. Pechschwarz, braun, gelb; matt; weich; G. 0,5—0,6; verbrennt leicht und hat die Bestandtheile der Braunkohle.

Bildet die im Norden weit verbreiteten Torfmoore.

1198. Dunkelbraun 1199
 Bräunlich, gelblich, graulich, ins Schmutzig-
 weisse 1200
 1199. Dunkelbraun; nimmt Eindrücke vom Finger an:

Elaterit.

Elastisches Erdpech.



Derb, eingesprengt, nierenförmig, als Ueberzug; oft von schwammigem Ansehen; Bruch unvollkommen muschelrig bis eben; schwärzlichbraun ins Röthlich- und Gelblichbraune und ins dunkel Olivengrüne; kantendurchscheinend bis undurchsichtig; G. 0,8—1,28. Geschmeidig und sehr elastisch; fühlt sich fettig und etwas kalt an.

Auf Bleiglanzgängen in Derbyshire, auf Quarzgängen bei St. Andrée, und mit Braunkohle bei Newhavn in Connecticut.

Schwärzlichbraun, Strich gelblichbraun; zwischen den Fingern leicht zerreiblich:

Piauzit.


Derb, im Bruch unvollkommen muschelrig; H. 1, 5; G. 1, 22; verbrennt mit eigenthümlichem, aromatischem Geruch, lebhafter Flamme und starker Rauchentwicklung zu Asche.

Auf einem Braunkohlenflötze bei Neustadt in Krain.

Schmutzigbraun, gelblich, matt, auf dem Bruch etwas Harzglanz:

Retinit.

Retinasphalt, Erdharz.



Stumpfeckige Stücke; eingesprengt, dicht; im Bruch flach-muschelig; Isabell-, graulichgelb; gelblich-, röthlichbraun; zuweilen gestreift; kantendurchscheinend, schwach fettglänzend; schmelzbar und verbrennlich; spröde und leicht zersprengbar; H. 1, 5—2; G. 1; zeigt beim Reiben einen eigenthümlichen, lang bleibenden Geruch.

Auf Braunkohlenlagern: Halle, Laubach, Uttigshof, Bannat, England.

1200. Schwerer als Wasser:

Scheererit.



Schuppig, sternförmig strahlig, eingesprengt, als Ueberzug; weiss, gelblich, graulichweiss; durchscheinend; schwacher Perlmutterglanz; nicht fettig anzufühlen; weich und zerreiblich; G. 1—1, 2; hinterlässt auf Papier Fettflecken.

Sitzt zwischen den Fasern von Braunkohle: St. Gallen, Westerwald.


Identisch zu sein scheint der gelbe Xylokryptit; ähnlich sind der Tekoritin ($C^3 H^0$) und der Phylloretin ($C^4 H^5$) aus Dänemark, welche beide zusammen vielleicht den in Fichtestämmen eines Torflagers im Fichtelgebirge vorkommenden Fichtelit ($C^4 H^0$) bilden; der, weissem Wachs ähnliche Hartit mit krystallinischem Gefüge, und der hyacinthrothe Ixolith, beide von St. Gallen.

Schwimmt auf Wasser 1201

1201. Gelblich oder weisslich; schmilzt bei $76^{\circ} C.$:

Hatchettin.

Bergtalg.



Traubig, flockig, schuppig, feinkörnig; durchscheinend bis

undurchsichtig; weich wie Talg, unelastisch, biegsam; fettig anzufühlen; etwas klebrig; geruch- und geschmacklos.

Auf einem Gange zu Merthyr - Tydvil in Südwaies, und bei Strassburg.

Braungelb mit grünlichem Schein; schmilzt bei 60° C.:

Ozokerit.

C H².

Lauchgrün, ins Gelblichbraune; in dünnen Stücken röthlich-braun durchscheinend, wachstartig; fettglänzend bis schimmernd; von schwachem bituminösen Geruch; Bruch flachmuschelartig und splittrig; Talkhärte; G. 0,95.

In der Nähe von Kohlenlagern im Sandstein bei Slanik in der Moldau. Wahrscheinlich gehört hierher der Naphtadyl (Steintalg) vom caspischen Meer.

1202. Erdbraun; ebener Bruch; homogen; braust mit Säuren etwas; giebt in der Flamme eine magnetische Schlacke

Erdiger Spatheisenstein 174

Braun, ins Schwarze mit grünlichen und röthlichen Stellen; zu schwarzem Email schmelzbar:

Mysorin.

Ocherartige oder dichte, weiche Masse; scheint ein Gemenge zu sein; G. 2,62; enthält Kupferoxyd 60, Kohlensäure 16, Eisenoxyd 19; Kieselsäure 2.


Von Mysore in Ostindien.

1203. Gewicht höchstens 1,5; verbrennlich; Holztextur Braunkohle 815

So schwer oder schwerer als Kalkspath;
unverbrennlich 1204

1204. Strich schwarz 1205


Strich grau	1206
1205. Färbt Borax violett	Pyrolusit 246
Färbt Borax blau	Kobaltmanganerz 700
Färbt Borax grünlichblau und reagirt auf Kupfer:	

Condurrit.

Derb und erdig; Bruch flachmuschelig; lässt sich mit einem Messer schneiden, und wird dadurch die Oberfläche metallisch glänzend; H. 6; G. 5,2; bräunlichschwarz ins Blaue; St. russ-schwarz; giebt auf Kohle weissen Dampf, und eine halbgeflossene, metallische Substanz.

Im Granit bei Condurrow in Cornwall.

Färbt Borax milchweiss und reagirt auf Silber:

Kohlensaures Silberoxyd.

Derbe Massen; eingesprengt; Bruch uneben; feinkörnig ins Erdige; aschgrau ins Schwarze; St. glänzend; undurchsichtig; wenig glänzend bis matt; H. 1,5.

Auf Kalkspathgängen zu Wolfach in Baden.

1206. Bildet kleine erdige Nieren mit härterem Mittelpunct; theilweise und ohne Brausen in Säure löslich	Bituminöser Apatit 209
--	-------------------------------

Grössere Massen; Bruch eben; mit Aufbrausen in Säuren löslich

Bituminöser Kalkstein 163

Einzelne oder zusammengebackene Nieren, Knollen, Körner, körnige Krystalle oder sandige Massen.

1207. In Wasser auflöslich	1208
Unauflöslich	1211

1208. Verflüchtigt sich auf Kohlen	1209
Verflüchtigt sich nicht, giebt aber Wasser frei	1210
1209. Die Lösung wird von salzsaurem Baryt ge- fällt	Maskagnin 227
Sie wird von salpetersaurem Silber gefällt	
	Salmiak 90
1210. Braust mit Säure und enthält Natron	Urao 227
Braust nicht, detonirt auf Kohlen	Salpeter 227
1211. Vollkommener oder unvollkommener Metall- glanz	1212
Stein- oder erdiges Ansehen	1224
1212. Isolirte Körner	1213
Zusammengebackene Körner	1216
1213. Goldgelbe Körner oder Flittern	
	Gediegen Gold 16
Eisen-, stahl-, oder bleigrau	1214
1214. Runde oder abgeriebene Körner	1215
Krystallinische Körner oder feiner Sand	1218
1215. Gewicht 17—17,5; nicht magnetisch	Platin 35
Gewicht 4,4—5,4; sind magnetisch, oder werden es durch Erhitzen	1216
1216. Giebt beim Zerreiben rothes Pulver	
	Eisenglanz 154
Strich grau	1217
1217. Stark magnetisch, Strich schwarz	
	Magneteisen 23
Schwach magnetisch; entwickelt bei der Auflösung in Salzsäure Chlor; Ammoniak giebt in der Lösung einen flockigen Nie- derschlag, der sich zum Theil wieder auf- löst	Franklinit 23
1218. Eisen- oder stahlgrau	1219
Blei- oder zinngrau	1223
1219. Giebt beim Zerreiben rothes Pulver	
	Eisenglanz 154

- Pulver schwarz oder grau 1220
1220. Stark magnetisch; hängt sich an den Magnetstab an 1221
- Schwach magnetisch; hängt sich nicht an den Magnet an 1222
1221. Gewicht 5, unschmelzbar; färbt Borax theillengrün **Magneteisenstein** 23^a
- Gewicht 4, 4—4, 5; färbt Phosphorsalz roth **Iserin** 23^a
1222. Gewicht 4, 8; entwickelt beim Auflösen in Salzsäure Chlorgeruch; giebt, feingeschlämmt und mit Soda innig gemengt, im Reductionsfeuer ein Zinkkorn **Franklinit** 23
- Gewicht 4, 4—4, 5; unschmelzbar; giebt kein Zinkkorn, aber mit Phosphorsalz ein rothes Glas **Menakanit** 153^b
1223. Hellgraue, krystallische Blättchen; Gewicht 19, 2; wird von Säuren nicht angegriffen **Osmium Iridium** 189
- Silberweisse Flittern; Gewicht 11—12; wird von Salpetersäure angegriffen:

Palladium.

Scheint in sechsseitigen Tafeln zu krystallisiren; meist in kleinen, losen Körnern; stahlgrau ins Silberweisse; Bruch hakig; H. 4, 5—5; für sich unschmelzbar; schmilzt mit Schwefel.

Im Goldsande Brasiliens; auf Gängen zu Tilkerode. Eine Verbindung des Palladiums mit Silber, Gold und Selen, bildet den silberweissen, gelblich anlaufenden, im Strich schwärzlichen, bei Tilkerode am Harze vorkommenden Eugenesit.

1224. Nieren oder feine Körner 1225
- Verbundene Nieren und Körner 1233
1225. Grössere Nieren und Knollen von wenigstens Nussgrösse 1226
- Runde Körner und Sand

1226. Gewicht 1, 2—1, 5; verbrennt gänzlich vor dem Löthrohre 1111
 Gewicht mindestens 2, 7; brennt nicht . . . 1227
 Ocherfarbige, meist hohle, oft mit beweglichen Kernen versehene Nieren **Adlerstein** 650
 Volle Nieren; nicht ocherfarbig 1228
 1228. Rundliche Massen mit geflossener Oberfläche; porös; schlackenartig; dicht- oder blättrigstrahlig; bisweilen zellig oder blasig; bräunlichschwarz:

Fanalit.

Eisenperidot.

$\text{Fe}^3 \text{Si}$.

Bisweilen in zwei sehr stumpfwinkligen Richtungen spaltbar; Undurchsichtig; halbm metallisch – bis harzglänzend; St. grünlichgrau; H. 6, 5; G. 4; wird vom Magnete stark angezogen.

Lose und im vulkanischen Gestein der Azoren.

Runde Massen mit verglasten, eisen- oder bräunlichschwarzer Oberfläche; immer grau und von fest granitischer Textur:

Meteorstein.

Aerolith.


Die Rinde ritzt Glas; das Innere ist weich bis zerreiblich; G. 3, 4—3, 7; die Ecken der Probe lassen sich schmelzen; sie enthalten bald gediegenes Eisen, bald keines; die Hauptmasse besteht aus Olivin mit Nickel, aus Silikaten von Kalk-, Talk-, Thonerde, Eisenoxydul, Manganoxydul, Kali und Natron; auch Chromeisenstein, Zinnoxid, Magneteisen und Schwefeleisen.

Sie fallen mit Feuererscheinungen aus der Luft.

Eiförmige, langgezogene Concretionen mit concentrischen Lagen; schmutzig- und gelblichgrau; braust mit Säuren **Erbsenstein** 163
 Unvollkommene Kugeln und nierenförmige

Gestalten mit drusiger Oberfläche und krummschaliger Structur; smaragdgrün ins Grasgrüne geneigt:

Erinit.



Etwas kantendurchscheinend; H. 4—5; G. 4.



Auf Gängen in der Grafschaft Limerik.

1229. Schön smaragdgrüner Sand **Salzkupfererz** 290

Weisse, ocher- oder orangegelbe, rundliche
oder kantige Körner 1230

Dunkel- oder pistaziengrüne, kleine Körner:

Chlorophäit.



Derb; Bruch muschelrig bis erdig; durchscheinend bis undurchsichtig; wird vom Federkiele geritzt; G. 2; zu schwarzem, magnetischem Glase schmelzbar.

Im Basalt, Mandel- und Grünsteine: Rum, Island, Belfast.

Sehr nahe steht der Sideroklept aus dem Breisgau.

1230. Kantige Körner; orangeroth; ritzt leicht Glas

Hessonit 81


Rundliche Körner von wenigstens Hageldicke 1231

1231. Weiss, schmutzigweiss, gelblich 1232

Rostbraun mit gelbem Strich . **Eisensand** 650

1232. Perlglanz; ritzt Glas und schmilzt zu weissem Email:

Perlstein.



Dicht, derb, körnig, schalig, kugelig, traubig, concentrisch, stängelrig; im Bruch uneben; aschgrau, ins Gelbliche, Röthliche, Bräunliche; kantendurchscheinend; H. 6; G. 2, 3; in der Flamme

bläht er sich auf, schäumt, fliesst aber nicht zu einer Perle. Hierher gehört auch wohl der Aequinolit aus Mexico.

Schemnitz, Tokay, Euganeen, Lipari, Tharand.

Oberfläche der Körner oft glänzend; Bruch glanzlos; concentrische Lagen; von einer Stahlspitze geritzt; unschmelzbar; in Säuren mit Brausen auflöslich. **Erbsenstein** 163

1233. Weiss, graulich-, gelblich-, grünlichweiss. 1234
Gelb, röthlichgelb, röthlich, roth, braun,
grün, blaugrün oder schwarz. 1238

1234. Ritzt Glas. 1235

Wird von einer Stahlspitze geritzt. 1236

1235. Graulichweisse, runde, perlartige Körner mit Harzglanz werden von gleicher Masse zusammengehalten; leicht schmelzbar

Perlstein 1232

Unvollständige, abgerundete, glasglänzende, grünlichweisse, nur an den Kanten schmelzbare Körner; in Salpetersäure löslich; die Lösung giebt mit salpetersaurem Silber einen Niederschlag; in vulkanischem Gestein. **Sodalit** 88

1236. Färbt an den Fingern ab; erdig; weiss; die kleinen Körner sind bisweilen strahlig faserig. **Aluminit** 663

Körner dicht, nicht abfärbend, mit Aufbrausen in Säuren löslich. 1237

1237. Körner wenigstens hageldick; glänzend mit concentrischen Lagen. **Erbsenstein** 163

Körner meist kleiner, matt, ohne concentrische Lagen. **Oolith** 163

1238. Gelb; röthlichgelb, röthlich, roth, braun. 1239

Grün, blaugrün, schwarz. 1246

1239. Eckige, etwas krystallinische, harzglänzende oder schillernde Körner. 1240

- Hirse - oder hagelgrosse, nicht krystallisirte,
concretionirte, glanzlose Körner 1244
1240. Ritzt Glas 1241
- Ritzt Glas nicht 1242

1241. Orangegelb oder hyacinthroth, Körner sehr
kantig, stark durchsichtig oder durch-
scheinend, zu grauem Email schmelzbar

Hessonit 8f

Grünlichgelb, topasgelb; runde, undurchsich-
tige, harzglänzende, schmelzbare Körner

Colophonit 8f

Körner kantig, röthlich; meist irisirend;
glasglänzend; unschmelzbar; in Basalt

Chrysolith 1292

1242. Roth und glänzend, Strich orangegelb; Ge-
wicht 5,4; unschmelzbar . **Rothzinkerz** 440

Weingelb, graugelb 1243

1243. Weingelb; Harzglanz; unschmelzbar; wird in
der Flamme schwarz:

Polnadelphit.

Derb; unvollkommen blättrig, körnig; wein- und grünlichgelb;
H. 4,5—5; G. 3,76. Kommt wahrscheinlich in New-Jersey vor.

Graugelb; krystallinisch; glasartige Körner
mit zwei Spaltungsebenen; zu einem klaren,
hell bouteillengrünen Glase schmelzbar:

Xanthit.

Schwarz, grau, weiss; licht gelblichgrau, durchsichtig bis
durchscheinend; wird vom Nagel geritzt; G. 3,2.

In Kalkspath bei Amity in Nordamerika.

Körner rothbraun; von Hagelgrösse; durch
einen thonigen oder kalkigen Teig ver-
bunden **Eisenroggenstein** 650

Körner kleiner; braunroth, gelblichroth oder

- gelblich; durch geringe, gleichartige Masse verbunden 1245
- 1245.** Dunkel gefärbt; giebt in der Flamme eine magnetische Schlacke; fast ohne Aufbrausen auflöslich **Eisenoolith** 650
- 1246.** Grün oder blaugrün 1247
Schwarz 1252
- 1247.** Ritzt Glas 1248
Wird von einer Stahlspitze geritzt 1251
- 1248.** Dicht verwachsene Körner 1249
Körner verwachsen und in ein weisses, kaliges Gestein eingewachsen **Kockolith** 387
- 1249.** Unschmelzbar **Chrysolith** 292
Schmelzbar 1250
- 1250.** Blass gelbgrün:

Dolborthit.

Erscheint als sechsseitige Tafeln, welche kugelige Zusammenhäufungen bilden, oder in kleinen, schuppigen Parthien beisammen stehen. Ist vanadinsaures Kupferoxyd und findet sich auf Kupfergängen am Ural.

- Dunkel bouteillengrün; dem Gahnit ähnlich; zu einer magnetischen Schlacke schmelzbar **Gökumit** 147
- Grüngrau, erdig, matt, aus sehr kleinen, kaum sichtbaren, matten Körnern zusammengesetzt; schwach magnetisch; wird es stärker in der Hitze **Chamoisit** 23
- Grünlichblau; Glasglanz; Strich weiss; wird in der Flamme schneeweiss und zerfällt **Pyrargillit** 148
- 1252.** Platte, höchstens nussgrosse, etwas krystallinische, sammtschwarze Körner; Strich rothbraun; schmilzt zu schwarzem Email; giebt mit Phosphorsalz ein smaragdgrünes Glas:

Uranotantal.

Bruch muschelrig; stark glänzend; undurchsichtig; H. 5,5.
G. 5,6: Scheint tantalsaures Uranoxyd zu seyn, und findet sich
bei Miask.

Zollgrosse und grössere Kugeln, ohne Spur
einer Krystallisation; Strich gelbbraun; an
den Kanten in der Flamme abzurunden;
wird stark magnetisch . . . **Hisingerit 1096**

Flüssige oder klebrige Mineralien.

1253. Silberweiss; Metallglanz; Gewicht bedeutend:

Quecksilber.

Flüssig, flüchtig; G. 13,5; H. 9.


Auf Gängen: Rheinbaiern, Idria, Almaden, Mexico.

Gelb oder braun; Gewicht schwach; bitu-
minöser Geruch **1254**

1254. Gelb, röthlichgelb; sehr flüssig:

Erdöl.

Naphtha, Steinöl, Bergöl, Maltha, Bergtheer.



Wasserhell, gelb, braun; durchsichtig bis undurchsichtig;
schwimmend; G. 0,7—0,9; fettig anzufühlen; verflüchtigt sich
leicht an der Luft.

Quillt oft mit Wasserquellen aus dem Erdboden.

Braun, dunkelrothbraun; zäherflüssig, bis-
weilen klebrig **Bergtheer 1254**

1255. Klebrig **1255^a**

1255^a. Klebt die Finger zusammen; wird an der
Luft fester **Maltha 1254**

Klebt nur etwas an den Fingern und hat
die Luft keinen Einfluss darauf:

Naphtdachil.

Naphati l.

Schwarz, im Bruche kupferbraun; schwacher Oelglanz; lässt sich leicht mit dem Messer schneiden; ist in gleicher Temperatur wie Wachs schmelzbar; brennt klar und giebt wenig Russ. Auf der Insel Tscheleken.

Fettig anzufühlen; nimmt Eindrücke vom Finger an, hängt sich aber nicht daran . . . 1256

1256. Dunkelbraun; giebt dem Finger nach **Elaterit** 1199

Schmutzigbraun, gelblichbraun; meist matt

Retinit 1199

A n h a n g.

1. Beudants Anleitung die Bestandtheile von Mineralien zu bestimmen.
 2. Tabelle für Löthrohrversuche, nach Plattners Probirkunst.
 3. Zusammenstellung der Mineralien nach Beudant.
 4. Natürliches System der Mineralspecies.
 5. Charakteristik und Reihenfolge der Gebirgsarten.
- 

A n n a g e

1. Handlung Anleitung die Bestandtheile von Mineralien zu bestimmen.
2. Tabelle für Löthrobrversuche, nach Plinius's Probitkunst.
3. Zusammenstellung der Mineralien nach Handlung.
4. Vollständiges System der Mineralogie.
5. Charakteristik und Reihenfolge der Gesteine.

I. F. S. Beudants

Anleitung die Bestandtheile der Mineralien zu bestimmen.

1. Aufsuchung der electro-negativen Bestandtheile.

Erster Versuch.

Erhitzt man den zu untersuchenden Körper in einer geschlossenen Glasröhre, so erkennt man:

Hydrate	an Wassertröpfchen, die sich an kälkältern Stellen der Röhre anlegen; färbt diess Wasser einen Streifen Lakmuspapier roth, so enthält es eine Säure; färbt es kurkumapapier braun, so ist es alkalisch; färbt es Fernambukpapier schön gelb, so enthält es Fluorwasserstoffsäure.
Quecksilber	an Quecksilberkügelchen.
Antimonoxyd	an einem weissen Sublimat, welches sich durch Erhitzen von einem Punkte zum andern verflüchtigen lässt.

Zweiter Versuch.

Erhitzt man den Körper in einer beiderseits offenen Glasröhre, so unterscheidet man:

Selen	durch den Geruch nach verfaultem Kohl oder Rettig.
Arsenik u. Arsenikmetall	durch den Geruch nach Knoblauch, und ein Sublimat von grauem Arsenikmetall, das sich bei längerem Erhitzen zu weisser arseniger Säure oxydirt, die sich leicht verflüchtigt.

- Antimon u. Antimoniüre** durch weisse Dämpfe, die ein Sublimat bilden, das sich von einer Stelle zur andern verflüchtigen lässt; erhitzt man das Sublimat in der geneigten Röhre längere Zeit, so oxydirt sich das Antimonoxyd höher, und lässt sich dann nicht mehr verflüchtigen.
- Tellur** durch weisse Dämpfe, die einen Beschlag bilden, welcher sich zu durchsichtigen Tröpfchen in der Röhre zusammen schmelzen lässt.
- Schwefel** durch den Geruch nach schwefliger Säure.

Dritter Versuch.

Man pulvert das Mineral, vermengt es mit Kohle und glüht es in einer offenen Röhre, man erkennt dann:

- Arsenige Säure, Arsenite und Arseniate** . an dem Knoblauchgeruch.
- Schwefelsäure** am Geruch nach schwefliger Säure.
- Einige schwefelsaure Salze** am Schwefelwasserstoffgeruch.
- Salpetersaure Salze** . daran, dass sie während des Glühens zerfließen und mit der Kohle verpuffen.

Vierter Versuch.

Man pulvert das Mineral, mengt es mit Kohle und kohlensaurem Natron, und erhitzt die Mischung; jenes ist dann ein

- Sulfat oder ein Sulfuret** wenn die erhitzte Masse sofort, oder beim Befeuchten mit gesäuertem Wasser nach Schwefelwasserstoff riecht; die Sulfurete schwärzen, mit Kalihydrat oder kohlensaurem Natron zusammengeschnitten, mit Wasser aufgelöst und filtrirt, ein hineingestelltes blankes Silberblech; die Sulfate thun diess nicht, die Lösung wird aber nach dem Ansäuern mit salpetersaurem Baryt weiss gefällt.

Fünfter Versuch.

Man übergießt die Probe mit Salzsäure und unterscheidet dadurch:

- kohlensaure Salze** . . . wenn sie sich unter Aufbrausen auflösen, das entweichende Gas geruchlos ist und befeuchtetes Lakmuspapier vorübergehend röthet.
- borsaure Salze** . . . wenn sich ein weisser Niederschlag bildet, der, mit Alkohol übergossen, dessen Flamme grün färbt.
- einige Silikate** . . . wenn bei der Auflösung eine durchscheinende Gallerte zurück bleibt.
- Hyperoxyde** . . . wenn sich gelbes Chlorgas bildet.

Sechster Versuch.

Man schmilzt den Körper mit Phosphorsalz in einer offenen Glasröhre, so erkennt man:

- das Fluor** . . . an Dämpfen, welche das Glas angreifen und Fernambukpapier gelb färben.
- das Chlor** . . . wenn man am Platindraht Kupferoxyd in Phosphorsalz auflöst und dann die Probe zusetzt; ist Chlor darin, so färbt sich die Flamme schön blau, ins Purpurfarbene ziehend.
- Jod** . . . wenn sich bei diesem Versuche die Flamme grün färbt.
- Brom** . . . wenn blaugrün.

Siebenter Versuch.

Man erhitzt oder schmilzt die Probe mit kohlensaurem Natron; es bildet sich ein in Wasser lösliches Salz, welches die im Minerale befindliche Säure, an Natron gebunden, enthält; und es bleibt ein in Wasser unlöslicher Rückstand, wenn das Mineral eine Erde oder ein Metalloxyd enthält. Die Lösung sättigt (neutralisirt) man mit Salpetersäure, und unterscheidet dann:

- Phosphorsäure** . . . wenn die Flüssigkeit mit salpetersaurem Silber einen gelben Niederschlag giebt; man kann auch zu der salzsauren Lösung einen Tropfen Eisenchlorid und dann essigsaures Kali im Ueberschusse zusetzen, wor-

- auf sich ein flockig gelatinöser, weisser oder bräunlicher Niederschlag von phosphorsaurem Eisenoxyd bildet.
- Chromsäure** wenn sie mit Silberlösung einen tief purpurrothen, mit Bleizucker schön gelben Niederschlag giebt.
- Schwefelsäure** wenn salpetersaurer Baryt einen weissen, in Salpetersäure unlöslichen Niederschlag,
- Arseniksäure** wenn Silberlösung einen braunen Niederschlag,
- Chlor** wenn Silberlösung einen weissen Niederschlag giebt.
- Entsteht beim Neutralisiren mit Salpetersäure ein Niederschlag, so hat man
- Molybdänsäure** wenn der weisse Niederschlag in Säuren löslich ist, und beim Kochen mit verdünnter Salzsäure und metallischem Zink blau wird; in Phosphorsalz im Reductionsfeuer mit grüner, in Borax mit brauner Farbe löslich.
- Wolframsäure** wenn der weisse Niederschlag in Salzsäure unlöslich ist und beim Erhitzen gelb wird. Zink bewirkt auch eine blaue Farbe. Phosphorsalz giebt im Reductionsfeuer eine blaue, Borax eine gelbe Perle.
- Tantalsäure** wenn der Niederschlag nach dem Erhitzen weiss bleibt. In Borax und Phosphorsalz zum klaren, farblosen Glase löslich.
- Kieselerde** wenn der Niederschlag gallertartig ist; die Kieselerde löst sich in Phosphorsalz fast gar nicht, und schmilzt mit Soda zu einem farblosen Glase.
- Titansäure** wenn nach gleicher Behandlung der Rückstand mit Phosphorsalz im Reductionsfeuer eine violette Perle giebt, die durch Zusatz von Eisenoxyd blutroth wird.

Alle Titanverbindungen erkennt man leicht, wenn man sie mit zweifach schwefelsaurem Kali im Platinlöffel schmilzt, die geschmolzene Masse mit Wasser ausläugt, und aus der Lösung die Titansäure durch Kochen fällt, und mit oder ohne Zusatz von Eisenoxyd in einer Phosphorsalzperle auflöst.

Thonerde wenn er sich in überschüssiger Salpetersäure leicht löst, und die Auflösung durch Aetzammoniak einen flockigen Niederschlag giebt, der sich in Aetzkali wieder auflöst.

Bemerkungen zu diesen Versuchen.

Beim Erhitzen der Probe in der geschlossenen Röhre erkennt man auch:

Seleniüre an einem rothen Sublimat.
Arsenik u. Arseniüre. an einem schwarzen, aus kleinen Metallkrystallen bestehenden Sublimat.
Arsenige Säure und Arseniate an einem, aus kleinen, weissen Krystallen bestehenden Sublimate.
Tellur u. Telluriüre . an einem grauen, nicht krystallinischen Sublimate.
Antimon- u. antimonige Säure die Probe, auf Kohle geschmolzen, verhält sich wie Antimonoxyd.

Auch könnte man die Probe mit Salpeter erhitzen, und würde dann unterscheiden:

Kohle wenn die Mischung während des Erhitzens schmilzt, und die Kohle verbrennt.
Osmium die Masse entwickelt einen weissen, chlorähnlich riechenden Rauch; giebt der schwarze Rückstand mit Salzsäure eine blaue Farbe, so ist auch Iridium dabei.

Man könnte den Körper auch mit Schwefelsäure oder saurem schwefelsaurem Kali in einem Glaskolben behandeln, und würde dann erkennen:

Fluor	an den das Glas zerfressenden Dämpfen.
Jod	an violetten Dämpfen
Chlor	an den eigenthümlich riechenden, zum Husten reizenden Dämpfen, die sich bilden, wenn der Probe Mangansuperoxyd zugesetzt ist.
Brom	wenn sich bei gleicher Behandlung röthliche Dämpfe entwickeln.
Salpetersäure	wenn die mit Kupferfeilspänen vermischte Probe röthliche Dämpfe giebt.

2. Aufsuchung der Basen.

Achter Versuch.

Man erhitzt die Probe auf Kohle und erkennt dann:

Cadmium	an dem braunrothen Beschlag der Kohle, der sich sofort zeigt.
-------------------	---

Neunter Versuch.

Man erhitzt die Probe, mit kohlenisaurem Natron vermisch, auf Platinblech und entdeckt dann:

Mangan	wenn die geschmolzene Masse grün ist.
Chrom	wenn sie im Reductionsfeuer grün, in der Oxydationsflamme gelb wird.

Zehnter Versuch.

Man röstet das Mineral und schmilzt es dann mit Borax; dann färbt

Kobalt	die Perle blau.
Nickel	die Perle braun.

Enthält das Nickel Kobalt in einiger Menge, so bekommt man eine blaue Perle. Schmilzt man diese mit einem Goldkörnchen auf Kohle, so legirt sich das Gold mit Nickel, nicht mit Kobalt. Schmilzt man dann das Gold im Oxydationsfeuer mit Borax, so kommt die reine Nickelreaction (braune Perle) zum Vorschein.

Eilfter Versuch.

Man löst das Mineral, nöthigenfalls nach vorgängigem Zusammen-schmelzen mit kohlensaurem Natron und Ausziehen mit Wasser, in Salpetersäure auf; entwickeln sich dabei röthliche Dämpfe, so enthält die Probe ein gediegenes Metall, oder ein Schwefel- oder Arsenik- etc. Metall. Bleibt nach längerem Kochen ein weisser Rückstand, so deutet der auf Antimon oder Zinn, (auch wohl Blei, wenn sich durch Lösen eines Schwefelmetalles schwefelsaures Blei gebildet haben sollte); er ist

Antimon wenn er, mit Kohle gemengt und in offener Glasröhre erhitzt, ein Sublimat giebt, das sich durch Hitze von einem Puncte zum andern verjagen lässt.

Zinn wenn er sich weder schmelzen noch sublimiren lässt. Auf Kohle mit Soda erhitzt, bewirkt Antimon einen starken weissen Antimonbeschlag und man erhält kein Metallkorn. Zinnoxid giebt dagegen nur einen schwachen, weissen Beschlag und geschmeidige, weisse Zinnkörnchen.

In der Auflösung selbst erkennt man leicht:

Wismuth wenn ein Tropfen der Auflösung, den man in Wasser fallen lässt, diess sofort weiss färbt.

Silber wenn ein Tropfen auf einer blanken Kupferplatte einen weissen, krystal-linischen Metallniederschlag bildet.

Quecksilber wenn sich auf der Kupferplatte ein grauer Niederschlag bildet, der sich zu Tröpfchen vereinigt, sich mit dem Kupfer amalgamirt und ihm beim Reiben Silberglanz verleiht; der Nieder-schlag verflüchtigt sich beim Erhitzen.

Kupfer wenn die Auflösung auf einer Eisen-platte einen Kupferüberzug bildet. Kaliumeisencyanür fällt braun, Am-moniak im Ueberschuss zugesetzt, giebt klare blaue Lösung.

- Nickel** Ammoniak im Ueberschuss zugesetzt giebt eine blaue Lösung, Eisen fällt aber kein Metall.
- Zink** wenn die Flüssigkeit mit Aetzammoniak einen weissen Niederschlag giebt, der sich im Ueberschuss des Alkali's wieder auflöst. Cadmium reagirt eben so, wird aber von Kali permanent niedergeschlagen, wogegen Zinkoxyd leicht von Kali gelöst wird.
- Prüft man jetzt einzelne Proben der mit Wasser verdünnten Flüssigkeit mit verschiedenen Reagentien, so entdeckt man:
- Eisen** wenn ein Tropfen von Cyaneisenkalium einen dunkelblauen Niederschlag hervorbringt.
- Blei, Baryt u. Strontian** wenn in der etwas mit Wasser verdünnten Auflösung Schwefelsäure oder ein schwefelsaures Salz einen weissen Niederschlag bewirkt.
- Blei** wenn der Niederschlag durch Zufügung von Schwefelwasserstoffammoniak schwarz wird.
- Baryt** wenn der Niederschlag hierdurch nicht schwarz wird und die Löthrohrflamme blass gelblichgrün färbt. Gypslösung giebt sofort einen Niederschlag.
- Strontian** wenn der Niederschlag nicht schwarz wird, und die Löthrohrflamme schwach purpurroth färbt. Gypssolution giebt beim Erwärmen erst nach einiger Zeit eine Trübung.
- Thonerde** wenn Aetzammoniak einen weissen, flockigen, nicht bei überschüssigem Ammoniak, wohl aber in Aetzkali auflöslichen, und aus dieser Auflösung durch Kochen mit Salmiak fällbaren Niederschlag bildet.
- Kalkerde** wenn die, mit Aetzammoniak versetzte, nicht gefällte, oder klar über dem Niederschlage stehende Flüssig-

keit durch Kleesalz weiss niederschlägt. Gypssolution giebt keinen Niederschlag.

Bittererde wenn Kleesalz keinen, Phosphorsaures Natron, nach Zufügung von Aetzammoniak, aber einen krystallinischen Niederschlag hervorbringt.

Zwölfter Versuch.

Zur Entdeckung der Alkalien wird der Körper, nöthigenfalls nach vorgängigem Zusammenschmelzen mit kohlen-saurem Baryt, in Säuren aufgelöst und stark verdünnt; dann durch kohlen-saures Ammoniak gefällt, und das Abfiltrirte auf Platin verdampft und geglüht; bleibt ein Rückstand, so ist diess ein Alkali, und man unterscheidet:

Kali wenn Platinchlorid mit dem Rückstande einen gelben Niederschlag bildet, Weinsteinsäure nach einiger Zeit einen weissen. Violette Löthrohrflamme.

Lithion wenn die Substanz die Platinplatte während des Glühens fleckig macht. Färbt die Löthrohrflamme roth.

Natron wenn diese Erscheinungen nicht eintreten. Antimonsaures Kali giebt einen weissen Niederschlag. Färbt die Löthrohrflamme gelb.

Ammoniak zeigt sich in auflöslichen Salzen, wenn bei Zusatz von Aetzkalilauge der Ammoniakgeruch hervortritt und bei Annäherung eines mit Säure befeuchteten Glasstabes sich weisse Nebel bilden.

Dreizehnter Versuch.

Nur in Königswasser auflöslich sind:

Gold dessen Auflösung die Haut dunkelroth färbt, und mit Zinnchlorür einen purpurfarbenen Niederschlag bildet. Durch Eisenvitriol wird Gold metallisch ausgefällt.

298
Platin dessen Auflösung mit Kali- und Ammoniaksalzen einen gelben Niederschlag giebt.

Bemerkungen zu den letzten 6 Versuchen.

Nach der Behandlung der Probe mit Salpetersäure kann man noch entdecken:

Palladium wenn die Auflösung auf einer Kupferplatte einen Niederschlag bildet, die Auflösung aber dunkelbraun und durch Zinnchlorür schwarz gefällt wird.

Thonerde würde nach Zufügung eines schwefelsauren Salzes, nicht durch Zufügung von Schwefelsäure, einen weissen Niederschlag bilden.

In dem durch überschüssiges Aetzammoniak erhaltenen Niederschlag entdeckt man noch:

Beryllerde Sie verhält sich wie Thonerde, wird aber, mit Kobaltsolution befeuchtet und geglüht, schwarz; während Thonerde dadurch schön blau, und eine Mischung beider schmutzig blau wird. Die Beryllerde kann man durch kohlensaures Ammoniak aus der Thonerde ausziehen, und durch Kochen wieder fallen.

Uran der durch Ammoniak erhaltene Niederschlag oder auch die Probe selbst giebt mit Phosphorsalz in der Reductionsflamme ein grünes Glas, in der Oxydationsflamme eine heiss gelb erscheinende, beim Erkalten grün werdende Perle.

Der bei der Behandlung mit Aetzkali gebliebene Rückstand wird mit Salpetersäure gelöst, scharf eingetrocknet, in Wasser gelöst und mit oxalsaurem Ammoniak weiss gefällt; man erkennt dann:

Cerium wenn der Niederschlag durch Calciniren zimmtbraun wird, und mit Phosphorsalz ein rothes, kalt farb-

loses Glas bildet. Leuchtet beim Glühen stark. Die Lösung des Cers wird durch schwefelsaures Kali, aber nicht durch Schwefelsäure weissgefällt.

Zirkonerde der Niederschlag bildet mit Phosphorsalz schwer ein undurchsichtiges, farbloses Glas.

Yttererde der Niederschlag bildet mit Phosphorsalz leicht ein durchsichtiges Glas.

II. Tabelle für

nach Plattners

Verhalten der Erden.	Für sich auf Kohle.	Zu Borax auf Platin-draht.
1. Baryterde.	Als Hydrat schmilzt sie, kocht, schwillt an, gesteht auf der Oberfläche und zieht sich dann mit hastigem Kochen in die Kohle; die kohlen-saure schmilzt zu klarem, kalt emailweissem Glase, wird kaustisch und zieht in die Kohle.	Die kohlen-saure unter ren Glase löslich, das satz emailweiss geflat bei noch grösserem Zu kühlen emailweiss und erde wird.
2. Strontianerde.	Als Hydrat wie Baryt-erde; die kohlen-saure schmilzt nur an den Kanten und schwillt blumenkohlartig auf; die Verzweigungen geben ein glänzendes Licht und reagiren alkalisch.	
3. Kalkerde.	Die kaustische verändert sich nicht; die kohlen-saure wird kaustisch, heller, leuchtender, alkalisch reagirend und fällt, mit Wasser befeuchtet, zu Pulver.	Leicht zu klarem Glase löslich, das unklar ge-flattert werden kann; die kohlen-saure unter Brausen löslich; grösserer Zusatz giebt ein klares Glas, das beim Erkalten krystallisirt.
4. Talkerde.	Die kohlen-saure wird zersetzt, leuchtet dann im Feuer und reagirt alkalisch.	Wie Kalkerde, wird aber nicht so stark krystal-linisch.

Löthrohrversuche

Probirkunst.

Zu Phosphorsalz auf Platindraht.	Zu Soda auf Kohle.	Zu Kobaltsolution im Oxydationsfeuer.
Brausen zu einem klaren bei einem gewissen Zusatz werden kann, und setzt von selbst beim Abweisser als die Kalk-	Schmilzt damit zusammen und zieht in die Kohle.	Zu braun - oder ziegelrother Kugel schmelzbar, die beim Abkühlen die Farbe verliert und bald zu grauem Pulver zerfällt.
	Die kaustische unauflöslich; die kohlen-saure giebt mit gleichviel Soda ein klares, kaltmilchweisses Glas, welches in starkem Feuer kocht; die Erde wird dann kaustisch und geht in die Kohle.	Schmilzt nicht zur Kugel, nimmt aber eine schwarze oder schwarzgraue Farbe an.
In grosser Menge (die kohlen-saure mit Brausen) zu klarem Glase löslich; bei mehr Zusatz unklar zu flattern; gesättigt wird das Glas beim Abkühlen milchweiss.	Unauflöslich; die Soda geht in die Kohle und lässt die Erde zurück.	
		Nimmt nach langem Blasen eine schöne fleischrothe Farbe an.

Verhalten der Erden.	Für sich auf Kohle.	Zu Borax auf Platindraht.
5. Thonerde.	Unveränderlich.	Langsam zu klar bleiben bei zu grossem Zusatz
6. Beryllerde.	Unveränderlich.	In grosser Menge zu löslich, welches gesät
7. Yttererde.	Unveränderlich.	
8. Zirkonerde.	Unschmelzbar; aus dem Sulfate bereitet leuchtet sie sehr stark.	Wie Beryllerde.
9. Thorerde.	Unveränderlich.	In geringer Menge zu bei voller Sättigung kalt wenn es kalt klar ist, werden kann.
10. Kieselerde oder Kieselsäure.	Unveränderlich.	Langsam zu einem klaren, schwer schmelzbaren, nicht flatterbaren Glase löslich.

Verhalten der Metalloxyde.	Für sich auf Kohle.		Zu Borax auf
	Im Oxydations- Feuer.	Im Reductions- Feuer.	Im Oxydations- Feuer.
11. Ceroxyd.	Das Oxydul verwandelt sich in das im Reductionsfeuer unveränderliche Oxyd.		Zu rothem oder dunkelgelben, kalt gelben, meist flatterbarem Glase löslich.

Zu Phosphorsalz auf Platindraht.	Zu Soda auf Kohle.	Zu Kobaltsolution im Oxydationsfeuer.
bendem Glase löslich; ein unklares Glas.	Schwillt etwas an und giebt eine ungeschmolzene Verbindung.	Bekommt nach langem Blasen eine schöne blaue Farbe.
klarem, flatterbaren Glaseigt kalt milchweiss wird.		Schmilzt nicht; färbt sich aber dunkelgrau oder schwarz.
Löst sich langsamer, als in Borax, und giebt schneller ein unklares Glas.	Unauflöslich.	
klarem Glase löslich, das milchweiss ist, das aber, nicht unklar geflattert		
In kleiner Menge zu klarem Glase löslich; das Ungelöste wird halbdurchsichtig.	Unter starkem Brausen zu klarem Glase löslich.	Wird mit wenig Solution schwach blau; mit mehr schwarz oder dunkelgrau; dünne Kanten sind zu röthlichblauem Glase schmelzbar.

Platindraht.	Z. Phosphorsalz auf Platindraht.		Zu Soda.
Im Reductions-Feuer.	Im Oxydations-Feuer.	Im Reductions-Feuer.	
Das Glas wird blasser, gelber; kalt farblos; bei starker Sättigung kalt emailweiss u. krystallinisch.	Wie zu Borax, die Farbe verschwindet aber beim Abkühlen ganz.	Das Glas ist immer farblos und unterscheidet so das Cer von Eisen.	Unauflöslich.

Verhalten der Metalloxyde.	Für sich auf Kohle.		Zu Borax auf
	Im Oxydations- Feuer.	Im Reductions- Feuer.	Im Oxydations- Feuer.
12. Mangan- oxyd.	Schmilzt nicht, wird aber in starkem Feuer braun.		Warm violett, kalt roth; bei viel Zusatz undurchsichtig.
13. Zinkoxyd.	Erhitzt gelb, kalt wieder weiss; unschmelzbar; bekommt, mit Kobaltsolution befeuchtet, eine schöne grüne Farbe.	Verflüchtigt nach und nach, u. beschlägt die Kohle mit weiss. Rauch.	Zu klarem, bei viel Zusatz emailweiss flatterbaren Glase schmelzb.
14. Kobaltoxyd.	Unveränderlich.		Färbt smalteblau, fast schwarz.
15. Nickeloxyd.	Unveränderlich.		Warm violett, kalt rothbraun.
16. Eisenoxyd.	Unveränderlich.	Wird schwarz u. magnetisch	Warm gelb bis dunkelroth; kalt farblos bis dunkelgelb.

Platindraht.	Zu Phosphorsalz auf Platindraht.		Zu Soda.
Im Reductions- Feuer.	Im Oxydations- Feuer	Im Reductions- Feuer.	
Das mässig gefärbte Glas wird farblos; auf Kohle und mit Zinn leichter zu reduciren.	Erst bei viel Zusatz ein violettes Glas; giebt beim Kochen Gas ab.	Wird sofort farblos; das Glas fliesst ruhig.	Im Oxydationsfeuer in geringer Menge zu durchsichtiger grüner, kalt undurchsichtiger blaugrüner Masse schmelzbar.
Das gesättigte Glas wird emailweiss, auf Kohle zu verflüchtigen u. Zinkbeschlag.	Das gesättigte Glas wird beim Abkühlen von selbst emailweiss	Wie zu Borax.	Unauflöslich, auf Kohle leicht zu reduciren. Zinkbeschlag.
bei vielem Zusatz	Die Farbe ist nicht so intensiv, und wird kalt etwas heller.		Bei wenig Zusatz eine durchsichtige, schwach rothe, kalt graue Masse.
Das Glas wird grau und trübe, zuletzt farblos.	Röthlich, braunroth, kalt gelb bis röthlichgelb.	Das oxydhaltige Glas unveränderlich, auf Kohle mit Zinn zuletzt farblos.	Unauflöslich; auf Kohle zu magnetischen, metallischen Theilchen reducirbar.
Bouteillengrün; auf Kohle mit Zinn vitriolgrün.	Gelblich bis dunkelroth; beim Abkühlen gelb bis braunroth; kalt farblos bis grün oder bräunlichroth.	Bei grösserm Zusatz warm roth, beim Abkühlen gelb, dann grünlich, kalt röthlich; durch Zinn beim Erkalten zuletzt farblos.	Unauflöslich; auf Kohle zu einem grauen, magnetischen Pulver zu reduciren.

Verhalten der Metalloxyde.	Für sich auf Kohle.		Zu Borax auf
	Im Oxydations- Feuer.	Im Reductions- Feuer.	Im Oxydations- Feuer.
17. Cadmium- oxyd.	Auf Platinblech unveränderlich.	Verschwindet bald, und be- schlägt die Kohle mit einem rothen oder dunkelgel- ben Pulver.	In Menge zu kla- rem, gelblichen, kalt fast farblos- sen, emailweiss flatterbaren Glase schmelzbar; ge- sättigt kalt von selbstemailweiss.
18. Bleioxyd.	Mennige auf Pla- tinblech wird schwarz, dann gelbes Oxyd, wel- ches zu schön dunkelgelbem Glase schmilzt.	Auf Kohle mit Brausen zu einem Bleikorn reducirt, welches sich all- mählig verflüch- tigt und die Kohle gelb beschlägt.	Warm gelb und klar; kalt farb- los, bei sehr viel Zusatz emailgelb.
19. Wismuth- oxyd.	Schmilzt auf Pla- tinblech zu einer dunkelbraunen, kalt blassgelben Masse.	Auf Kohle schnell zum spröden Me- tallkorn reducirt; gelber Beschlag.	Glas klar; warm gelb bis gelblich- roth; kalt farb- los bis opalartig.
20. Uranoxyd.	Das Oxyd wird zu Oxydul redu- cirt; wird schwarz, aber schmilzt nicht.		Verhält sich wie Eisenoxyd; stark gesättigtes Glas ist aber emailgelb flatterbar.
21. Kupferoxyd.	Schmilzt zu einer schwarzen Kugel, die sich bald auf der Kohle aus- breitet und auf der untern Seite oxydirt.	Das Oxyd wird reducirt und leuchtet, wird aber beim Erkal- ten an der Ober- fläche wieder oxydirt und schwarz.	Warm grün bis undurchsichtig; kalt blau bis grün- lichblau u. durch- sichtig.

Platindraht.	Z. Phosphorsalz auf Platindraht.		Zu Soda.
Im Reductions- Feuer.	Im Oxydations- Feuer.	Im Reductions- Feuer.	
Auf Kohle beginnt das Glas zu kochen, und entsteht ein dunkelgelber Beschlag.	Gesättigt warm farblos, kalt milchweiss.	Auf Kohle langsam zu reduciren; schwacher Beschlag.	Unauflöslich; auf Kohle sogleich zu reduciren; dunkelgelber Beschlag.
Das oxydhaltige Glas breitet sich auf Kohle aus, wird trübe, kocht und wird dann wieder klar.	Wie zu Borax.	Das oxydhaltige Glas wird auf Kohle graulich und trübe.	Auf Platindrath im Oxydationsfeuer ein klares, kalt undurchsichtiges und gelbes Glas. Auf Kohle sofort reducirt.
Auf Kohle wird das Glas grau und trübe, dann kochend, zuletzt wieder klar.	Warm farblos bis gelb; kalt farblos bis emailweiss	Auf Kohle mit Zinn warm farblos, kalt schwarzgrau und undurchsichtig.	Auf Kohle sofort reducirt.
Wie Eisenoxyd; das grüne, gesättigte Glas kann schwarz geflattert werden.	Warm gelb, kalt gelbgrün.	Das Oxydhaltige Glas wird schön grün.	Unauflöslich; die Masse wird gelbbraun; bei mehr Zusatz geht das Oxyd in die Kohle.
Wird farblos, kalt aber roth und undurchsichtig; bei starkem Feuer metallische Ausfüllung; durch inn kalt braunroth u. undurchsichtig.	Warm grün, kalt blau bis grünlichblau.	Warm grün; kalt undurchsichtig und braunroth.	Auf Platindrath warm grün; kalt farblos und undurchsichtig; auf Kohle leicht zu reduciren.

Verhalten der Metalloxyde.	Für sich auf Kohle.		Zu Borax auf
	Im Oxydations- Feuer.	Im Reductions- Feuer.	
22. Silberoxyd.	Wird sofort reducirt.		Wird theils aufgelöst, theils reducirt; das Glas kalt milchweiss oder opalartig.
23. Quecksilberoxyd.	Wird sofort reducirt und verflüchtigt.		
24. Platinoxid. 25. Palladiumoxyd. 26. Rhodiumoxyd. 27. Iridiumoxyd.	Werden leicht reducirt; die Metalltheilchen lassen sich aber nicht zur Kugel schmelzen.		Werden, ohne reducirt; das re- aber unschmelz-
28. Goldoxyd.	Wird schon durch Glühen zu Metall reducirt.		Wird ohne sich die Soda geht da
29. Zinnoxid.	Das Oxydul brennt wie Zunder, und verwandelt sich in stark leuchtendes, aber unveränderliches Oxyd; welches mit Kobaltsolution blaugrün wird.	Das Oxyd kann bei starkem Feuer zu Zinn reducirt werden.	Giebt bei geringer Menge ein klares Glas, gesättigt, kalt geworden und bis zum schwachen Glühen erhitzt, wird es unklar, und zeigt undeutliche Krystallisation.

Platindraht.		Z. Phosphorsalz auf Platindraht.		Zu Soda.
Im Reductions- Feuer.	Im Oxydations- Feuer	Im Reductions- Feuer.		
Das oxydhaltige Glas wird erst graulich, dann, nach der Ausfällung des Silbers, klar und farblos.	Gelbliches bis opalfarbiges, gegen Tageslicht gelblich, gegen Feuerscheinröthlich aussehendes Glas.	Wie zu Borax.	Wird sofort reducirt.	
			Wird im Glaskolben reducirt und in kleinen Kügelchen sublimirt.	
sich aufzulösen ducirte Metall ist bar.	Wie zu Borax.		Wie zu Borax, die Soda geht aber in die Kohle.	

aufzulösen, reducirt, und kann zum Goldkörn geschmolzen werden bei in die Kohle.

Wenig Oxyd haltendes Glas ist unveränderlich; aus viel Oxyd haltendem kann auf Kohle ein Theil reducirt werden.	In geringer Menge langsam zu klarem Glase auflöslich.	Das oxydhaltige Glas ist unveränderlich.	Auf Platindrath verbindet es sich mit Soda unter Brausen zu einer aufgeschwollenen, ungeschmolzenen Masse. Auf Kohle leicht zu reduciren.
---	---	--	---

Verhalten der Metalloxyde.	Für sich auf Kohle.		Zu Borax auf
	Im Oxydations- Feuer.	Im Reductions- Feuer.	Im Oxydations- Feuer.
30. Antimon- oxyd.	Sublimirt unver- ändert von einer Stelle zur an- dern.	Wird reducirt und verflüchtigt; weisser Be- schlag; grünlich- blaue Färbung der Flamme.	Warm klar und gelblich; kalt fast farblos; auf Kohle durch Zinn nicht verändert.
31. Chrom- oxyd.	Unveränderlich.		Warm gelb bis dunkelroth, kalt gelbgrün bis grün
32. Telluroxyd.	Schmilzt und reducirt sich mit Brausen; das Metall verflüchtigt sich und giebt weissen Beschlag.		Klares, farbloses, werdendes Glas.
33. Molybdän- säure.	Schmilzt und wird von der Kohle eingesogen; kann zu grauem, me- tallischem Pulver reducirt werden.		Warm klar und gelb bis dunkel- roth, kalt farb- los bis email- blaulichgrau.
34. Wolfram- säure.	In nicht zu star- kem Feuer un- veränderlich.	Wird schwarz ohne zu schmel- zen.	Warm farblos bis gelb; kalt farb- los bis email- weiss.

Platindraht.	Z. Phosphorsalz auf Platindraht.		Zu Soda.
Im Reductions- Feuer.	Im Oxydations- Feuer.	Im Reductions- Feuer.	
Das Glas wird trübe und grau; nach Verflüchtigung des Oxyds wieder klar; mit Zinn wird es aschgrau bis schwarz.	Unter Kochen zu klarem, warm schwach gelblichen Glase löslich.	Auf Kohle wird das gesättigte Glas trübe, später aber wieder klar; durch Zinn wird es grau, später wieder klar.	Auf Kohle leicht zu reduciren; das Metall raucht aber allmählig fort, und bewirkt einen weissen Beschlag.
Kalt und warm schön grün; Zinn verändert es nicht.	Warm röthlich; kalt schön grün	Die Farben etwas dunkler.	Auf Platindrath im Oxydationsfeuer dunkel braungelb; kalt undurchsichtig gelb; im Reductionsfeuer undurchsichtig und kalt grün.
auf Kohle grau	Wie zu Borax.		Auf Platindrath wird das farblose Glas kalt weiss; auf Kohle reducirt.
Wird braun und undurchsichtig.	Warm klar und gelbgrün, kalt fast farblos, auf Kohle grün.	Warm dunkel-schmutziggrün, kalt schön grün.	Auf Platindrath unter Brausen zu klarem, kalt milchweissen Glase schmelzbar. Auf Kohle wird die Masse eingesogen und zum Theil reducirt.
Warm farblos, gelb oder dunkelgelb; und dann unter der Abkühlung gelblichbraun.	Farblos; erst bei starker Sättigung in der Wärme gelb.	Schön und rein blau, durch Beimischung von Eisen blutroth, durch Hinzufügen von Zinn wieder blau.	Auf Platindrath warm dunkelgelb, kalt krystallinisch und undurchsichtig weiss oder gelblich.

Verhalten der Metalloxyde.	Für sich auf Kohle.		Zu Borax auf
	Im Oxydations- Feuer.	Im Reductions- Feuer.	
35. Vanadinsäure.	Schmelzbar; der die Kohle berührende Theil wird reducirt und zieht sich in die Kohle; graphitartiges Vanadinsuboxyd bleibt zurück.		Klares, farbloses bis gelbes Glas.
36. Tantalssäure.	Unveränderlich.		Glas klar und zu flattern, bei emailweiss.
37. Titansäure.	Unveränderlich; wird durch Kobalt- solution schwarz oder dunkelgrau.		Warm farblos bis gelb; kalt farblos, flatterbar bis emailweiss.

Platindraht.	Z. Phosphorsalz auf Platindraht.		Zu Soda.
Im Reductions- Feuer.	Im Oxydations- Feuer.	Im Reductions- Feuer.	
Gelbes Glas wird bräunlich und kalt chromgrün.	Wie zu Borax.		Schmilzt damit zu- sammen und zieht in die Kohle.
farblos; unklar mehr Zusatz kalt	Leicht und in grosser Menge zu klarem, farblosem Glase schmelz- bar, das sich nicht unklar flat- tern lässt.		Verbindet sich da- mit mit Brausen; schmilzt nicht und reducirt nicht.
Warm gelb, dun- kelgelb oder braun, und dann emailblau zu flat- tern.	Warm gelb, kalt farblos.	Warm gelb, kalt schön violett; bei Eisengehalt braungelb oder braunroth; durch Zinnzusatz wie- der violett.	Mit Brausen und Spritzen zu dunkel- gelbem Glase lös- lich; kalt weiss- grau oder weiss; beim Aufhören des Glühens krystalli- sirendes Glas, und wird wieder weiss glühend.

Zusammenstellung

der Beschlge, welche einige Metalle auf Kohle absetzen.

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Selen | Giebt nicht weit von der Probe einen stahlgrauen, metallisch schwach glnzenden Beschlag, der bei der Berhrung mit der Reductionsflamme seine Stelle mit schnem blauen Scheine verlsst. |
| 2. Tellur | Giebt in gleicher Entfernung einen weissen Oxydbeschlag mit rother oder dunkelgelber Kante; mit der Reductionsflamme angeblasen, verschwindet er mit grnem Schein. |
| 3. Arsenik | Beschlag weit von der Probe, weiss, in dnner Lage graulich, leicht fortzublasen. |
| 4. Antimon | Beschlag nher bei der Probe, weiss, in dnnen Lagen blulich, durch die Reductionsflamme mit schwach graulichblauem Scheine zu vertreiben, weniger flchtig als der Arsenikbeschlag. |
| 5. Wismuth | Beschlag warm dunkelorangegeb, kalt citrongelb und in dnnen Lagen blulich; ist nher bei der Probe als der Antimonbeschlag und leicht zu vertreiben. |
| 6. Blei | Beschlag warm dunkelcitrongelb, kalt schwefelgelb und in dnnen Lagen blulich, brigens wie Wismuth. |

7. **Kadmium** Beschlag nur kalt deutlich, rothbraun, in dünnen Lagen gelb; leicht fortzutreiben.
8. **Zink** Beschlag näher bei der Probe, warm gelb und stark leuchtend; kalt fast weiss; durch die Oxydationsflamme nicht fortzublasen, aber nach Zufügung von Kobaltsolution grün zu färben.
9. **Zinn** Beschlag warm schwach gelb und ziemlich stark leuchtend; kalt weiss und unmittelbar an der Probe; wird durch Kobaltsolution und nochmaliges Glühen blaugrün.
10. **Silber** Beschlag schwach dunkelroth; carmoisinroth bei Gegenwart von etwas Blei und Antimon.
11. **Schwefel-, Chlor-, Brom- und Jodmetalle** Geben oft weisse Beschläge, welche im Reductionsfeuer, ohne einen Schein zu geben, verschwinden.

P r o b e n

auf Alkalien, nicht metallische Körper und Säuren.

1. **Alkalien** Ihre Salze bilden gepulvert mit Soda auf Platinblech in der Oxydationsflamme eine klare fließende Masse ohne Ausfällung.
2. **Kali** Färbt, mit der Spitze der blauen Flamme angeblasen, die äussere Flamme violett, geringer Lithion- oder Natrongehalt verhindert die Reaction
3. **Natron** Färbt die äussere Flamme stark wachsgelb oder röthlichgelb.
4. **Lithion** Färbt die äussere Flamme stark carminroth, selbst bei Gegenwart von mehr Kali; geringer Natrongehalt verhindert aber die Reaction.

5. Ammoniak Lässt sich durch den eigenthümlichen Geruch erkennen, wenn man die Salze mit Soda mengt und im Glaskolben erwärmt.
6. Wasser Entwickelt sich beim starken Glühen im Glaskolben und setzt sich an dessen kältern Theilen ab.
7. Salpetersäure. Die damit gebildeten Salze detoniren mit Kohle und entwickeln im Glaskolben eine braunrothe oder gelbe, stark riechende salpetrige Säure, wenn man sie allein oder mit doppelt schwefelsaurem Kali gemengt darin glühet.
8. Schwefel oder Schwefelsäure Man erkennt sie, wenn die Probe beim Erhitzen auf Kohle nicht nach Selen riecht, durch Zusammenschmelzen mit 2 Theilen Soda und 1 Theil Borax im Reductionsfeuer und Auflegen der mit Wasser befeuchteten, hepatisch riechenden Masse auf ein Silberblech, das Silber wird dann schwarz oder doch dunkelbraun.
Weisse Sulfate geben mit kiesel-saurem Natron im Reductionsfeuer ein kalt gelb bis rothes Glas.
9. Phosphorsäure Mit Borsäure geschmolzen und dann mit feinem Eisendraht geglühet, geben die Verbindungen der Säure geschmolzenes, sprödes Phosphoreisen. Eine Splitter der Probe in Schwefelsäure getaucht, färbt, mit der Spitze der blauen Flamme im Dunkeln angeblasen, die äussere Flamme eigenthümlich blaugrün; sicherer ist der erste Weg.
10. Chlor Man schmilzt am Platindraht in der Oxydationsflamme so viel Kupferoxyd und Phosphorsalz zusammen, dass die Perle undurchsichtig wird, setzt dann die Probe zu und bläst darauf; enthält die letztere Chlor, so umgiebt sich die Perle mit einer schönen blauen, ins Purpurfarbige geneigten Flamme.

11. Brom Brommetalle geben mit Kupferoxyd und Phosphorsalz behandelt, dieselbe Reaction, wie die Chlormetalle; die blaue Flamme zieht sich aber nicht ins Purpurfarbene, vielmehr an den Kanten ins Grüne. Brommetalle mit doppelt schwefelsaurem Kali in einem langen Kolben geschmolzen, entwickeln ein gelbes, widerlich riechendes Gas.
12. Jod Jodmetalle mit doppelt schwefelsaurem Kali im Kolben geschmolzen, entwickeln ein violettes Gas.
13. Fluor Man schmilzt die fein pulverisirte Probe mit doppelt schwefelsaurem Kali in einer einerseits zugeschmolzenen Glasröhre; diese wird bei Gegenwart von Fluor matt davon; was sich nach dem Auswaschen der Röhre zeigt.
14. Kohle Kohlearten, pulverisirt und mit Salpeter erhitzt, detoniren; Karbonate schmelzen mit Borax oder Phosphorsalz unter Brausen zusammen.
15. Borsäure Die Probe mit viel doppelt schwefelsaurem Kali und etwas Flussspath am Platindraht geschmolzen, färbt die äussere Flamme rein grün.
16. Kieselsäure Silikate werden in Phosphorsalz bis auf ein darin schwimmendes Kiesel-skelet aufgelöst; die Untersuchung auf nassem Wege ist sicherer.
-

III. Zusammenstellung der Mineralien

nach

T. S. Beudant.

I. C l a s s e.

Einige gediegene Metalle und Oxyde.

Palladium.	Eugenesit.	Glätte.	Kupferschwärze.
Platin.	Quecksilber.	Mennige.	Tenorit.
Iridium.	Amalgan.	Schwerbleierz.	Kobaltoxyd.
Gold.	Arguerit.	Kupfer.	Kobalt- und Man-
Silber.	Blei.	Rothkupfererz.	ganoxyd.
			Periklas.

II. C l a s s e.

Sideride. Manganide. Chromide. Aluminide.

Eisen.	Manganeisen.	Chromocher.	Korund.
Eisenglanz.	Neukirchit.	Chromeisenstein.	Gibbsit.
Nadeleisenerz.	Weichmanganerz	Rothbleierz.	Hydrargillit.
Limonit.	Hartmanganerz	Vauquelinit.	Hercinit.
Brauneisen-	Schwarzman-	Melanochoit.	Diaspor.
stein.	erz.		Chrysoberill.
Magneteisen.	Wad.		Spinell.
Franklin.	Erdkobalt.		Gahnit.
Dysluit.	Kupfermangan.		Pleonast.
Beudantit.	Roths Zinkoxyd.		Bleigummi.

III. C l a s s e.

Tantalide. Wolframide. Molybdide. Uranide.

Tantalit.	Wolframoher.	Molybdänoher.	Uranpecherz.
Yttrotantalit.	Schwerstein.	Gelbbleierz.	Uranocher.
Mikrolith.	Wolfram.		
Fergusonit.	Scheelbleispath.	Vanadide.	
Columbit.		Vanadinblei.	
Uranotantal.		Volborthit.	
Pyrochlor.			
Wöhlerit.			
Euxenit.			
Polykras.			

IV. C l a s s e.

Titanide.**Stannide.**

Rutil.
 Anatas.
 Warwikit.
 Brookit.
 Iserin.
 Ilmenit.
 Mengit.
 Crichtonit
 Polymignit.
 Aeschynit.
 Oerstedtit.
 Sphen.
 Parowskit.

Zinnstein.

V. C l a s s e.

Wismuthide.**Iride.**

Wismuth.
 Wismuthocher.

Osmium - Iridium.
 Irid.

Antimonide.**Arsenide.****Phosphoride.**

Antimon.

Arsenik.

Antimonmetalle. Arsenikmetalle.

Antimonsilber.
 Antimonnickel.
 Nickelantimonglanz.

Arseniksilber.
 Arsenikspiessglanz.
 Arsenikantimon.
 Arsenikwismuth.
 Speisskobalt.
 Arsenikkobaltkies.
 Lavendulan.
 Weissnickelkies.
 Kupfernickel.
 Plakodin.
 Nickelglanz.
 Glanzkobalt.
 Arsenikkies.
 Arsenickalkies.
 Tennantit.
 Arsenmangan.

Antimonoxyde.**Arsenikoxyde.**

Weissspiessglanzerz.
 Antimonoher.

Arsenikblüthe.

Antimoniate.**Arseniate.****Phosphate.**

Antimonsaures Blei.

Arsensaures Blei.
 Olivenerz.
 Pharmakolith.
 Talk - Pharmakolith.
 Haidingerit.
 Arsenizit.
 Erinit.
 Aphanes.
 Kupferglimmer.
 Kupferschaum.
 Linsenerz.
 Euchroit.
 Skorodit.
 Sympleisit.
 Pittizit.
 Diadochit.

Apatit.
 Eisenapatit.
 Pyromorphit.
 Nussierit.
 Wagnerit.
 Phosphors. Yttererde.
 Triplit.
 Pseudotriplit.
 Triphyllin.
 Lazulith.
 Amblygonit.
 Libethenit.
 Phosphatkupfererz.
 Ehlit.
 Tagelith.
 Dihydrat.

Arseniate.

Arseniosiderit
 Würfelerz.
 Nickelocher.
 Tombazit.
 Kobaltblüthe.

Phosphate.

Trombolith.
 Hüraulit.
 Heterozit.
 Vivianit.
 Anglarit.
 Ficinit.
 Delvauxit.
 Karphosiderit.
 Grüneisenstein.
 Phosphors. Thon-
 erde.
 Kakoxen.
 Beraunit.
 Wavellit.
 Kalait.
 Uranit.
 Chalkolith.

Antimonite.

Antimons. Nickel.
 Rothantimonerz.
 Romein.

Arsenite.

Condurrit.

VI. C l a s s e.**Telluride.**

Tellur.

Selenide.

Selenschwefel.

Sulfuride.

Schwefel.

Telluriüre.**Seleniüre.****S u l f ü r e.**

Tellurblei.
 Tellursilber.

Selenkupfer.
 Selenblei.
 Selensilber
 Selenquecksilb.

Kupferglanz.
 Bleiglanz.
 Silberglanz.
 Blende.
 Voltzin.
 Manganblende.
 Haarkies.
 Kupferindig.
 Zinnober.

Schwefelkies.
 Binarkies.
 Molybdänglanz.
 Kobaltkies.
 Wismuthglanz.
 Antimonglanz.
 Auripigment.
 Realgar.
 Greenokit.

**Doppelte
Telluriüre.**

Tellurwismuth.
 Blättertellur.

**Doppelte
Seleniüre.**

Selenquecksilb.-
 zink.

**Doppelte
S u l f ü r e.**

Marmatit.
 Magnetkies.

Boulangerit.
 Geokronit.

**Doppelte
Telluriüre.****Doppelte
Seleniüre.****Doppelte
S u l f ü r e.**Weisstellur.
Schrifttellur.Eukairit.
Selenbleikupfer.
Selenkupferblei.
Selenkupfersilb.Silberhupfer-
glanz.
Sternbergit.
Buntkupfererz.
Kupferkies.
Cuban.
Wismuthkupfer-
erz.
Kupferantimon-
glanz.
Zinkenit.
Plagionit.
Steinmannit.
Querantimon-
erz.
Federerz.Kilbrikenit.
Miargyrit.
Dunkles Rothgöl-
tigerz.
Proustit.
Berthierit.
Sprödglaserz.
Nickelwismuth-
glanz.
Eisennickelkies.
Kupferantimon-
glanz.**Multiple Sulfüre.**Bournonit.
Fahlerz
Polybasit.
Schilfglaserz.Zinnkies.
Kobellit.
Nadelerz.**S ä u r e n d e s S c h w e f e l s.****Einfache
wasserfreie
Sulfate.****Einfache
Sulfate mit
Wasser.****Doppelte
wasserfreie
Sulfate.****Doppelte
Sulfat-Hy-
drate.**Bleivitriol.
Schwerspath.
Cölestin.
Anhydrit.
Thenardit.
Schwefelsaures
Kali.Gyps.
Glaubersalz.
Bittersalz.
Maskagnin.
Bleilasur.
Zinkvitriol.
Eisenvitriol.
Botryogen.
Coquimbit.Cölestin von
Möen.
Cölestin von
Morton.
Glauberit.Neoplas.
Kaliaalaun.
Alaunstein.
Eisenalaun.
Manganalaun.
Talkalaun.
Polyhalit.
Pissophan.
Dreelit.

Einfache Sulfate mit Wasser.

Fibroferrit.
Kupfervitriol.
Kupferbleivi-
triol.
Uranvitriol.
Brochantit.
Königin.
Vitriolocher.
Schwefelsaure
Thonerde.
Aluminit.

VII. C l a s s e.

Chloride.

Silberhornerz
Quecksilber-
hornerz.
Cotunnit.
Mendipit.
Bleihornerz.
Atakamit.
Salmiak.
Steinsalz.

Bromide.

Bromsilber

Jodide.

Jodsilber

Fluoride.

Flussspath.
Yttrocerit.
Fluorcerium.
Fluellit.
Eremit.
Kryolith.
Chiolith.
Basicerine.
**Fluorsili-
kate.**
Topas.
Pyknit.
Chondrodit.
Mehrere Glim-
mer.

VIII. C l a s s e.

**Hydroge-
nide**

Eis.
Verschiedene
Hydrate.

Azotide.

Salpeter.
Salpetersaures
Natron.
Salpetersaurer
Kalk.
Salpetersaure
Bittererde.

C a r b o n i d e.**Kohlen.**

Diamant
Graphit.
Anthrazit.
Schwarzkohle.
Braunkohle.
Torf.

Carbüre.

Bernstein.
Retinit.
Ozokerit.
Hattchetin.
Elaterit.
Scheererit.
Hartit.
Ixolit.
Piauzit.
Idrialit.
Erdöl.
Asphalt.

Organisch - saure Salze.

Honigstein.

Guano.

Humboldt.

Wasserfreie Karbonate.**Rhomboëdri-
sche.**

Kalkspath.
Talkspath.
Dolomit.
Gurhoffian.
Spatheisenstein
Kohlens. Cer-
oxidul.

Galmei.

Herrerit.

Kohlens. Silber.

Uranblüthe.

**Prismati-
sche.**

Arragonit.
Witherit.
Strontianit.
Barytocalcit
Weissbleierz.

**Schwefel-
säurehaltige.**

Stromnit.
Lenarkit.
Leadhillit.
Lasurigblei-
vitriol.
Wismuthit.

**Karbonate
mit Hydrat-
wasser.**

Malachit.
Soda.
Trona.
Gaylüssit.
Hydrocerit

**Karbonate
mit Hydra-
ten.**

Kupferlasur.
Aurichalcit.
Zinkblüthe.
Hydromag-
nesit.

IX. Classe.

Boride.

Borsäure.

Borate. Borosilikate

Borazit.

Hydroborazit.

Rhodizit.

Hopeit.

Borax.

Datolith.

Botryolith.

Einfache Thonerde-, Eisen- etc. haltige Silikate.

Wasserfreie.**Hydrate.****Silikate mit Hydraten.**

Staurolith.

Cyanit.

Andalusit.

Sillimanit.

Talksteinmark.

Kieselmannan.

Leelit.

Fayalit.

Kollyrit.

Wolchonskoit.

Miloschin.

Gilbertit.

Pfeifenstein.

Huronit.

Rosellan.

Polyargit.

Bildstein.

Lenzinit.

Pholerit.

Plinthit.

Nontronit.

Cimolit.

Gelberde.

Tripel.

Bol.

Fettbol.

Rhodalit.

Steinmark.

Eisenstein-

mark.

Kaolin.

Thon.

Allophan.

Schrötterit.

Halloisit.

Severit.

Bergseife.

Wörthit.

Doppelte Thonerde- oder Eisen-Silikate mit
verschiedenen Basen.**Wasserfreie mit Beryllerde.**

Smaragd.

Euklas.

**Wasserfreie, mit
Kalk, Eisen etc.
verbunden.**

Gehlenit.
Grossular.
Melanit.
Uwarowit.
Almandin.
Spessartin.
Vesuvian.
Polyadelphit.
Ligurit.
Erlan.
Cerin.
Mejonit.
Zoisit.
Smaragdit.
Thallit.
Thulit.
Weissit.
Wernerit.
Amphodelit.
Barsovit.
Bytownit.
Dichroit.
Skapolith.
Anthophyllit.
Carneatit.
Retinit, Obsidian,
Bimsstein.
Nephrit.
Perthit.
Monticellit.

**Wasserfreie al-
kalische.**

Nephelin.
Davyn.
Indianit.
Nakrit.
Giesekit.
Saussurit.
Pinit.
Pyrargillit.
Leuzit.
Berzelin.
Achmit.
Oligoklas.
Triphan.
Feldspath.
Ryakolith.
Porzellanspath.
Labradorit.
Glaukolith.
Anorthit.
Albit.
Andesit.
Bamlit.
Petalit.
Murchisonit.
Couzeranit.
———
Latrobit.
Nekronit.
Violan.
Wichtyn.
Sapparit.
Lepidomelan.

**Hydrate (Zeo-
lithe.)**

Okenit.
Pectolith.
Analzim.
Harmotom.
Phillipsit.
Zeagonit.
Faujasit.
Brewsterit.
Laumontit.
Leonhardit.
Stilbit.
Heulandit.
Epistilbit.
Chabasit.
Natrolith.
Skolezit.
Mesolith.
Lehuntit.
Brevizit.
Mesole.
Poonalith.
Glottalith.
Antrimolith.
Stellit.
Thomsonit.
Edingtonit.
Prehnit.
Karpholit.
Neurolith.
Zeuxit.
Kirwanit.
Herschelit.
Onkosin.
Beaumontit.

**Chloritische
Thonerde-
silikate.**

Pimelith.
Pennin.

**Alumino Si-
likate.**

Chamoisit.
Bertherin.

**Fluorhaltige
Silikate.**

Magnesiaglimmer
Kaliglimmer.

**Schwefel-
haltige Sili-
kate.**

Lasurstein.
Hauyn.

Chloritische Thonerde-silikate.	Alumino Si-likate.	Fluorhaltige Silikate.	Schwefelhaltige Silikate.
Fahlunit. Esmarkit. Hisingerit. Sideroschisolith. Pyrophyllit. Chlorit. Chloritoid. Leuchtenbergit. Cämmererit. Praseolith. Thüringit. Bonsdorffit. Gismondin. Chlorophyllit. Ottrelith. Grünerde.	Pagodit. Margarit. Saphirin. Turnerit. Xanthophyllit. Seybertit.	Lithionglimmer. Gigantolith. Holmit.	Ittnerit. Spinellan. Helvin.
	Silikate mit Chlor.	Silikate mit Bor.	Silikate mit Phosphor.
	Sodalit.	Turmalin. Axinit.	Sordawalit. Kieselwismuth. Hypochlorit.

Thonerdefreie Silikate.

Einfache.

Doppelte.

Wasserfreie. Hydrate.

Phenakit. Zirkon. Gadolinit. Chrysolith. Forsterit. Tautolith. Fayalit. Willemitt. Tafelspath. Kieselman- gan. Tephroit. Anauxit.	Cererit. Marmolith. Kieselzinkerz Diopas. Kieselkupfer. Speckstein. Saponit. Magnesit. Meerschäum. Danburit. Chloropal.	Serpentin. Schillerspath. Bergsalz. Ophit. Dermatin. Kerolith. Spadait. Chonikrit. Pyrosklerit. Nemalit. Retinalit. Prasilit. Villarsit.	Thorit. Krokydolith. Lievril. Troostit. Knebelit. Torrelit. Cronstedtit. Grünerde von Paris. Bronzit. Baikalit. Raphilit. Osmalit.
---	---	--	--

Einfache.**Doppelte.****Wasserfreie.****Hydrate.**

Vermiculit.
Talk.
Aedelforsit.
Photizit.
Boltonit.

Monradit.
Pikrophyll.
Chrysotil.
Pikrosmim.
Pyrallolith.
Orthit.
Pyrorthit.
Mosandrit.
Tschevkinit.
Eudialith.
Leukophan.

Diopsid.
Hedenbergit.
Babingtonit.
Pyrosmalit.
Bustamit.
Hypersthen.
Tremolit.
Pectolith.
Strahlstein.
Apophyllit.

Thonerdefreie Silikate.

Doppelte.**Hydrate.****Wasserfreie.**

Thorn.
Krokodolith.
Lievrit.
Troostit.
Knebelit.
Torrelit.
Cronstedtit.
Grünerde von
Paris.
Bronzit.
Balsalit.
Raphanit.
Osmalit.

Serpentin.
Schillerspath.
Bergazit.
Opbit.
Dermatin.
Kerolith.
Spadait.
Chomikrit.
Pyroskaphit.
Nemalit.
Bemalit.
Prasinit.
Villarsit.

Cerit.
Marmolith.
Nieselzinkit.
Dioplas.
Nieselkupfer.
Speckstein.
Saponit.
Magnesit.
Meerschaum.
Dandurit.
Chloropal.
Magnetit.
Kalkstein.

Phenakit.
Zirkon.
Gadolinit.
Chrysolith.
Forsterit.
Tantalit.
Fayalit.
Willemit.
Talspath.
Nesselthum.
Garn.
Tephroit.
Anazit.

IV. Natürliches System der Mineralspecies.

I. Classe. Alkalische.

In Wasser lösliche Säuren, Sauerstoff- und Haloidsalze mit erdigen oder alkalischen Basen.

Steinsalz.	Urao.	Natronsalpeter.
Kalialaun.	Trona.	Kalksalpeter.
Ammoniakalaun.	Borax.	Salmiak.
Natronalaun.	Borsäure.	Maskagnin.
Glaubersalz.	Kalisalpeter.	Schwefelsaures Kali.
Natron.		Thenardit.
		Bittersalz.

II. Classe. Metallsalze.

Ganz oder theilweise in Wasser lösliche Säuren, Sauerstoff- und Haloidsalze mit metallischen Radikalen der Basis oder Säure.

Arsenige Säure.	Botryogen.	Kobaltvitriol.
Arsenphyllit.	Fibroferrit.	Zinkvitriol.
Coquimbit.	Eisenvitriol.	Uranvitriol.
Basisch schwefelsau- res Eisenoxyd.	Kupfervitriol.	

III. Classe. Salinische Erze.

In Wasser unauflösliche, meist farbige Körper von salzartigem Aussehen; Sauerstoff- und Haloidsalze mit metallischem Radikale; jedoch mit Ausnahme der Silikate, Aluminate, Titanate und Tantalate.

1. Familie der Bleisalze.

Schwerstein.	Melanochoit.	Hornbleierz.
Bromsilber.	Rothbleierz.	Nussierit.
Jodsilber.	Scheelbleierz.	Kupferbleivitriol.
Quecksilberhornerz.	Gelbbleierz.	Lasurigbleivitriol.
Silberhornerz.	Vanadinbleierz.	Kohlenvitriolblei.
Bismuthit.	Buntbleierz.	Ternärbleierz.
Romein.	Cotunnit.	Bleivitriol.
Vauquelinit.	Chlorblei.	Weissbleierz.

2. Familie der Kupfersalze.

Brochantit.	Strahlerz.	Erinit.
Königin.	Euchroit.	Kupferschaum.
Salzkupfererz.	Olivenerz.	Kupferglimmer.
Libethkupfererz.	Aphanes.	Malachit.
Phosphatkupfererz.	Linsenerz.	Kupferlasur.
Trombolith.	Condurrit.	Volborthit.

3. Familie des Spatheisensteins.

Nickelblüthe.	Arsenosiderit.	Eisenapatit.
Kobaltblüthe.	Skorodit.	Pseudotriplit.
Uranglimmer.	Sympleisit.	Triplit.
Vivianit.	Pittizit.	Herrerit.
Anglarit.	Diadochit.	Aurichalcit.
Ficinit.	Würfelerz.	Zinkblüthe.
Delvauxit.	Hetepozit.	Zinkspath.
Grüneisenstein.	Huraulit.	Manganspath.
Karphosiderit.	Triphyllin.	Ankerit.
Kakoxen.	Perowskin.	Spatheisenstein.
Beraunit.		

IV. Classe. Salinische Steine.

Meist farblose, in Wasser unauflösliche Körper mit salzartigem Ansehen; Sauerstoff- und Haloidsalze mit nicht metallischen Radikalen; mit Ausnahme der Silikate, Aluminate, Titanate und Tantalate.

1. Familie des Kalkspaths.

Kalkspath.	Flussspath.	Hopeit.
Dolomit.	Yttrocerit.	Pyrrhit
Talkspath.	Fluocerit.	Apatit.
Hydromagnesit.	Monazit.	Herderit.
Hydrotalcit.	Eremit.	Phosphorsaure Ytter-
Mesitinspath.	Hydrocerit.	erde.
Gurhofian.	Kryolith.	Borazit.
Arragonit.	Fluellit.	Rhodizit.
Natrocalcit.		Hydroborazit.

2. Familie des Aluminits.

Läzulith.	Wavellit.	Amblygonit.
Blauspath.	Kalait.	Alaunstein.
Childrenit.	Peganit.	Aluminit.
Türkis.	Wagnerit.	Paraluminit.

3. Familie des Schwerspaths.

Schwerspath.	Witherit.	Stromnit.
Hepatit.	Barytocalcit.	Dreelit.
Wolnyn.	Cölestin.	
Schoharit.	Strontianit.	

4. Familie des Gypses.

Gyps.	Glauberit.	Roselit.
Anhydrit.	Pharmakolith.	Haidingerit.
Polyhalit.	Pikropharmakolith.	

V. Classe. Oxydische Steine.

Erden, Silicate und Aluminate.

1. Familie des Feldspathes.

Feldspath.	Glaukolith.	Bimsstein.
Couzeranit.	Anorthit.	Perlstein.
Ryakolith.	Oligoklas.	Pechstein.
Porzellanspath.	Hafnefjordit.	Sapparit.
Albit.	Spodumen.	Wichtyn.
Labrador.	Petalit	Violan.
Saussurit.	Obsidian.	Nekronit.

2. Familie des Skapoliths.

Skapolith.	Nephelin.	Chiastolit.
Amphodelit.	Davyn.	Humboltolith.
Barsowit.	Indianit.	Melilith.
Bytownit.	Gehlenit.	Nephrit.
Latrobit.		

3. Familie des Leuzits.

Leuzit.	Hauyn	Eudialith.
Berzelin.	Ittnerit.	Leukophan.
Sodalith.	Lasurstein.	

4. Familie der Zeolithe.

Analzim.	Aedelforsit.	Prehnit.
Natrolith.	Heulandit.	Edingtonit.
Radiolith.	Brewsterit.	Glottalith.
Skolezit.	Epistilbit.	Okenit.
Lehuntit.	Chabasit.	Pectolith.
Brewizit.	Gmelinit.	Apophyllit.
Poonahlit.	Ledererit.	Datolith.
Mesolith.	Akadiolith.	Botryolith.
Mesole.	Kreuzstein.	Neurolith.
Stellit.	Phillipsit.	Zeuxit.
Thomsonit.	Zeagonit.	Kirwanit.
Stilbit.	Faujasit.	Herschelit.
Linkolnit.	Laumontit.	Onkosin.
Hypostilbit.	Leonhardit.	Beaumontit.
Sphärostilbit.	Karpolith.	

5. Familie des Serpentin.

Speckstein.	Dermatin.	Monradit.
Pimelith.	Antigorit.	Pikrophyll.
Saponit.	Spadait.	Villarsit.
Meerschäum.	Chonikrit.	Schillerspath.
Ophit.	Pyrosklerit.	Chrysotil.
Rhodochrom.	Nemalit.	Bergholz.
Hydrophit.	Retinalith.	Pyrallolith.
Gymnit.	Praseolith.	
Kerolith.	Pikrosmin.	

6. Familie der Thone.

Thon.	Gelberde.	Wolchonskoit.
Porzellanerde.	Halloisit.	Gilbertit.
Pfeifenstein.	Gummit.	Kollyrit.
Kieselguhr.	Walkererde.	Malthazit.
Klebschiefer.	Schrötterit.	Pholerit.
Polirschiefer.	Allophan.	Plinthit.
Trippel.	Bol.	Skarbroit.
Thonstein.	Fettbol.	Steinmark.
Bergseife.	Cimolith.	Eisensteinmark.
Grünerde.	Razumovskin.	Bildstein.
Glaukonit.	Miloschin.	

7. Familie der Edelsteine.

Zirkon.	Topas.	Turmalin.
Malakon.	Pyrophysalith.	Chrysolith.
Spinell.	Pyknit.	Forsterit.
Gahnit.	Smaragd.	Tautolith.
Korund.	Phenakit.	Hyalosiderit.
Saphirin.	Quarz.	Batrachit.
Periklas.	Opal.	Chondrodit.
Chrysoberyll.	Haytorit.	Boltonit.
Euklas.	Dichroit.	Monticellit.

8. Familie des Granats.

Granat.	Cyanit.	Sillimanit.
Pyrop.	Bamlit.	Wörthit.
Helvin.	Andalusit.	Talksteinmark.
Vesuvian.	Staurolith.	Polyadelphit.
Epidot.	Diaspor.	Erlan.
Pouschkinit.	Gibbsit.	Ligurit.
Axinit.	Hydrargillit.	

9. Familie der Hornblende.

Hornblende.	Achmit.	Marmolith.
Breislakit.	Tafelspath.	Commingtonit.
Raphilit.	Fahlunit.	Polyolith.
Osmelith.	Weissit.	Isopyr.
Augit.	Esmarkit.	Babingtonit.
Uralit.	Sordawalit.	Jeffersonit.
Smaragdit.	Killinit.	Danburit.

10. Familie des Glimmers.

Zweiaxiger Glimmer.	Gigantolith.	Chloritoid.
Fuchsit.	Lepidomelan.	Leuchtenbergit.
Einaxiger Glimmer.	Talkhydrat.	Kämmererit.
Chlorit.	Clintonit.	Praseolith.
Talk.	Perlglimmer.	Thüringit.
Anauxit.	Rubellan.	Bonsdorfit.
Vermikulit.	Pyrophyllit.	Sismondin.
Pinit.	Xanthophyllit.	Chlorophyllit.
Pyrargillit.	Seybertit.	Ottrelith.
Pennin.		

11. Familie der Metallsteine.

Thorit.	Euxenit.	Cronstedtit.
Cererit.	Polykras.	Pyrosmalith.
Allanit.	_____	Anthosiderit.
Gadolinit.	Kieselmangan.	Chlorophäit.
Orthit.	Tephroit.	Nontronit.
Pyrorthit.	_____	Pinguit.
Mosandrit.	Marcellin.	Chloropal.
Tschewskinit.	Heteroklin.	Chamoisit.
_____	Fowlerit.	Lievrit.
Parowskit.	_____	Krokydolit.
Aeshynit.	Kieselwismuth.	Trostit.
Oerstedtit.	Atlestt.	Knebellit.
Uralorthit.	Bleigummi.	Torrelit.
_____	_____	Hypochlorit.
Yttrotantalit.	Willemitt.	_____
Mikrolith.	Kieselzinkerz.	Kieselkupfer.
Fergusonit.	_____	Dioptas.
Pyrochlor.	Hisingerit.	
_____	Fayalit.	
Wöhlerit.	Sideroschisolith.	
Uranotantal.		

VI. Classe. Oxydische Erze.

Oxyde schwerer Metalle und solche Verbindungen derselben, welche nicht salzähnlich sind.

1. Familie der Eisenoxyde.

Magneteisenstein.	Rotheisenstein.	Mengit.
Chrom Eisenstein.	Brauneisenstein.	Iserin.
Franklin.	Gelbeisenstein.	Menakanit.
Dysluit.	Nadeleisenerz.	Crichtonit.
Isophan.	Stilpnosiderit.	Mohsit
Eisenglanz.	Titaneisensand.	

2. Familie des Zinnsteins.

Zinnstein.	Harttantalierz.	Warwikit.
Wolfram.	Titanit.	Nigrin.
Tantalit.	Brookit.	Anatas.
Columbit.	Rutil.	Uranpecherz.

3. Familie des Rothkupfererzes.

Rothzinkerz.	Kupferpecherz.	Hepatinerz.
Rothkupfererz.	Mysorin.	Tenorit.

4. Familie des Weissantimonerzes.

Weissantimonerz.

5. Familie der Manganerze.

Graumanganerz.	Kupfermanganerz.	Neukirchit.
Braunmanganerz.	Pelokonit.	Varvizit
Scharfmanganerz.	Kobaltmanganerz.	Manganoxydaluminat.
Hartmanganerz.	Wad.	
Schwarzanganerz.	Grorolith.	

6. Familie der Ocher.

Kobaltocher.	Wolframocher.	Glätte.
Molybdänocher.	Uranocher.	Chromocher.
Wismuthocher.	Bleiocher.	Tellurocher.
Arsenikschwärze.	Schwerbleierz.	
Antimonocher.	Mennige.	

VII. Classe. Gediogene Metalle.

Eisen.	Eugenesit.	Arguerit.
Eisenplatin.	Gold.	Silber.
Platin.	Kupfer.	Antimonialsilber.
Platiniridium.	Wismuth.	Antimon.
Osmiridium.	Blei.	Antimonarsen.
Irit.	Quecksilber.	Arsen.
Palladium.	Amalgam.	Tellur.

VIII. Classe. Glanze.

Schwefel-, Selen- und Tellurmetalle; meist grau oder schwarz;
Härte bis 3. Metallischer Habitus.

A. Tellurmetalle.

Tellursilber.	Blättertellur.	Tellurblei.
Schrifterz.	Tellurwismuth.	
Weisstellur.	Tellurwismuthsilber.	

B. Selenmetalle.

Selenquecksilber.	Eukairit.	Selenquecksilberblei.
Selensilber.	Selenkupferblei.	
Selenkupfer.	Selenblei.	

C. Schwefelmetalle.

1. Bleiglanze.

Bleiglanz.	Boulangerit.	Bleiantimonerz.
Steinmannit.	Embrithit.	Queerantimonerz.
Geokronit.	Plagionit.	Federerz.
Kilbrikenit.	Bournonit.	

2. Antimonglanze.

Grauantimonerz.	Eisenantimonerz.	Wasserblei.
-----------------	------------------	-------------

3. Wismuthglanze

Wismuthglanz.	Nadelerz.	Kobellit.
Wismuthkupfererz.	Wismuthbleierz.	

4. Silberglanze.

Schilfglaserz.	Mildglanzerz.	Silberkupferglanz.
Sternbergit.	Glanzerz.	Silberschwärze.
Biegsamer Silberglanz.	Sprödglasserz.	

5. Kupferglanze.

Kupferglanz.	Kupferantimonglanz.	Antimonkupferglanz.
Digenit.	Kupferindig.	Kupferbleiglanz.

IX. Classe. Kiese.

Schwefel- und Arsenmetalle von gelber, weisser oder rother metallischer Farbe; spröde; Härte 3—6. Metallischer Habitus.

1. Kupferkiese.

Weissgültigerz.	Kupferblende.	Cuban.
Fahlerz.	Buntkupfererz.	Weisskupfererz.
Tennantit.	Kupferkies.	

2. Zinnkiese.

Zinnkies.

3. Schwefeleisenkiese.

Arsenikalkies.	Magnetkies.	Binarkies, (Kyrosit.)
Arsenikkies.	Schwefelkies.	Arsenikmangan.

4. Kobaltkiese.

Glanzkobalt.	Markasit.	Kobaltkies.
Speisskobalt.	Arsenikkobaltkies.	

5. Nickelkiese.

Haarkies.	Kupfernichel.	Antimonnickel.
Nickelglanz.	Arseniknickel.	Nickelantimon.
Nickelantimonglanz.	Plakodin.	Tombazit.
Wodankies.	Wismuthnickelkies.	

X. Classe. Blenden.

Schwefelmetalle von nicht- oder halbm metallischem Ansehen, und mit Diamant- bis Perlmutterglanz; milde oder wenig spröde; meist durchscheinend; Gewicht über 3,4; Härte bis 4.

Manganblende.

Zinkblende.

Voltzin.

Greenokit.

Rothantimonerz.

Feuerblende.

Xanthokon.

Unobinärgülden.

Hypargyrit.

Rothgültigerz.

Zinnober.

Rauschgelb.

Rauschroth.

XI. Classe. Inflammablen.**1. Familie des Schwefels.**

Schwefel.

Selenschwefel.

2. Familie der Kohle.

Diamant.

Graphit.

Anthracit.

Schwarzkohle.

Braunkohle.

3. Familie des Asphalts.

Bernstein.

Erdöl.

Elaterit.

Asphalt.

Retinit.

Middletownit.

Quyaquillit.

Copal.

Ozokerit.

Scheererit.

Könlit.

Xylokryptit.

Branchit.

Hartit.

Ixolit.

Piauzit.

Hattchetin.

Idrialin.

Pigotit.

Honigstein.

Oxalit.

V. Charakteristik und Vorkommen der Felsarten.

A. Charakteristik.

Man unterscheidet:

I. Ungleichartige Gesteine.

A. Körnige Gesteine.

1. Granit Feldspath (oder Albit), Quarz und Glimmer im krystallinischen Gefüge unmittelbar und innig mit einander gemengt, in gross- bis feinkörniger Zusammensetzung. Im Schriftgranit (Pegmatit, Judenstein) verschwindet der Glimmer oder erscheint nur in einzelnen Nestern und der Quarz bildet einzelne Krystalle, die von parallelen Feldspathlagen umschlossen sind. Durch einzelne grössere Feldspathkrystalle wird der Granit porphyrartig. Eurit ist sehr feinkörniger, sehr quarzreicher und leichtflüssiger Granit ohne Glim-

- mer; durch die Mengung mit Krystallen wird er bisweilen porphyrartig. Tritt aus dem Granit der Feldspath zurück, so entsteht der Greisen (Hyalomict).
2. Protogyn Feldspath, (Quarz) und Talk oder Chlorit in körniger Zusammensetzung.
 3. Miascit Grobkörniges Gemenge aus vorherrschendem weissen Feldspath, weisslichen Nephelin und schwarzen Glimmer.
 4. Syenit Raben- oder graulichschwarze Hornblende, (Quarz) und Feldspath in klein- bis grobkörniger Zusammensetzung; durch Hinzutreten von Zirkon entsteht Zirkonsyenit; der Syenit geht durch Aufnahme von Glimmer in Granit, durch Ueberhandnehmen der Hornblende in Hornblendegestein (Amphibolit) über.
 5. Diabas (Hypersthenfels, Hiperit) Fein- bis grobkörniges, graugrünes Gemenge aus meist vorherrschendem Labrador und Hypersthen; nimmt bisweilen auch Quarz auf und wird dann syenitartig.
 6. Diorit, (Grünstein) Schwärzlichgrüne Hornblende und weisslicher Albit in länglich-, klein- bis feinkörniger Zusammensetzung. Im Blatterstein (Variolit) liegen in dioritischer Masse einzelne Albitkrystalle.
 7. Dolerit, (Grünstein) Weisser Labrador, schwarzer Augit und etwas Titan- oder Magneteisen in krystallinisch-körnigem, granitartigem Gefüge; geht in Basalt über; durch Aufnahme von viel Analzim entsteht Analzimit.
 8. Nephelinfels Nephelin, Augit, und oft auch etwas Magneteisen in krystallinisch-körnigem, granitischem Gemenge; er ist weisslichgrau mit dunklen Punkten.

9. **Leuzitgestein** . : Krystalle oder Körner von Leuzit und Augit in porösem oder dichtem graulichen Gemenge; im Cyclophor wird der Leuzit durch Analzim ersetzt; in andern vulkanischen Gesteinen durch Sodalit oder Hauyn.
10. **Gabbro, (Euphotid)** . Labrador und Diallag oft grobkörnig gemengt; giebt bei der Destillation Wasser.
11. **Eklogit** Strahlstein oder Augit und Granat in krystallinisch-körnigem Gefüge.
12. **Hornfels** Inniges Gemenge aus Quarz, Feldstein und etwas Turmalin.
13. **Pyromerid** Feldsteinteig mit sehr quarzigen Einmengungen und darin liegenden Kugeln, die aus Feldspath oder Feldspath und Quarz bestehen.
14. **Epidosit** Aus Epidot- und Quarzkörnern bestehende, sehr feste Masse.

B. Schieferige Gesteine.

15. **Gneiss (Gneus)** Feldspath-, Quarz- und Glimmertheile in körnig-schiefrigem Gefüge. Wird der Glimmer durch Talk ersetzt, so entsteht der Adergranit, der in Protogyn übergeht.
16. **Glimmerschiefer** . Schuppiger Glimmer (Talk oder Graphit) und Quarz lagenweise wechselnd mit schiefrigem Gefüge; geht häufig in Gneiss und anderseits in Quarzfels über.
17. **Itakolumit, (Gelenk-quarz.)** Quarz und Talk, oder Chlorit in körnig-schiefrigem Gefüge; elastisch biegsam.
18. **Eisenglimmerschiefer.** Eisenglimmer und Quarz in körnig-schiefrigem Gemenge; oft mit Goldblättchen.

19. Dioritschiefer . . . Gerade - und dickschiefriger Diorit.
 20. Topasfels . . . Topas, vorherrschender Quarz und Turmalin in körnig-schiefrigem Gefüge.
 21. Turmalinschiefer, (Schörlfels.) . . . Körnig-schiefriges Gemenge von Quarz und Turmalin.

C. Porphyre.

22. Feldsteinporphyr . . . Dichte, mit mehr weniger Quarz innig gemengte, meist bräunliche Feldsteinmasse, in welcher Feldspath und häufig auch Quarzkrystalle oder Körner eingeschlossen sind; durch grössern Quarzgehalt der Grundmasse entsteht der Hornsteinporphyr, durch eingesprengte Kugeln und Mandeln von Chalcedon der Porphyrmandelstein; ist die Grundmasse arm an Quarz, graulich, weicher oder selbst erdig, so entsteht der braunröthliche oder grünliche Thonporphyr.

II. Gleichartige Gesteine.

A. Körnige Gesteine.

23. Granulit, (Weissstein, Felsit, Leptinit). . . Feldstein in höchst feinkörniger bis dichter Zusammensetzung, im Bruch feinsplitterig; häufig sind Granaten darin eingesprengt.
 24. Quarzfels . . . Feinkörnige bis dichte Quarzmasse; durch Glimmerlagen bisweilenschiefrig.
 25. Hornblendegestein, (Amphibolith.) . . . Klein- oder feinkörnige, ins Blättrige oder Strahlige sich verlaufende, schwarze, ins Grüne oder Graue geneigte Hornblende; geht durch Hinzukommen von Albit in Diorit über.

26. **Augitfels** . . . Grüne, selten braune oder graue Augitmasse von eckigen grössern, kleinern oder feinen Körnern.
27. **Körniger Kalk (salinischer Marmor)** . . . Krystallinischer, körnig-blättriger, meist weisser, kohlensaurer Kalk, meist mit Talkerdegehalt; nimmt oft Glimmer auf.
28. **Körniger Gyps** . . . Fein- bis grobkörnige, bisweilen schuppige oder blättrige Gypsmasse; Der sogenannte Thongyps ist ein Gemenge von körnigem, faserigen und spathigen Gyps.
29. **Anhydrit (Muriazit)** . . . Krystallinische, oft körnige bis dichte Anhydritmasse; oft mit Steinsalzteilchen.
30. **Dolomit** . . . Ausgezeichnet körnige, meist poröse, auf dem Bruch fast perlmutterartig glänzende, rauh anzufühlende Verbindung von kohlensaurem Kalk und kohlensaurem Talk.
31. **Serpentinfels** . . . Dichte bis sehr feinkörnige, seifenartig anzufühlende, im Bruch splittige Serpentinmasse, die meist grün ist, an der Luft aber roth wird.
32. **Steinsalz** . . . Grob-, bis feinkörnige Steinsalzmasse.
33. **Magneteisenfels** . . . Dichte bis grobkörnige Masse von Magneteisenstein.

B. Schieferige Gesteine.

34. **Talkschiefer** . . . Graue schiefrige, seifenartig anzufühlende Talkmasse; oft mit etwas Quarz.
35. **Hornblendeschiefer (Anthophyllit)** . . . Hornblendegestein mit Schiefergefüge, dunkelgrün.
36. **Chloritschiefer** . . . Chlorit von dünnem schiefrigen Gefüge.

C. Dichte Gesteine.

37. Dichter Kalkstein. Dichte Masse von kohlensaurem Kalk, von muscheligen, splittrigen oder erdigen Bruch, und oft durch Talk, Thon, Kiesel, Eisen, Mangan oder Bitumen verunreinigt.

Die gelblichen, bläulichen oder weisslichen Roggensteine (Oolithen) bestehen aus kleinen runden oder eiförmigen, meist concentrisch schaligen, durch Kalkteig verbundenen Kalkkörnern. — Die Kreide ist ein weisser, sehr reiner Kalk mit erdigem Bruch, und von kaum körniger Beschaffenheit; sie nimmt oft Chlorit- und Quarztheilchen auf und bildet dann den Glaukonit.

38. Mergel. Mit Thon oder mit Kiesel oder mit beiden zusammen innig gemengte, oft auch sehr sandige, zuweilen schiefrige Kalkmasse von verschiedenen Farben.

39. Phonolith (Klingstein, Porphyrchiefer). Graue Grundmasse von Feldstein, mit Mesotyp innig gemengt und oft Feldspathkrystalle einschliessend, Bruch splittrig bis flachmuscheligen; unter dem Hammer hell klingend, in concentrirten Säuren löslich.

40. Kieselschiefer (Lydischer Stein). Dichter Quarz von grauer oder schwarzer Farbe und grobschiefriger Absonderung; oft von weissen Quarzadern durchzogen; geht bisweilen in Jaspis über.

III. Scheinbar gleichartige Gesteine.

A. Körnige Gesteine.

41. Lava. Feldspath oder Labrador mit Augit- oder Titanhaltigen Magneteseisen theilen innig gemengt; meist porös, durchlöchert oder blasig.

42. A namesit. Feinkörniger Dolerit mit fast undeutlichen Gemengtheilen.

B. Schieferige Gesteine.

43. Thonschiefer. . . . Ausgezeichnet schiefriges, inniges Gemenge von vorherrschendem, verhärteten Thon mit Glimmer, Quarz, Feldspath, Talk oder Eisen; grau ins Bläuliche; durch Verwitterung ins Gelbe und Rothe. Beim Dach-schiefer geht die Theilbarkeit fast ins Unendliche, der Wetz-schiefer ist weniger theilbar, reicher an Kieselerde und meist gelb gefärbt; der Griffelschiefer theilt sich in lange dünne Stücke; der Zeichenschiefer ist durch Kohlenstoffgehalt abfärbend; der Alaunschiefer reich an Alaun und Kohlentheilchen. Der Killas steht zwischen Thonschiefer und Gneus. Der Kohlenschiefer ist ein Kohlen- und Bitumenhaltiger, dickschiefriger Thon; der Schieferthon eine geradschiefrige, meist schwärzlichgraue Thonmasse. Der Klebschiefer ist ein lichte gelblichgrauer, dünn-schiefriger, leicht zerreiblicher, thoniger Mergel; der Polirschiefer gelblichgrau, sehr weich und milde, stark abfärbend, wie der vorige, der feuchten Lippe anhängend, mager anzufühlen und leicht in dünnen Blättchen spaltbar.

C. Porphyre.

44. Trachyt. . . . Graulichweisser oder aschgrauer, feinsplittiger Feldspath in feinkörniger bis fast erdiger (Domit) Zusammensetzung, grössere Ryakolithkrystalle, auch meist Nadeln von Hornblende und Glimmerblättchen umschliessend.

45. Andesit . . . Dunkelgraue körnige, dichte oder erdige Grundmasse von Ryakolith, mit sehr kleinen, oft vorherrschenden Albitkrystallen, Glimmer und Hornblende.

46. Aphanit . . . Höchst feinkörnige, grünliche Dioritmasse mit eingeschlossenen, grösseren Albit- oder Hornblendekrystallen; finden sich weisse Flecken von Kalk ein, so entsteht der Hemithren.

**47. Augitporphyr (Mela-
phyr)** . . . Dichte aus Augit und Labrador innig gemengte, grüne, braune, graue oder schwarze Gneusmasse mit inliegenden grünlichen Augit- (Uralit-) oder weissen Labradorkrystallen; ist in Säuren löslich.

48. Oligoklasporphyr . Grünliche dichte Grundmasse mit eingewachsenen Oligoklaskrystallen

D. Dichte Felsarten.

49. Basalt . . . Schwärzliches dichtes Gemenge aus Augit, Labrador und Zeolithen; meist säulenförmig abgesondert, und körnigen Olivin einschliessend.

50. Wacke . . . Dichtes oder blasiges, grünes, graues oder braunes, höchst inniges, zähes Gemenge von Feldspäthen, Augit, Magneteisen, Olivin etc.; die Blasenräume oft mit Zeolithen, Kalkspath, Arragonit, Achat ausgefüllt. Geht in Basalt über.

51. Schalstein . . . Undeutliches Gemenge; bald der Wacke, bald Thonschiefern ähnlich; bald mehr chloritischer oder Dioritischer Natur; unrein grün, ins Graue und Braune; dicht, zellig oder blasig; die Blasenräume mit Kalkspath erfüllt (Blatterstein).

52. Alaunfels . . . Dichte, mit mehr weniger Quarz in-
nig gemengte Feldspathmasse; gelb-
lichweiss; durchlöchert und zerfres-
sen; in den Höhlungen mit Alaun-
steinkrystallen.

53. Thon . . . Inniges Gemenge von Kieselerde und
Thonerde, das mit Wasser einen
zähen, bildsamen Teig bildet, und im
Feuer hart und todt brennt. Nimmt
oft Sand oder Kalk auf, und ist
meist durch Eisen dunkel gefärbt;
durch Aufnahme von Talkerde ent-
steht die Walkerde; durch min-
dere Bildsamkeit und gelbliche Farbe
ausgezeichnet ist der Lehm, von
dem sich durch grösseren Kalkgehalt
der Löss unterscheidet; durch Auf-
nahme von viel Eisenoxyd entstehen
die gelben bis rothen Ockerarten.

E. Glasartige Gesteine.

54. Pechstein (Retinit) . . . Halbverglaste, fettglänzende, durch-
scheinende, quarzreiche, feldspath-
artige Masse, von harzigem Pech-
glanze und rauhem muscheligen
Bruch; geht in Quarzfels über und
wird andererseits durch eingewach-
sene Feldspathkrystalle bisweilen por-
phyrartig.

55. Obsidian . . . Dichte, glasige, dunkelgrüne oder
schwärzliche, glasglänzende, im
Bruche muschelige, bisweilen blasige
oder durch Feldspathkrystalle por-
phyrartige Masse.

56. Perlstein . . . Dichte feldspathartige, schmelzartige
oder glasige, perlmutterglänzende
Masse, aus körnig abgesonderten,
concentrisch schaligen Stücken be-
stehend; oft porös oder blasig, auch
wohl durch Feldspathkrystalle por-
phyrartig; grau ins Gelbe, Rothe
oder Braune.

57. **Bimsstein**. . . Schwammige, perlmutterglänzende, weissliche bis schwärzlichbraune, kantendurchscheinende, harte, sehr spröde, scharf anzufühlende Masse.

58. **Schieferschlacke**. Harte, in Wasser nicht mehr aufweichende Thonmasse von rother, gelber, lavendelblauer oder schwärzlicher Farbe; bald dünn-schiefrig (gebrannter Schieferthon); bald stark gesintert und zerborsten (Porcellanjaspis).

F. Schlackenartige Gesteine.

59. **Verschlackte Lava**. Poröse, durchlöchernte, aufgeblähte, glas- oder fettglänzende Lava mit leeren Höhlungen.

60. **Verschlackter Basalt**. . . Blasige, schaumige, aufgeblähte, selten glasige Basaltmasse. — Rheinischer Mühlstein.

61. **Erdschlacke**. . . Schlackige, schaumartig aufgeblähte, äusserlich bisweilen verglaste, Stücke gerösteten Kohlenschiefers einschliessende Massen.

IV. Trümmergesteine.

62. **Grauwacke**. . . Abgerundete und eckige Bruchstücke von Quarz, Kiesel-, Thon-, Glimmerschiefer, Granit oder Feldspathporphyr durch Thonschiefermasse verbunden; gross- bis feinkörnig; in letzterem Falle dünn- bis dick-schiefrig (Grauwackenschiefer).

63. **Sandstein**. . . Abgerundete und eckige, gleichgrosse Quarzkörner verbunden durch ein thoniges, kieseliges, mergeliges, kalkiges oder eischüssiges Cäment, dem oft viele Glimmerschuppen beige-mengt sind (Psammite); grob- bis feinkörnig; weiss oder durch Eisen gefärbt. Kieselige Sandsteine, deren

Bindemittel aus Kalk besteht, bilden die Molasse und den etwas härteren Macigno.

64. Conglomerate (Pud-
dinge) Abgerundete, Fragmente, (Rollsteine)
verschiedener, zerstörter Gebirgsar-
ten, sind in ein fremdartiges, meist
thoniges oder kieseliges Bindemittel
eingebacken; durch ein kalkiges
Bindemittel ausgezeichnet ist die
Nagelfluhe

Zu den Conglomeraten von Bims-
stein gehört auch der Trass; er
hat eine dichte, im Bruch erdige
Grundmasse; auch die vulkani-
schen und basaltischen Tuffe;
so wie der Peperino gehören
hierher und sind Reibungconglo-
merate.

65. Breccien Unterscheiden sich von den Con-
glomeraten nur dadurch, dass die
Bruchstücke nicht abgerundet, son-
dern eckig und scharfkantig sind.

V. Lose Gesteine.

66. Gerölle (Geschiebe) Bruchstücke, selbst grössere Blöcke
verschiedener Felsarten, welche re-
gellos umherliegen.

67. Gruss Resultat der Verwitterung verschie-
dener, vorzüglich der ungleicharti-
gen Gebirgsarten; erscheint meist
wie grober Sand.

68. Sand Ist aus der Auflösung verschiedener,
zumal quarziger Gesteine entstanden
und ist klein bis feinkörnig.

69. Lapilli Von Vulkanen ausgeworfene, kleine
Bruchstücke von Lava, Schlacken
und Bimsstein; kleinere Bruchstücke
bilden den vulkanischen Sand, und
werden sie staubartig, die vulka-
nische Asche.

70. Dammerde. Ist das Resultat der Zersezung der verschiedenartigsten Gesteine und daher bald thonig, bald kalkig, bald sandig.

VI. Fossile Brennstoffe.

(Vergleiche den mineralogischen Theil.)

71. Schwarzkohlen.

- a) Anthracit.
- b) Schieferkohle, Blätterkohle.
- c) Kannelkohle.
- d) Russkohle.
- e) Faserkohle.
- f) Pechkohle.

72. Braunkohle.

- a) Gemeine Braunkohle.
- b) Bituminöses Holz.
- c) Papierkohle, Blattkohle.
- d) Lettenkohle.
- e) Moorkohle.
- f) Erdkohle.
- g) Alaunerde.

73. Torf.

B. Geognostisches Vorkommen der Gebirgsarten.

I. Neptunische Gebilde.

Mit Hülfe der darin vorkommenden Versteinerung lassen sich die neptunischen, geschichteten Gebirgsarten, wenn wir mit den älteren beginnen, in folgender Reihenfolge zusammenstellen:

A. Paläozoische Gebilde.

I. Cambrisches System.

Es ruht auf gneusartigen oder granitischen Gesteinen, und besteht vorzugsweise aus meist hartem und seidenglänzendem Thonschiefer und damit abwechselnden schiefrigen, feinkörnigen Grauwacken mit untergeordneten schwarzen, splittrigen Kalksteinen,

die Schiefer gehen oft in Gneuse über, die Grauwacken nicht selten in Quarzfels. Alle Schichten dieses Systems pflegen stark aufgerichtet und durch plutonische Massen verändert zu sein; Versteinerungen sind kaum daraus bekannt.

II. Silurisches System.

In England unterscheidet man:

1. **Llandeilogesteine**, feinkörnige, schiefrige Grauwacken, zuweilen Kalk enthaltend und in quarzige Schichten übergehend.
2. **Caradocgesteine**, tief dunkelrothe und hellgrüne von rothen Adern durchzogene Sandsteine, wechseln bisweilen mit dünnen kalkigen Schichten ab.
3. **Wenlocksichten**, thonige Schiefer und schmutzige, petrefactenreiche Kalksteine gehen nach oben in dicke Bänke und krystallinischen, bläulichen Kalkstein über, die wieder von kalkreichen Thonschiefern bedeckt werden.
4. **Ludlowfelsen**, auf festen, reinen Thonschiefern ruhen die halbkrySTALLINISCHEN thonigen Aymestrykalke, und auf diesen glimmerhaltige, graue Sandsteine.

Auf ähnliche Weise ist diese Abtheilung in andern Gegenden zusammengesetzt, die Stellung der Schichten weicht von der der cambrischen immer ab. Viele Versteinerungen. Mächtigkeit in England etwa 6000 Fuss.

III. Devonisches System.

Im südwestlichen England unterscheidet man:

1. **Die Ziegelsteinsichten**, harte, sehr feinkörnige, in dünnen Platten abgesonderte Sandsteine, die nach unten auch in Grauwacken übergeht.
2. **Die Kornsteinsichten**, bunte Mergel, welche mit thonigen Sandsteinen und unreinen Kalken wechseln, in dem kleine kornartige Concretionen liegen.
3. **Sandsteine**, meist rothbraune dicke Schichten von mit einander abwechselnden Conglomeraten, kieseligen Puddingen, bunten Mergeln und Sandsteinen, die auch wohl schwache Lagen von Steinkohlen enthalten.

Die Mächtigkeit der Bildung wird auf 10,000 Fuss angegeben.

Aehnlich ist das an Versteinerungen sehr reiche System auch in andern Gegenden entwickelt; es besteht überall aus mannigfaltig wechsellagernden Thonschiefern, die bisweilen in Kieselschiefer

übergehen, aus Grauwacken und Conglomeraten, die in Quarzfelsen und Sandsteinen verlaufen, und aus untergeordneten, oft stockförmigen Kalk- und Dolomitmassen.

Die drei vorstehenden Systeme wurden früher als Uebergangs- oder Grauwackengebirge zusammengefasst.

IV. Steinkohlensystem.

1. **Kohlenkalk**, Bergkalk, dicht, dunkelgrau bis schwarz, splittig; reich an Petrefacten, in den ältern Lagen schiefrig.
2. **Flötzleerer Sandstein**, grobkörnig und oft conglomeratartig; arm an Versteinerungen.
3. **Kohlengebirge**, weiche, glimmerführende, graue Sandsteine, Kohlenschiefer und Steinkohlen wechseln oft viele Male mit einander ab, und umschliessen bisweilen auch reiche Lager von thonigem Sphärosiderit. Viele Pflanzenversteinerungen.
4. **Feinkörnige Sandsteine** mit einzelnen Bänken eines rauen, porösen Süsswasserkalkes.

V. Zechsteinsystem.

1. **Roth es Todt liegendes**, ein meist rother, seltener grüner oder grauer feinkörniger, nach unten oft in ein Conglomerat übergehender Sandstein, dessen thonige Grundmasse nicht selten vorherrschend wird; der Sandstein ist bald compact bald schiefrig und wechsellagert bisweilen mit Porphyrbreccien; wird bis 2,400 Fuss mächtig.
2. **Weiss liegendes**, ein weissgrauer, feinkörniger, ausser Sand und Thon auch etwas Kalk enthaltender Sandstein von höchstens 60 Fuss Mächtigkeit. Mergel, Schiefer, Gyps, Erdpech und pulverige Sandsteine erscheinen untergeordnet.
3. **Bituminöser Mergelschiefer**, bläulich-, bräunlich-, graulich- oder sammtschwarze, sehr dünn geschichtete, milde Schiefer, welche die an eingesprengten, silberhaltigen Kupfererzen so reichen Kupferschiefer (Lette, Kammschalen, Schieferkopf, Noberge) umschliessen, kaum eine Mächtigkeit von 3 Fuss erreichen, und viele fossile Fische enthalten.
4. **Das Dachflötz**, Dunkelgraue mit feinen weissen Glimmertheilchen gemengte Mergelschiefer von 4—8 Fuss Mächtigkeit (Oberberge, Dachklotz, Fäule).
5. **Zechstein**, ein thonhaltiger, dünngeschichteter, grauer, dichter Kalkstein mit bisweilen stängeliger oder zapfenförmiger Structur und 12 — 100 Fuss mächtig.

6. Rauchwacke, rauchbrauner oder grauer, zelliger, rauh anzufühlender, bisweilen oolithischer, im Bruche splittriger oder breccinartiger Dolomit.

7. Asche: eine feine, staubartige, magre, dunkle, bituminöse Mergelerde mit eingemengten Stücken von Rauchwacke, und 3 bis 50 Fuss mächtig.

8. Stinkkalk, ein gelbgrauer, oder bräunlichschwarzer, beim Zerschlagen stinkender Kalkstein mit meist gebogenen und zertrümmerten Schichten; 3 — 90 Fuss mächtig.

9. Schlottengyps, weisse oder graue, meist krystallisch körnige, viele Höhlen umschliessende, oft stockartige sehr mächtige Gypsmassen, im Innern meist aus weissem, grauen oder bläulichen dichten Anhydrit bestehend.

10. Letten, ein bläulicher oder graulicher, mit Säuren brausender Mergel mit Nieren und Concretionen von Dolomit und Gyps.

Die fünf letzten Glieder folgen bisweilen in anderer Ordnung und wechseln auch wohl mehrere Male mit einander ab. Der Gyps kann fehlen, oder die andern Glieder ganz verdrängen. Versteinerungen sind in dem ganzen Systeme, welches man auch wohl das Permische nennt, selten.

In den Vogesen und im Schwarzwalde folgt auf das rothe Todtliegende der wahrscheinlich mit dem Zechstein zu gleicher Zeit gebildeten Vogesensandstein; von feinem, eckigen, krystallinischen Korn, auf der Bruchfläche lebhaft glänzend, und mit ziegelrothen bis bräunlichen Glimmerblättchen gemengt, bisweilen in feste Puddinge übergehend.

B. Secundäre Gebilde.

VI. Triassystem.

1. Bunter Sandstein, ein dunkelrother, selten weisser oder geflekter, meist thoniger, feinkörniger, glimmerreicher, mit Schieferletten abwechselnder, gewöhnlich stark geschichteter Sandstein; in dem untern Theile finden sich im nördlichen Deutschland nicht selten grobkörnige Roggensteine und auch wohl steinsalzreiche Gypsmassen. Fast ohne Petrefacten.

2. Muschelkalk, zu unterscheiden sind:

a) der Wellenkalk, rauchgraue, dünngeschichtete, wellenförmig gebogene Kalke, mit schwarzgrauen Thonen und Gyps wechsellagernd; in andern Gegenden finden sich mehr dolomitische Kalke, Mergel und Mergelschiefer.

- b) Anhydritgruppe: mächtige Lager von wenig geschichtetem, dunkelgrauen Salzthon, lichtgrauen oder blauen Anhydrit, Gyps und schwärzlichgrauem Kalk; bis 100 Fuss mächtige Steinsalzmassen sind darin abgelagert.
- c) Muschelkalk von Friedrichshall, compacte, rauchgraue oder gelbliche, oft dolomitische Kalksteine mit muscheligen Bruch und vielen Versteinerungen; die untern Schichten sind reich an Enkriniten; darüber liegen dünne Lager von oolithischen Kalken, dann mächtige rauchgraue Kalkmassen; zu oberst gelbe, erdige Dolomite.
- d) Lettenkohle, dunkelgraue schiefrige Thone und mit Mergelschiefern abwechselnde Schichten von schwarzen, im Bruch erdigen Kohlen; darüber oft schwarzgraue Sandsteine mit Eisensteinnieren.

3. Keuper:

- a) Dolomit, schmutziggelb oder rauchgrau, oben in eine Knochenbreccin übergehend.
- b) Bunte Mergel, blautoth, mit scharf begränzten grünen, gelben und blauen Zwischenlagern; dünnschiefrig, mit Letten und Thon gemengt, Bitterde haltend, sehr stark geklüftet; bisweilen mit dünnschiefrigen Sandsteinen und Dolomiten wechsellagernd oder Gypse umschliessend.
- c) Schilfsandstein, gelblichweiss, feinkörnig, nach oben grobkörnig und kieseliger, und Nester von Pechkohle umschliessend.

Die bis 800 Fuss mächtige Keuperbildung enthält fast nur in den Sandsteinen Pflanzenabdrücke, in den Mergeln Fischreste.

VII. Jurasystem.

1. Lias.

- a) Knochenlager, ein durch schwärzlichen Schieferthon verbundenes Knochenconglomerat, von stark geschichteten, dunkelbraunen oder schwärzlichen Schiefern bedeckt.
- b) Gryphitenkalk, sandig, nach oben dünnschiefrig mit Gryphae arcuata und Ammonites Bucklandi.
- c) Belemnitenschichten, eisenhaltige, bisweilen oolithische Mergel mit Ammonites capricornus und Gryphaea cymbium.
- d) Posidonienschiefer, dünngeschichtete, schwärzliche Schieferthone mit Posidonien.

e) Obere Mergel und blauschwarze Thone mit *Trigonia Navis* und *Ammonites opalinus*

2. Unterer Oolith; die Reihenfolge in England ist:

- a) Marlysandstein, nach oben Kalkconcretionen aufnehmend und dann in einen braunen, harten Kalkstein mit eisenhaltigen Oolithen übergehend. Zu oberst liegen oolithische Quadersteine.
- b) Walkererde, blaue und gelbe Thone mit kalkigen Concretionen, dann eine Schicht Walkererde und darüber Thone, endlich ein weissliches Thonlager mit Kalkconcretionen.
- c) Grosser Oolith, oolithische oder lumacchellenartige, bisweilen eisenhaltige, durch dünne braune Mergel getrennte Kalklager; zu unterst liegen in einigen Gegenden die mergeligen Stonesfieldchiefer mit den ältesten Säugethierresten.
- d) Bradfordthon, blaue mergelige, nach oben sandige Schichten.
- e) Der Forestmarble, ein muschelreicher, fester Kalkstein, der mit Thon, Mergeln und Sandadern wechsellagert.
- f) Der Cornbrash, schiefrige, grobkörnige Kalke.

In Süddeutschland wird die ganze Abtheilung durch dunkle Thone und darüber liegende, mächtige Bänke eines eisenschüssigen, braunen Sandsteins vertreten.

3. Oxfordgruppe.

- a) Oxfordthon auf einem dünnen Lager kalkiger, oft eisenschüssiger Concretionen (Kelloway-rock) liegen mächtige, bläulichschwarze Thonschichten, die mit dünnen, grauen Kalkbänken und bituminösen Schieferthonen wechsellagern.
- b) Kalkiger Sandstein (Calcareous grit) bisweilen mit kugeligen Kalkconcretionen (Knotenkalk).
- c) Corallenkalk, compacte, viele Corallen enthaltende, helle Kalksteine.
- d) Oxfordoolith, gelbe oder weisse, meist dünngeschichtete, kalkige, bisweilen eisenschüssige Oolithe, mit untergeordneten dichten oder sandigen Kalken und Breccien. Die oberen Lagen unterscheidet man wohl als Nerinäen- und als Astartenkalk.

In Süddeutschland ruhen auf dem Oxfordthone bis 600 Fuss mächtige dünne Lager eines weissen Kalksteins, mit Mergelschichten abwechselnd; darüber liegen mächtige, compacte, zahllose Corallen umschliessende, im Fränkischen Jura in Dolomite verwandelte, weissliche Kalkmassen.

4. Portlandgruppe.

- a) Kimmeridgeschichten, graue oder bläuliche, bisweilen schiefrige oder sandige, auch wohl bituminöse Mergel mit *Exogyra Virgula*.
- b) Portlandkalke, weisse oder grauweisse, selten schwärzliche, oft körnige oder oolitische, compacte, feste Kalke mit meist erdigem Bruche. *Pteroceras Oceani*. Ein Aequivalent sind die sehr feinkörnigen, compacten, gelblichen oder bläulichen lithographischen Kalkschiefer von Solenhofen.

VIII. Kreidesystem.

1. Wälderthongebirge, eine Süsswasserbildung.

- a) Purbeckschichten, dünne, geschichtete, bläuliche Kalksteine mit bläulichen Schieferthonen wechsellagernd; den obern Schichten gehört der Sepulitenkalk an.
- b) Hastingsandstein, helle schiefrige oder in mächtigen Bänken abgelagerte, bisweilen einige bauwürdige Kohlenflötze enthaltende Sandsteine; in den untern Schichten kommen auch wohl Eisenlager vor.
- c) Wälderthone, bläuliche Schieferthone und dünne, bisweilen sandige, auch wohl von Eisenerzen begleitete Kalk- und Mergelschichten wechseln mit einander ab. *Cyrena*, *Unio*, *Paludina*, *Potamides*.

2. Untere Kreide.

- a) Hilsthon, schwärzliche Thone und Schieferthone.
- b) Hilsconglomerat, gelbliche und bräunliche oft breccienartige, auch wohl oolithische Eisensteine enthaltende Mergel.

In der Schweiz und am Mittelmeere ruhen unmittelbar auf den Juraschichten: α) Neocomien, blaue Thon- und Mergellager und gelbe Kalke mit *Spatangus retusus*. β) Caprotinenkalk: körnige, weisse oder graue, undeutlich geschichtete Kalke mit *Caprotina ammonia*. γ) Aptische Mergel, rothe und grüne, bunte Mergel mit Eisenoolith und Ocker.

- c) Unterer Grünsand, meist feinkörnige, oft braun oder roth gefärbte und stark eisenschüssige, seltener in den untern Lagen Kalkschichten enthaltende, oft sehr mächtige, häufig in Quader abgesonderte Sandsteine.
- d) Gault, blaue und graue, oft glimmerreiche dünnschiefrige, nach oben in einen blauen Thon übergehende Mergel.

e) Oberer Grünsand, ein feinkörniger, — oft glimmeriger Sandstein mit vielen dunkelgrünen Chloritkörnern; einzelne Schichten sehr thonig oder mit halbfesten Kieselconcretionen.

3. Obere Kreide.

a) Plänerkalk, weissliche oder graue, oft thonige Kalkmergel und Kalksteine. In Frankreich erscheinen gelbliche, mit grünen Chloritkörnern gemengte, häufig helle, hornige Kiesel enthaltene Kalksteine (Kreidetuff, Chloritische Kreide); am Mittelmeer liegen unter, in und über letztern mächtige Lager eines weissen, kreidigen Kalksteins mit Hippuriten, Hippuritenkalk, der in den Alpen durch rothe oder graue Kalke mit vielen gewellten Thonblättern (Seewerkalk) vertreten wird; dort und am Mittelmeere werden diese Bildungen noch von dünngeschichteten, schwärzlichen, quarzigen Sandsteinen oder gewundenen Schiefern, oder grauen, oft sandigen, vielleicht schon tertiären Kalken, welche viele Nummuliten enthalten (Nummulitenkalk) gleichförmig überlagert.

b) Weisse Kreide, die Schichten des Plänerkalkes werden nach oben allmählig reiner und weisser und gehen in weisse, schreibende Kreide über, deren Masse fast ungeschichtet und nur durch einzelne Feuersteinlager unterbrochen ist. Vertreten wird die Kreide bei Mastricht durch gelbliche, sandsteinartige Kalke, im nördlichen Deutschland gewöhnlich durch gelbliche Sandsteine, oder sandige, oft breccienartige Mergel.

C. Tertiäre Gebilde.

1. Molassengebirge, es ist nur in isolirten Becken abgelagert, besteht aus Kalk-, Mergel-, Thon-, Sand- und Sandsteinschichten und umschliesst gewöhnlich zahlreiche Versteinerungen; nach der Anzahl derjenigen Arten, welche mit lebenden übereinstimmen, unterscheidet man:

a) Eocene Gruppe mit 3 p. C. lebender Arten; hierher gehören die Schichten des Pariser Becken's bis incl. Grobkalk, der Londonthon, das Mecklenburger Becken; die Schichten von Boom in Belgien, der Monte Bolca und das Mississippigebiet.

b) Miocene Gruppe mit 19 bis 26 p. C. lebender Arten: Obere Schichten des Pariser Beckens, das Becken von Bordeaux, die Faluns der Touraine, die unteren Schichten der Auvergne, die Braunkohlen des Languedoc — der Crag in

England — die Becken von Mainz, Georgensmünd, Wien (Tegel), Polen und Podolien. — Die Molasse der Schweiz (?) und die Schichten bei Turin.

c) Pliocen Gruppe mit 52 p. C. lebender Arten: Oberes Becken der Auvergne; Becken des Landes und La Bresse. — Das Hessisch-Westphälische Braunkohlengebirge, Oeningen, die Subappenninen, das Arnothal, Sicilien, — die Pampas und der Brasilianische Knochenthon.

Im Mecklenburgischen finden sich als eocene Massen braune eisenschüssige Sandsteine (Sternberger Kuchen). Im Mainzer Becken findet sich zu unterst a) ein Töpferthon, darüber folgt b) feinkörniger Sand, c) ein plastischer Thon mit sandigen und kalkigen Mergeln, d) compacter Kalk, e) ein unten sandiger Meerkalk, f) thonige und kalkige Mergel, g) conglomerirter Kalk, h) Mergel mit kalkigen und sandigen Zwischenschichten, i) Töpferthon, k) ein Knochenconglomerat, l) mächtiger oberer Knochensand, dann m) ein Kalkconglomerat und darüber Löss.

Die pliocenen Braunkohlenlager werden von Thon und Letten, oder auch von Sandsteinen oder dichtem Quarzfels (Quarzfritte) begleitet; fast gleiches Alter haben gelbliche, sandige, lose Mergelablagerungen im Wesergebiete.

Im Becken von Wien liegen auf weissem Kieselsande: a) 310 Fuss blaue Mergel, b) 120 Fuss gelbe Sandschichten und kalkiger Grand, c) 40 Fuss blaue Mergel (Tegel), d) 350 Fuss Kalkconglomerate und molasseartige Sandsteine (Leithakalk), 140 Fuss harte, blasige, lichte Kalksteine oder Sand- und Kiessschichten.

Zwischen den Alpen und dem Jura liegen auf der sehr mächtigen, grünlichgrauen, feinkörnigen Molasse die ebenfalls wenig geschichtete und auch sehr mächtige Nagelfluhe.

2. Knochenhöhlen, Knochenbreccien und die älteren, aus faustdicken Geröllen und Sand (Grand) bestehenden Alluvionen.

3. Erratische Blöcke, Findlinge; gleich alt ist vielleicht der Löss des Rheinthales.

D. Aluvialgebilde.

1. Tropfsteine, Kalktuff, Travertin, aus kalkhaltigen süßen Gewässern abgelagert.

2. Erhärtete Dünen u. s. w. (Sandmassen).

3. Flussgeschiebe.

4. Lehm, Schlamm und Sand.

5. Die Marschen.

6. Raseneisensteine.

7. Torfmoore.

8. Die Ackerkrume.

II. Metamorphe Gesteine (Grundschiefergebirge).

Unter den ältesten, Versteinerungen führenden Gesteinen und zwischen ihnen und den Massegesteinen finden sich sehr häufig Gesteinsmassen, die keine organischen Ueberreste enthalten, aber doch noch eine Art von Schichtung besitzen, und vielleicht aus Meeresablagerung entstanden sind. Zu oberst pflegen feste Thonschiefer, darunter Glimmerschiefer und unter diesen Gneuse zu liegen und grössere Gebirgsmassen zu bilden; alle drei gehen allmählig in einander über, und enthalten häufig untergeordnete Lager von Chlorit- und Talkschiefer, Hornblende-, Turmalin-, Graphit-, Quarz-, oder Kieselschiefer.

III. Massengesteine (Grundgebirge).

Die hierher gehörende Gesteine enthalten weder Petrefacten, noch sind sie deutlich geschichtet; alle scheinen im glühend-flüssigen Zustande aus dem Erdinnern hervorgetreten zu sein, und dabei die in der Nähe befindlichen neptunischen Gesteine oft bedeutend verändert zu haben; sie bilden bald grössere Gebirgsmassen, bald nur Lager oder Gänge in andern Massen. Es gehören hierher.

- A. Die granitartigen Gesteine, namentlich der Syenit, der jüngere Granit und der Granulit; sie scheinen während der Ablagerung des Grauwackengebirges emporgestiegen zu sein; ganz ähnliches Verhalten zeigen der Protogyn, Miascit und Topasfels.
- B. Die quarzhaltigen Porphyre; sie bilden häufig stockförmige Massen, und scheinen vorzugsweise während der Ablagerung des Kohlengebirges emporgestiegen zu sein.
- C. Die Grünsteine, nämlich die Diabase und Diorite, Aphanitporphyre, Hornblendefelsen und manche Mandelsteine und Wacken, auch der Eklogit, Erlanfels, Serpentin und Schillerfels schliessen sich ihnen an; Eruptionen dieser Gesteine sind noch nach Ablagerung des Rothliegenden vorgekommen.
- D. Die Melaphyre, die augithaltigen haben selbst das Jura-gebirge durchsetzt, und scheinen öfters dessen Kalke in Dolomite verwandelt zu haben.
- E. Die Basalte nebst den dazu gehörenden Doleriten, Wacken, Tuffen und Conglomeraten durchsetzen alle Flötzgebilde, nur

nicht die Diluvialgebilde, und sind vielleicht selbst jünger als die folgenden Gesteine, nämlich:

F. Die Trachyte und Phonolithe, welche sich in Deutschland fast nur im Siebengebirge, am Kaiserstuhl und in Böhmen finden, und oft die Basis vulkanischer Gegenden zu bilden scheinen.

G. Die Laven oder die noch jetzt aus Vulkanen feurig-flüssig sich ergiessenden, in mineralogischer Beziehung von den Basalten und Trachyten oft kaum zu unterscheidenden Gesteinsmassen.

III. Massengesteine (Grundgebirge).

Die hierher gehörigen Gesteine enthalten weder Petrefakten noch sind sie deutlich geschichtet; sie scheinen im Uebereinstimmung mit dem Zustande aus dem Erdinnern hervorgegangen zu sein, und dabei in der Nähe befindliche reptilische Gesteine oft bedeutend verändert zu haben; sie bilden bald grössere Gesteinsmassen, bald nur Lager oder Gänge in andern Massen. Es gehören hieher:

A. Die granitartigen Gesteine, namentlich der Syenit, der jüngere Granit und der Granatit; sie scheinen während der Ablagerung des Granitgebirges emporgehoben zu sein; ganz ähnliches Verhalten zeigen der Erythrin, Muschel und Topasfels.

B. Die porphyrischen Gesteine; sie bilden häufig stockförmige Massen, und scheinen vorzugsweise während der Ablagerung des Kohlengebirges emporgehoben zu sein.

C. Die Grünsteine, nämlich die Diabase und Diorite, Amphibolite, Hornfelssteine und manche Mandelsteine und Wacken, auch der Eklogit, Eklogit, Serpentin und Schiefersteine; diese Gesteine schliessen sich ihnen an; Eruptionen dieser Gesteine sind noch nach Ablagerung des Hohlgebirges vorgekommen.

D. Die Melaphyre, die auskristalligen haben selbst das Jura-gebirge durchsetzt, und scheinen öfters dessen Kalk in Dolomite verwandelt zu haben.

E. Die Basalte meist den dazu gebörenden Doliten, Wacken, Tuffen und Conglomeraten durchsetzen alle Flötzgebirge, nur

Register.

- | | | |
|-------------------|-------------------|--------------------|
| Abazit 133 | Alluaudit 689 | Antigorit 1108 |
| Acadiolith 166 | Almandin 81 | Antimonbleierz 240 |
| Achat 220 | Aluminat 663 | — blende 359 |
| Achmit 386 | Alumocalcit 656 | — blüthe 261 |
| Adlerstein 650 | Alunit 167 | — fahlerz 14 |
| Adular 330 | Amalgam 38 | — gediegenes 154 |
| Aedelforsit 772 | Amblygonit 514 | — glanz 239 |
| Aegyrin 381 | Ambra 1054 | — kupferglanz |
| Aerolith 1228 | Amethyst 220 | — 244 |
| Aequinolite 1232 | Amianth 785 | — nickel 188 |
| Aeschynit 315 | Amphibol 381 | — — kies 28 |
| Agalmatolith 1030 | Amphigen 92 | — ocher 1165 |
| Akmit 386 | Amphilogit 584, a | — oxyd 261 |
| Akonit 335, a | Amphodelith 360 | — phyllit 261 |
| Aktinolith 381 | Analzim 575 | — silber 189 |
| Alestite 387 | Anauxit 620 | — — blende 155 |
| Alaun 63 | Anatas 108 | — — glanz 244 |
| Alaunerde 815 | Andalusit 297 | — spath 261 |
| Alaungrammit 167 | Andesin 396 a | Antrimolith 663 |
| Alaunstein 167 | Anglarit 837 | Apatit 209 |
| Albin 123 | Anhydrit 274 | Aphanes 837 |
| Albit 396, a | Ankerit 164 | Aphrodit 1033 |
| Allanit 400 | Anorthit 396 b | Aplom 81 |
| Allochroit 81 | Anthophyllit 381 | Apophyllit 123 |
| Allogonit 281 | Anthosiderit 826 | Aquamarin 205 |
| Allomorphit 267 | Anthracit 1051 | Arendalit 379 |
| Allophan 1022 | Anthrakolith 163 | Arfvedsonit 381 |
| | Antiedrit 124 | Arguerit 38 |

- Arragonit 275
 Arsen, gediegenes 564
 Arseniksiderit 704 a
 Arsenige Säure 63
 Arsenikalkies 235 a
 Arsenikantimon 564
 Arsenikblende 357
 Arsenikblende, gelbe 300
 — blüthe 63, 351
 — eisen 235 a
 Arsenik, gediegenes 564
 — glanz 649
 — kies 235 a
 — kobalt 28
 — — kies 28
 — kupfer 884
 — mangan 904
 — nickel 875, 885
 — schwärze 1178
 — schwefelnickel 30
 — silber 880 188
 — spiessglanz 560 a
 — wismuth 57
 Arsenosiderit 235 a
 Arsenphyllit 63
 Asbest 381 785
 Asbest, schilernder 860
 Asphalt 1018
 Asterglimmer 217
 Atakamit 290
 Atelestit 361
 Augit 387
 Aurichalzit 686
 Auripigment 300
 Automolit 62
 Avanturin 220
 Axinit 398
 Azurit 375
- B.**
- Babingtonit 400
 Baierine 323
 Baikalit 387
 Baltimorit 801
 Bamlit 789
 Barsovit 997
 Baryt 267
 Baryt-Flussspath 65
 Barytmanganerz 927
 — schwefelkohlen-saurer 201
 Barytocalcit 346
 Basanomelan 153 b
 Basicerine 1082
 Basitomglanz 244
 Batrachit 292
 Baudisserit 1121
 Beaumontit 134
 Beilstein 398
 Beraunit 807
 Berengelit 1111
 Bergflachs = Amianth
 — grün 687
 — holz = Amianth
 — kork 785
 — krystall 220
 — leder 785
 — milch 163
 — öl 1254
 — papier 785
 — pech 1018
 — seife 1127
 — talg 1201
 — theer 1254
 Bernstein 1054
 Berthierit 427
 Beryll 205
 Berzelin 764
 Berzelit 1141 a
 Berzelit 466
 Beudantit 63
 Bildstein 1030
 Bimsstein 954
- Binarkies 233
 Biotin 396 b
 Bismutit 1138
 Bitterkalk 164
 Bittersalz 228
 Bitterspath 164
 Blättererz 243
 Blätterkohle 1019
 Blättertellur 242
 Blätterzeolith 332
 Blaubleierz 21
 Blaueisenerde 375
 Blaueisenstein 375
 Blauspath 285
 Blei, arsensaures 198
 — chromsaures 357
 — gediegenes 37 a
 — kohlensaures 263
 — molybdänsaures 116
 — phosphorsaures 198
 — schwefelkohlen-saures 349
 — salzsaures 466
 — scheelsaures 149
 — wolframsaures 149
 Bleiantimonerz 244
 — blüthe 198
 — carbonat 263
 — chlorit 377
 — chromat 357
 — fahlerz 240
 — gelb 116
 — glanz 21
 — glas 263
 — glimmer 263
 — glötte 1168
 — gummi 662
 — hornerz 135
 — lasur 326
 — molybdat 116
 — ocher 1161

Bleioxyd, selenigsau-	Brithynallit 63	Chlorblei 466
res 693	Brochantit 289	Chlorbleispath
— scheelat 149	Bromsilber 74	135
— schweif 24	Brongniartit 317	Chlorit 186 a
— spath 263	Bronzit 387	Chloritoid 186 a
— sulphat 163	Brookit 298	Chloromelan = Cron-
— vitriol 263	Bruzit 212 362	stedtit
Blende 13	Bucholzit 395	Chlormerkur 135
Blödit 804	Bucklandit 388	Chloropal 1153
Blutstein 154	Buntbleierz 198	Chlorophacit 1229
Bohnerz 650	Buntkupfererz 37	Chlorophäit 1229
Bohl 1129	Bustamit 387	Chlorophan = Fluss-
Bologneserspath 267	Bytownit 992	spath
Boldonit 495		Chlorophyllit 205
Bonsdorffit 215	C.	Chlorospinell = Spinell
Borax 320		— quecksilber 135
— säure 434	Cacholong 656	Chlorsilber 74
Borazit 56	Calait 1182	Chlorspath 466
Borsäure 434	Caledonit 285 a	Chondrodit 362
Botryogen 319	Calstronbaryt 267	Chonikrit 1067
Botryolith 329	Cancrinit 210	Christianit 396 b
Boulangerit 749	Candit 60	Chrom Eisenstein
Bournonit 240	Caporcianit 75	27
Braunbleierz 198	Carinthin = Hornblende	Chromocher 1184
Brauneisenstein	Cavolinit 210	— stein 1184
650	Cererit 996	Chrysoberyll 254
Braunkohle 815	Cerin 409	Chrysolith 292
Braunmanganerz	Cerium, flusssaures	Chrysophan = Clintonit
246	218	Chrysopras 220
Braunmenakerz 40	Cerolith 1138 a	Chrysotil 861
Braunit 109	Ceylonit 60	Cimolith 1127
Braunsalz 718	Chabasit 166	Citrin 220
Braunspath 164 171	Chalcedon 656	Clausthalie 34
Braunstein 247	Chalilith 1031	Cleavelandit 396 a
— grauer 246	Chalkolith 139	Clintonit 217
— piemontesischer	Chalkophacit = Lin-	Cluthalit 697
379	senerz	Cölestin 267
— rother 171	Chalkosiderit = Grün-	Colophonit 81
— schwarzer	eisenstein	Columbit 323
— blende 29	Chalkotrichit 15	Commingtonit 379
Breislakit 809	Chamoisit 23 a	Comptonit 275 a
Breunerit 164	Chelmsfordit 124	Condrodit 362
Brevizit 795	Chiastolith 308	Condurrit 1205
Brewsterit 353	Childrenit 256	Conit 164

- Copal, fossiler 1111
 Coquimbit 224
 Cordierit 285
 Cotunnit 788
 Couzeranit 384
 Craytonit 154
 Crichtonit 154
 Crispit 142
 Cronstedtit 217
 Cruzit 30
 Cuban 407 a
 Cubizit 75
 Cuboit 75
 Culebrit 905
 Cyanit 395
 Cymophan 254
 Cyprin 147
- D.**
- Dalarnit 235 a
 Damourit 572
 Danait 235 a
 Danburit 362
 Datoilith 329
 Davidsonit 205
 Davyn 210
 Davyt 728
 Delvauxit 1048
 Demant 60
 — spath 160
 Dermatit 1057
 Desmin 272
 Devonit 282
 Deveylit 1033
 Diadochit 1054
 Diallag 387
 Diamant 60
 Diaspor 397
 Dichroit 285
 Didrimit 584 a
 Diopsid 387
 Dioptras 169
 Dioxylith 326
- Diploit 399
 Dipyr 124
 Disthen 395
 Dolomit 164
 Doppelspath 163
 Dreelit 162
 Dufrenit 650, 689
 Dysklasit 782
 Dysluit 68
 Dysodil 1195
- E.**
- Eckbergit 124
 Edelforsit 772
 Edelit 271
 Edelopal 656
 Edingtonit 124
 Edwardsit 367
 Egeran 147
 Ehlit 290
 Eisenantimonerz 427
 — blau 375
 — blüthe 275
 — chrom 27
 Eisen, gediege-
 nes 20 a
 — glanz 154
 — erz, octaëdrisches
 23 a
 — glimmer 154
 — granat 81
 — graphit 191
 — kies 17
 — kiesel = Quarz
 — kobaltkies 26
 — manganerz 110
 — mohr 23
 — mulm 23
 — nickelkies 597
 — oxyd 154
 — — hydrat 650
 — pecherz 502
 — peridot 292
 — resin 1170
- Eisenschaum 154
 — schwärze 23
 — steinmark 1182
 — vitriol 319
 Eisspath 330
 Eläolith 210
 Elaterit 1199
 Embrithit 889 a
 Emmonit 265
 Epidot 379
 Epistilbit 282
 Erbsenstein 163
 Erde, lemnische 1129
 Erdharz 1199
 Erdkobalt 359, 700
 Erdöl 1254
 Erdpech 1018
 — elastisches 1199
 Eremit 1228 370
 Erinit 1228 169
 Erlan 963
 Erythronbleierz 199
 Essonit 81
 Euchlorglimmer 169
 Euchroit 289
 Eudialith 178
 Eugenesit 1223
 Eugenglanz 195
 Eukairit 887
 Euklas 529
 Euklasit 209
 Eulitin 57
 Euzeolith 332
- F.**
- Fahlerz 14
 Fahlunit 370
 — harter 285
 Faserkiesel 395
 — resin 1170
 — zeolith 282
 Fassait 387
 Faujasit 114
 Fayalit 1228

Federalaun 63, 728	Gekrösstein 666, 274	Granatit 81
Federerz 740, 239	Gelbantimonerz 1165	Graphit 191
Feldspath 330	Gelbbleierz 116	Grauantimonerz
Feldstein 330	Gelbeisenkies 17	239
Felsit 330	Gelbeisenstein 650	Graueisenkies 233
Fergusonit 119	— erde 650	— golderz 243
Fettbol 1129	— erz 235	Graumanganerz
Fettstein 210	— kupfererz 107	247
Feuerblende 358	— spath = Talkspath	Grauspiessglanzerz
Feueropal 656	Gelbspiessglanzerz 261	239
Feuerstein 220	Gelf 17	Greenokit 206
Fibroferrit 579	Geokronit 889 a	Greenovit 399
Fibrolith 395	Gibbsit 661	Grengesit = Grün-
Fichtelit 1200	Giesekit 210, 214	eisenstein
Ficinit 547	Giftkies 235 a	Grorolith 706
Fischerit 654	Giftkobalt 564	Grossular 81
Fliegenstein 564	Gigantolith 217	Grünbleierz 198
Flinz 174	Gilbertit 472	Grüneisenerde 650
Fluellit 251	Gillingit 1096	— stein 650, 688
Fluolith 966	Giobertit 1122	Grünerde 1183
Fluocerit 218, 1082	— Gismondin 133	— Guyaquillit 1111
Fluss 65	— Glanzarsenikkies 135 a	Guhrhoffian 164
Flussbaryt 65	Glanzerz 20 a	Gummibleispath 662
Flussspath 65	Glanzkobalt 25	— erz 1015
Forsterit 278	Glanzkohle 1051	Gymnit 1033
Fowlerit 366	Glanzmanganerz 246	Gyps 332
Franklinit 23	Glaserz 20 a	
Fraueneis 332	Glaskopf 154, 650, 927	H.
Frugardit 147	Glasurerz = Bleiglanz	Haarkies 740
Fuchsit 580	Glaubersalz 319 a	Haarsalz 63, 728
	Glauberit 317	Hämatit 154
G.	Glaukolith 552	Haidingerit 274,
Gadolinit 383	Glaukophan 982	427
Gänsekötigerz =	Glimmer 186, 322	Halblasurblei = Lasu-
Rauschgelb	— zweiaxiger 322	rigbleivitriol
Gagat 815	Glottalith 65	Halbopal 656
Gahnit 62	Gmelinit 211	Halloisit 1024
Galitzenstein 227	Göckumit 147	Harmotom 133
Galizinit 142	Gold, gediege-	Harringtonit 282
Galmei 162	nes 16	Hartit 1200
Ganomatit 381	Göthit 305	Hartkobaltkies 28
Gaylüssit 348	Grammatit 381	Hartmanganerz
Gedrit 387	Granat 81	109
Gehlenit 127	— hexaëdrischer 73	Harttantalierz 323

Hatchettin 1201	Hyalith 656	Ittnerit 77
Hausmannit 109	Hyalosiderit 292	Junkerit 174
Hauyn 77	Hydrargillit 212, 282	Jurinit 298
Havnefjordit 396 a	Hydroborazit 538	Ixolith 1200
Haydenit 166, 174	Hydrocerit 1118 a	K.
Haytorit 329	Hydrolith 211	Kacholong 656
Hebetin 167	Hydromagnesit 1121	Kakochlor = Kobalt-
Hedenbergit 387	Hydrophan 656	manganerz
Hedyphan 198	Hydrophit 1033	Kakoxen 832
Helvin 57	Hydrophyllit = Talk-	Kalamit 381
Heliotrop 220	hydrat	Kaledonit 285 a
Hemidomblende 323	Hydrosilicit 1138 a	Kalialaun = Alaun
Hepatinerz 1188	Hydrotalkit 488 a	Kaliglimmer 322
Hepatit 267	Hypargyrit 649	Kali-Kreuzstein 133
Herderit 281	Hypargyronblende 649	Kaliphit 808
Herrerit 846	Hypersthen 387	Kalisalpeter 227
Herschelit 122	Hypochlorit 650	Kali, schwefel-
Hessonit 81	Hyposklerit 330	saures 227
Heteroklin 387	Hypostilbit 272	Kalk, flusssaurer 65
Heterozit 502	Hystatit 153 b	— kohlensaurer 163
Heulandit 332	J.	— phosphorsaurer 209
Hisingerit 1096	Jamesonit 245	Kalkspath 163
Hohlspath 308	Jaspis 220	Kalksalpeter 704
Holmesit = Clintonit	Jaspopal 656	— Tuff 163
Holmit 217	Ichthyophthalm 123	Kallochrom 357
Holzasbest s. Asbest	Idokras 147	Kämmererit 213
— kupfererz 704	Idrialit 1017	Kammkies = Binarkies
— opal 656	Jeffersonit 387	Kampylit 198
Honigstein 117	Igloit = Arragonit	Kännelkohle 1019
Hopeit 782	Ilmenit 1536	Kaneelstein 81
Hornbleierz 135	Ilvait 311	Kaolin 1134
Hornblende 381	Indianit 210	Karinthin 381
Hornerz 74	Indikolith 177	Karniol 220
Hornquecksilber 135	Jodsilber 74	Karpholith 832
Hornsilber 74	Johannit 318 a	Karphosiderit
Hornstein 220	Jolith 285	1103
Hudsonit 387	Iridium 30 a	Karstenit 274
Humboldtith 148	Jrit 562	Karstin = Otreilit
Humboldt 329, 1170	Iserin 23 a	Katzenauge 220
Humboltin 1170	Isophan 68	Keramohalit 728
Humit 362	Isopyr 977	Kerolith 1138 a
Huraulit 365		Kibdelophan 1536
Huronit 589 a		Kieselguhr 656
Hyacinth 147		

- Kieselkupfererz** 683
 — magnesit 1122
 — mangan 387
 — malachit 687
 — sinter 656
 — spath 396 a
 — wismuth 57
 — zinkerz 272 167
Kiesglanz 427
Kilbrickenit 889 a
Killinit 306
Kirwanit 688 a
Klapperstein 650
Klebschiefer 1139 a
Knebelit 954
Kobaltarsenikkies = Arsenikkies
Kobaltbleierz = Selenblei
 — blüthe 359
 — glanz 26
 — kies 29
 — manganerz 700
 — mulm 700
 — ocher 1192
 — schwärze 700
 — vitriol 642
Kobellit 748
Kochsalz = Steinsalz
Kohlenblende 1051
 — vitriolblei 326
Kokkolith 387
Kollyrit 1140
Kolophonit 81
Königin 290
Konilit = Kieselguhr
Korazit = Babingtonit
Kornit = dichter Feldspath
Korim 154
Korund 160
Koupholith = Prehnit
- Krenzstein** 133
Krisoberil 254
Krisolith 292
Krokalit = Natrolith
Krokoit 357
Krokydolith 837
Kryolith 476
Kubizit 166
Kuboizit 166
Kupferantimon-
glanz 238 a
 — bleispath 326
Kupferbleivitriol 326
 — blüthe 15
 — braun 1188
 — eisenerz 1188
 — — kies 17
 — fahlerz 14
Kupfer, gediege-
nes 15
 — glanz 243 a
 — glas 243 a
 — glimmer 169
 — grün 687
 — hydrophan 687
 — indig 186 a
 — kies 107
 — lasur 375
 — lebererz 15
 — manganerz 1094
 — nickel 875
 — pecherz 1188
 — roth 15
 — sammtterz = Kupferlasur
 — schaum 287
 — schwärze 700
 — silberglanz 243 a
 — smaragd 169
 — vitriol 392
Kupholith 271
Kymatin 785
- L.**
Labrador 396
Lanarkit 326
Lasionit 282
Lasurigbleivitriol 285 a
Lasurspath 285
Lasurstein 77
Latrobit 399
Laumontit 350
Lavendulan 1042
Lazulith 285
Leadhillit 349
Leberblende 13
Leberkies 188, 233
Leberopal 656
Ledererit 224
Leelit 1135
Lehunit 622
Lemanit 990
Lenzin 1024
Lenzinit 1024
Leonhardit 350
Lepidokrokit 305
Lepidolith 322
Lepidomelan 588
Leptonemerz 927
Leuchtenbergit 158
Leucophan 510 a
Leucopyrit = Arsenikkalkies
Leuzit 92
Levyn 166
Lherzonit 387
Libethenit 290
Libethkupfererz 290
Liebenerit 210
Lievrit 311
Lignit 815
Ligurit 381

- Limonit 650
 Linarit 326
 Linkolnit 273
 Linsenerz 257, 650
 Lirokonit 257
 Lithionglimmer 322
 Lithrodes 210
 Loboit 147
 Lomonit 350
 Lothalalith 387
 Luchssaphir = Dichroit
 M.
 Magnesiaglimmer = einaxiger Glimmer
 Magnesit 1122, 164
 — spath 164
 Magneteisenerz 23, a
 — ocher 23
 — stein 23 a
 Magnetkies 188
 Malachit 378
 Malakon 147
 Malakolith 387
 Maltha 1254
 Malthazit 1129
 Manganaluminat 914
 — blende 29
 — epidot 279
 — glanz 29
 — granat 81
 Manganit 246
 Mangankiesel 387
 — schaum 570 a
 — spath 171
 — titanit = Greenovit
 Marcelin 109
 Marekanit 932
 Margarit 338
 Markasit 17, 28
 Marmalit 13
 Marmolith 782
 Martit 23 a
 Mascagnin 227
 Massicot 1168
 Mauersalpeter 734
 Meerschäum 1125
 Mejonit 124
 Melanit 81
 Melanochroit 299
 Melilit 143
 Mellit 117
 Menakan 153, b
 Menakanit 153 b
 Menakeisenstein 153 b
 Menakerz 331
 Mendipit 466
 Mengit 400
 Menilit 656
 Mennige 1161
 Merkurblende 153 a
 Merkurkerat 135
 Mesitinspath 174
 Mesole 273 a
 Mesolith 273 a
 Mesotyp 282, 353
 Metaxit 795
 Meteoreisen 20 a
 — stein 1228
 Miargyrit 323
 Michaelit 656
 Middletonit 1111
 Miemit 164
 Miesit 198
 Mikroklin 330
 Mikrolith 60
 Milchopal 656
 Mildglanz erz 195
 Miloschin 1182
 Mimetesit 198
 Mineralkermes 359
 Mispickel 235
 Mohsit 154
 Mokkastein 220
 Molybdänbleispath 116
 Molybdänglanz 191
 — kies 191
 — ocher 1166
 — säure 1166
 — silber = Tellurwismuth
 Monazit 367
 Mondstein = Adular
 Monradit 546 a
 Monticellit 292
 Moorkohle 815
 Morasterz 650
 Morion 220
 Mornit 396 b
 Moroxit 209
 Morvenit 133
 Mosandrit 807
 Mullicit 688
 Murchisonit 330
 Muriazit 274
 Mussit 387
 Mysorin 1202
 N.
 Nadeleisenerz 305
 Nadel erz 745
 — kohle 815
 Nadelzeolith 282
 Nagelerz = stängeli-ger Thoneisenstein
 Nagyagererz 243
 Nakrit 186 a
 Naphtha 1254
 Naphthadyl 1201
 Naphthalit Naphthadachil 1255 a
 Natrocalcit 348
 Natrolith 282
 Natron 320 a
 — boraxsaures 320
 — kohlensaures 320 a
 — salpeter 163

- Natron, schwefelsau-
 res 319 a
 — spodumen 396 a
 — siderit = Achmit
 Nekronit 457
 Nemalit 212
 Neotesen = Skorodit
 Nephätil 1255 a
 Nephelin 210
 Nephrit 989
 Nertschinskite 1024
 Neukirchit 110
 Neurolith 832
 Nickelantimon-
 glanz 28
 Nickelantimonkies 28
 Nickelarsenikkies 30
 — blüthe 1152
 — erz, weisses 30
 — glanz 30 a
 — grün 1152
 — kies 875
 — ocher 1152
 — spießglanzerz 28
 — wismuthglanz
 29
 Nigrin 142
 Nitrocalcit 734
 Nontronit 1016
 Nosean 77
 Nüssierit 198
 Nuttallit 132
 ●.
 Obsidian 966
 Octaëdrit 108
 Oerstedtit 366
 Okenit 782
 Oligist = Eisenglanz
 Oligoklas 396 a
 Oligonspath 174
 Olivenerz 257
 Olivenit 257
 Olivin 292
 Omphacit 387
 Onkosit 1033 a
 Onyx 220
 Oosit 214
 Opal 656
 Opalinallophan 1022
 Operment 300
 Ophit 1033
 Orthit 864
 Orthoklas 330
 Osmalith 792 a
 Osmium-Iridium
 189
 Ostranit 306
 Ottrelit 528 a
 Oxahverit 123
 Oxalit 1170
 Ozokerit 1201
 P.
 Palladium 1223
 Papierkohle 815
 Paragonit 583
 Paraluminat 663
 Paranthin 124
 Pargasit 381
 Paulit 387
 Pechblende 648
 — erz 648
 — kohle 815, 1019
 — opal 656
 — stein 1010
 — uran 648
 Peganit 282
 Pektolith 796
 Peliom 285
 Pelokonit 1049
 Pennin 153 b
 Peponit 857
 Peridot 292
 Periklas 60
 Periklin 396 a
 Peristerit 330
 Perlglimmer 338
 Perlstein 1232
 Perowskin 502
 Perowskit 34
 Petalit 545
 Pfeifenthon 1127
 — stein 1135
 Phästin 387
 Pharmakolith 351
 Pharmakosiderit 73
 Phenakit 178
 Phillipsit 37, 133
 Phisalith 254
 Phönit 210
 Phönizit 299
 Pholerit 481
 Phosgenit 135
 Phosphatkupfer-
 erz 378
 Phosphorit 209
 Phyllinspath 349
 Phyllit 185
 Phylloretin 1200
 Piauzit 1199
 Picnit 254, 331
 Pigotit 117
 Pikrolit = Serpentin
 Pikropharmakolith 682
 Pikrophyll 589 a
 Pikrosmine 295
 Piktit 331
 Pimelith 1021
 Pinguit 1185
 Pinit 214
 Piotin 1138
 Pirenait 81
 Pissophan 686
 Pistazit 379
 Pittinerz 648
 Pittizit 1017
 Plagionit 323
 Plakodin 322
 Plasma 220
 Platin, gediegenes 35

- Pleonast 60
 Plinthit 1075
 Plumbocalcit 167
 Plumbostib 749
 Polirschiefer 1139 a
 Polyanit 246
 Polyadelphit 1243
 Polyargit 525 a
 Polybasit 195
 Polyhalit 226
 Polyhydrit 1096
 Polykras 312
 Polyolith 1009 a
 Polymignit 312
 Polysphärit 198
 Polyxen 35
 Porzellanerde 1134
 — spath 273 a
 Poonahlit 282
 Prasem 220
 Praseolith 846
 Prasilit 841
 Prasopal 656
 Prehnit 271
 Proustite 155
 Pseudochrysolith 932
 Psilomelan 927
 Pyknit 254
 Pyknotrop 1033
 Pyralloolith 394
 Pyrantimonit 359
 Pyrargillit 148
 Pyrargyrit 155
 Pyrenait 81
 Pyrgom 387
 Pyrochlor 68
 Pyrolusit 246
 Pyromorphit 198
 Pyrop 73
 Pyrophyllit 445
 Pyrophysalith 254
 Pyrorthit 309
 Pyrosiderit 305
 Pyrosklerit 293
 Pyrosmalith 215
 Pyroxen 387
 Pyrrhit 61
 Pyrrotin 188
Q.
 Quarz 220
 Quecksilberchlorür 135
 — gediegenes 1253
 — hornerz 135
 — lebererz 153 a
 Quellerz 650
 Querantimonerz 245
 Quincyte 1015
R.
 Radiolith = Natrolith
 Rädelerz 240
 Raphilit 796
 Raseneisenstein 650
 Rauchtöps 220
 Rauschgelb 300
 Rauschgelbkies 235 a
 Rauschroth 357
 Rautenspath 164
 Razoumovskin 1021
 Realgar 357
 Reissblei 191
 Retinalith 1033
 Retinasphalt 1199
 Retinit 1199
 Reussin 726
 Rhätizit 395
 Rhodalith 1129
 Rhodonit 387
 Rhodizit 56
 Rhodochrom 1033
 Rhodochrosit 171
 Riemonnit = Allophan
 Ringelerz = Bleiglanz
 Riolit 905
 Ripidolith 186 a
 Röthel 154
 Romanzowit = Hessonit
 Romein 118
 Roselit 682
 Rosellan 547
 Rosenit 323
 Rosit 547
 Rothantimonerz 359
 Rothbleierz 357
 Rotheisenerz 154
 Rotheisenoher 154
 Rotheisenrahm 154
 Rotheisenstein 154
 Rothgültigerz 155
 Rothgültigerz, fahles 155
 Rothkupfererz 15
 Rothkupferglas 15
 Rothmanganerz = Braunspath
 Rothnickelkies 875
 Rothoffit 81
 Rothspiessglänzerz 359
 Rothzinkerz 440
 Rubellan 217
 Rubellit 177
 Rubin = Saphir
 Rubinglimmer 305
 Russkobalt 700
 Rutil 142
 Ryakolith 342
S.
 Saccharit 997
 Safflorit 28
 Sagenit 142
 Salamstein 160
 Salmiak 90
 Salit 387
 Salpeter 227

Salzkupfererz 290	Schwarzkohle 1019	Silberfahlerz 14
Sammtblende 305	— kupfererz =	— gediegenes 14
Saphir 160	Schwarzerz	— glanz 20 a
Saphirin 501	— manganerz 927, 109	— — biegsamer 232
Saponit 1138	— silberglanz 244	— glas 20 a
Sapparit 834	— spiessglanzerz 240	— hornerz 74
Sarcolit 75, 148	— uranerz 648	— kerat 74
Sassolin 434	Schwefel 255	— kies 17
Saussurit 990	— kies 17	— kupferglanz 243 a
Scarbroit 1140	— kobalt 29	— mulm 1178
Schaalstein 340 a	— nickel 740	— oxyd, kohlen- saures 1205
Scharfmangan- erz 109	— silber 244	— schwärze 1178
Schaumerz 570 a	— thonerde 728	— spiessglanz 189
Scheelbleierz 149	— zink 13	— wismutherz 745
Scheelbleispath 149	Schwerbleierz 186	Silicit 396 b
Scheelit 149	— spath 267	Sillimanit 367
Scheelkalk 149	— stein 149	Silvan 192
Scheelspath 149	— tantalerz 247	Sismondin 519
Scheererit 1200	— uranerz 648	Skapolith 124
Scherbenkobalt 564	Schwimmstein 220	Skolezit 353
Schieferkohle 1019	Seifenstein 1021	— wasserfreier 396 a
Schieferthon 1127	Selenblei 34	Skorolith 1129
Schieferspath 163	— kobaltblei 898	Skorodit 285 a
Schilfglaserz 245	— kupfer 878	Skotin 388
Schillerspath 442, 387	— — blei 898	Smaltin 28
Schillerstein 442	— quecksilber- blei 418	Smaragd 205
Schmalzstein 124	Selenquecksilberzink 905	Smaragdit 381
Schmirgel 160	— schwefel 255	Smaragdocalcit 290
Schoharit 267	— silber 897	Sodalith 88
Schörl 177	— — blei 897	Sommervillit 148
Schrifterz 239	— — glanz 897	Sordawalit 978 a
— glanz 239	— — kupferglanz 887	Spargelstein 299
— gold 239	— zink 905	Spatheisenstein 174
— tellur 239	Serpentin 1033	Speckstein 1021
Schrötterit 1022	Seybertit 536	Speerkies 233
Schwarzbleierz 263	Siderobol 1129	Speiskobalt 28
Schwarzcerinerz 400	Sideroklepd 1229	Spessartin 81
Schwarzerz 14, 29	Sideroschisolith 218	Sphärosiderit 174, 650
— gültigerz 14, 244		Sphärostilbit 272
— kobalterz 700		Sphärolith 1232
		Sphen 331

- Sphragid 1129
 Spiessglanzbleierz 240
 Spiessglanzfahlerz 14
 — ocher 1165 —
 — weiss 261
 Spiessglas, gediegen 154
 Spiessglassilber 189
 Spinell 60
 Spodumen 544
 Spreustein 124
 Sprödglanzerz 244
 Sprödglasserz 244
 Stahlstein 174
 Stahlantimonglanz 245
 Staurolith 304
 Steinheilith 285
 — kohle 1019
 — mannit 24
 — mark 1134
 — öl 1254
 — salz 69
 — talg 1201
 Stellit 275 a
 Sternbergit 232
 Stilbit 272, 332
 Stilpnomelan 555
 Stilpnosiderit 305
 Stinkkohle 1195
 Stinkstein 163
 Stirian 28
 Strahlerz 377
 Strahlstein 381, 387
 Striegisan 282
 Stroganowit 455 a
 Stromnit 265
 Strontian 265
 Strontianit 265
 Strontianspath 267
 Stylobat 127
 Succinasphalt 1111
 Succinit = Topazolith
 Sumpferz 650
 Surturbrand 815
 Sylvanerz 192, 235
 Sympleisit 372
 Synaphinerz 119
- T.**
- Tachylit 982
 Tafelspath 340
 Talk 186
 — phosphorsaurer 362
 Talk Eisen 15
 Talkglimmer 186, 186 a
 — granat 81
 — hydrat 212
 Talk-Pharmakolith 1146 a
 — spath 164
 — steinmark 1136
 Tantalit 247
 Tellur, gediegenes 192
 — blei 889 a
 — glanz 243
 — gold 239
 — ocher 664
 — silber 888
 — blei 235
 — wismuth 191
 — — silber 428
 Tautolith 312
 Tekoretin 1200
 Tennantit 14
 Tenorit 426 a
 Tephorit 455 a
 Teratolith 1182
 Ternärbleierz 349
 Tesselit 123
 Tesseralkies 28
 Tetartin 396 a
 Tetradymit 191
 Tetraphyllin 502
 Tharandit 164
 Thenardit 228
 Thomäit 174
 Thomsonit 275 a
 Thon 1127
 Thonerde, schwefelsaure 728
 Thoneisenstein 650
 Thonstein 1127
 Thorit 1096
 Thraulit 1096
 Thulit 379
 Thumerstein = Axinit
 Thuringit 636 a
 Tinkal 320
 Titaneisen 153 b
 Titaneisensand 23 a
 Titanit 331
 Titanschörl 142
 Tombazit 15
 Topfstein 186
 Töpferthon 1127
 Topas 254
 Topazolith 81
 Torf 1197
 Torrelit 247
 Trappeisenerz 23 a
 Traubenblei 198
 Tremolith 381
 Triklasit 370
 Triphan 544
 Triplit 502
 Triphyllin 502
 Trippel 1139 a
 Trombolith 1057
 Trona 320 a
 Troostit 172
 Tschewkinit 978 a
 Tuesit 481
 Tungstein 149
 Turgit 305
 Türkis 1182
 Turmalin 177
 Turnerit 369
 Turrit 142

U.

Umbra 650, 815
 Unghwarit 1153
 Unobinärgülden
 323
 Uralit 381
 Uralorthis 982
 Uranblüthe 1167
 Uranerz 648
 — glimmer 139
 — grün 1167
 Uranit 139
 Uranocher 1167
 — oxyd 139
 — pecherz 648
 — vitriol 318 a
 Uranotantal 1252
 Urao 227, 320 a
 Uwarowit 81

V.

Vanadinbleierz
 199
 Vanadinit 199
 Variszit 282
 Varvizit 246
 Vauquelinit 377
 Vermiculith 580
 Vermontit 235 a
 Veronesererde 1183
 Vesuvian 147
 Vignit 23 a
 Villarsit 294
 Violan 836
 Visirgraupen 142
 Vitriol 319, 392,
 227
 — blei 263
 — kies 233
 Vivianit 375
 Volbortit 1250

Voltzin 695
 Vulpinit 274

W.

Wachsstein 1138 a
 Wacke 1129
 Wad 570 a
 Wagnerit 362
 Walkererde 1022
 Warwickit 322
 142
 Wasserblei 191
 — kies 233
 Wavellit 282
 Websterit 663
 Wehrlit 311
 Weichgewächs 20
 Weichmanganerz 246
 Weissantimonerz
 261
 Weissarsenikerz
 63
 Weissbleierz 263
 — erz 235 a
 — gültigerz 14
 Weisskupfererz
 17
 Weissit 556
 Weissnickelkies
 885
 Weisstellur 235
 Weissspiessglanzerz
 261
 Wernerit 124
 Wichtyn 521 a
 Wiesenerz 650
 Willemite 167
 Wilnit 147
 Wismuthblende 37
 — bleierz 745
 — blüthe 1165
 Wismuth, gedie-
 genes 12

Wismuthglanz
 238 a

— kupfererz 745
 — nickelkies 29
 — ocher 1165
 — silber 560 a
 — spiegel 191
 Withamit 379
 Witherit 264
 Wodankies 28
 Wöhlerit 758
 Wörthit 462
 Wolchonskoit
 1185
 Wolfram 323
 — ocher 1184
 Wollastonit 340 a
 Wolnyn 267
 Würfelerz 73
 Würfelzeolith = Anal-
 zim

X.

Xanthit 1243
 Xanthokon 638
 Xanthophyllit 494
 Xenolith 367
 Xylokryptit 1200

Y.

Yenit = Lievrit
 Yttererde, phosphor-
 saure 118
 Ytterocerit 75
 Yttrotantalit 119


Z.


Zeagonit 133
 Zeasit 656
 Zeilanit 60
 Zeuxit 809


Zianit 395
Ziegelerz 15, 1188
Zinkbleispath 263
— blende 13
— blüthe 667
Zinkenit 244
Zinkglas 272
— ocher 272


Zinkoxyd 440
— silikat 272
— spath 162
— spinell 63
— vitriol 227
Zinnerz 143
— fahlerz 36
— kies 36

Zinnkupferglanz 136
Zinnober 153 a
Zinnstein 142
Zirkon 147
Zoisit 379
Zootinsalz 163
Zundererz 359
Zurlit 148, 340 a












124.



125.



129.



130.




134.




135.




139.




140.



144.




145.




149.




150.







184.




185.




189.



190.



194.



195.




199.




200.




204.




205.



209.



210.





Zimmermann, Chr.

Handbuch zum Bestimmen der Mineralien auf dichotomischem Wege nach Dufrenöy's traite de mineralogie Mit einem Vorwort von Chr. Zimmermann

Clausthal 1848

Lith. 207 I

urn:nbn:de:bvb:12-bsb10283695-3